

第4部 血液検査

—集計結果表—


目 次

第4部 血液検査

調査実施者の性・年齢階級別人員構成	190
表1 血色素量の分布（性・年齢階級別）〔服薬者除外〕	191
表2 ヘマトクリット値の分布（性・年齢階級別）	191
表3 赤血球数の分布（性・年齢階級別）	192
表4 白血球数の分布（性・年齢階級別）	192
表5 血小板数の分布（性・年齢階級別）	193
表6 血糖値の分布（食後3時間以上、性・年齢階級別） 〔インスリン注射または服薬者除外〕	194
表7 ヘモグロビンA1cの分布（性・年齢階級別） 〔インスリン注射または服薬者除外〕	195
表8 血清総コレステロール値の分布（性・年齢階級別）	196
表9 血清総コレステロール値の分布（性・年齢階級別）〔服薬者除外〕	196
表10 血清中性脂肪（トリグリセライド）値の分布（性・年齢階級別） 〔服薬者除外〕	197
表11 血清HDLコレステロール値の分布（性・年齢階級別） 〔服薬者除外〕	197
表12 血清LDLコレステロール値（friedwaldの式）の分布 （性・年齢階級別）〔服薬者除外〕	198
表13 血清総たんぱく質値の分布（性・年齢階級別）	199
表14 血清アルブミン値の分布（性・年齢階級別）	199
表15 血清クレアチニン値の分布（性・年齢階級別）	200
表16 推算GFR値の分布（性・年齢階級別）	200
表17 血清鉄の分布（性・年齢階級別）〔服薬者除外〕	201
表18 総鉄結合能（TIBC）の分布（性・年齢階級別）〔服薬者除外〕	201
表19 AST（GOT）の分布（性・年齢階級別）	202
表20 ALT（GPT）の分布（性・年齢階級別）	202
表21 γ -GTPの分布（性・年齢階級別）	203
表22 血清尿酸値の分布（性・年齢階級別）	203
表23 メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の状況（性・年齢階級別）	204
表24 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性を否定 できない人の状況」（性・年齢階級別）	205
表25 高血圧症有病者の状況（性・年齢階級別）	206
表26 「脂質異常が疑われる人」の状況（性・年齢階級別）	207
表27 腹囲区分別、血中脂質、血圧、血糖いずれかのリスクを 有する割合（性・年齢階級別）	208
表28 腹囲区分別、血中脂質、血圧、血糖のリスク保有状況 「すべての組み合わせ①血中脂質、②血圧、③血糖」（性・年齢階級別）	209

第4部 血液検査

調査実施者の性・年齢階級別人員構成



性別	1- 6	7-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-74	75-79	80歳以上	総計
男性 321人			15	21	37	34	55	79	32	25	23	321
女性 409人			20	25	62	53	74	77	32	29	37	409
男女計			35	46	99	87	129	156	64	54	60	730

表1 血色素量の分布(性・年齢階級別)【服薬者除外】

	総計	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上	
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	
男性	総数	317	14	21	37	34	55	78	78	198	65	47	303
	10.0g/dl未満												
	10.0-10.9	2					1	1	1	1	1	1	2
	11.0-11.9	4					1	2	2	1	2	4	
	12.0-12.9	23		1	1		6	14	10	4	11	23	
	13.0-13.9	50	1		7	1	9	11	21	14	12	49	
	14.0-14.9	79	3	4	7	11	16	21	17	17	8	76	
	15.0-15.9	100	8	8	15	15	18	23	13	63	15	92	
	16.0-16.9	40	2	6	4	6	9	7	24	10	4	38	
	17.0-17.9	15		1	2	1	3	5	9	3	3	15	
	18.0g/dl以上	4		1	1		1		2			4	
	平均値(g/dl)	14.9	15.3	15.6	15.1	15.2	15.0	14.9	14.2	14.9	14.7	14.0	14.8
	標準偏差	1.4	0.9	1.2	1.2	0.9	1.3	1.5	1.5	1.3	1.4	1.6	1.4
女性	総数	391	20	22	61	49	72	73	94	226	63	62	371
	10.0g/dl未満	9			3	3	2		1	5		1	9
	10.0-10.9	14	3	3		3	2		3	5		3	11
	11.0-11.9	36	3	1	5	2	3	7	15	14	7	13	33
	12.0-12.9	135	7	9	27	18	25	19	30	73	18	19	128
	13.0-13.9	129	6	3	21	15	23	29	32	79	21	20	123
	14.0-14.9	57	1	4	5	7	16	15	9	41	11	6	56
	15.0-15.9	10		2		1	1	2	4	8	5		10
	16.0-16.9	1						1		1	1		1
	17.0-17.9												
	18.0g/dl以上												
	平均値(g/dl)	12.9	12.4	12.9	12.7	12.7	13.0	13.3	12.8	13.1	13.3	12.5	12.9
	標準偏差	1.2	1.2	1.4	1.2	1.6	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2

注) 貧血治療のための薬服用者除外。

表2 ヘマトクリット値の分布(性・年齢階級別)

	総計	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上	
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	
男性	総数	319	14	21	37	34	55	79	79	200	66	47	305
	25.0%未満												
	25.0-25.9												
	30.0-34.9	2						1	1	1	1	2	
	35.0-39.9	22					2	6	14	11	4	11	
	40.0-44.9	128	3	6	15	11	24	30	39	82	30	22	
	45.0-49.9	129	10	13	14	20	21	33	18	83	24	9	
	50.0-54.9	31		1	6	3	7	7	7	20	6	4	
	55.0%以上	7	1	1	2		1	2		3	1		
	(再掲)39.8未満	23					2	6	15	11	5	12	
	(再掲)51.9以上	15	1	1	3	1	3	3	7	7	1	3	
	平均(%)	45.4	47.0	46.8	46.9	46.4	45.5	45.4	43.5	45.4	45.0	43.0	
	標準偏差	4.1	3.2	3.0	3.8	2.8	4.0	4.5	4.1	4.0	3.9	4.3	
女性	総数	403	20	24	62	50	73	76	98	231	65	66	383
	25.0%未満												
	25.0-25.9	5			1	2	1		1	3		1	
	30.0-34.9	21	2	2	3	5	2	1	6	8		6	
	35.0-39.9	145	7	10	25	15	22	19	47	69	22	34	
	40.0-44.9	196	11	9	31	26	40	46	33	124	31	21	
	45.0-49.9	35		3	2	2	8	9	11	26	11	4	
	50.0-54.9	1						1		1	1		
	55.0%以上												
	(再掲)33.4未満	10			2	3	2		3	5		3	
	(再掲)45.0以上	36		3	2	2	8	11	27	27	12	4	
	平均(%)	40.4	39.4	40.4	39.9	39.7	41.0	41.8	39.8	41.0	41.8	38.9	
	標準偏差	3.6	2.6	3.4	3.2	4.2	3.5	3.0	3.8	3.5	3.3	3.8	

表3 赤血球数の分布(性・年齢階級別)

	総計	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上	
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	
男性	総数	319	14	21	37	34	55	79	79	200	66	47	305
	400万個/mm ³ 未満	19					1	4	14	11	7	8	19
	400-449	68		1	5	2	14	18	28	46	19	16	68
	450-499	124	3	6	15	19	25	31	25	83	22	17	121
	500-549	91	10	13	15	11	11	20	11	48	16	5	81
	550-599	16	1	1	2	2	3	6	1	11	2	1	15
	600-649	1					1			1			1
	650万個/mm ³ 以上												
	平均値(万個/mm ³)	476.6	519.4	508.6	494.4	490.8	475.1	476.3	447.5	474.0	465.2	446.8	474.7
	標準偏差	47.3	19.9	28.8	39.1	31.4	48.3	44.9	47.9	46.2	46.5	47.3	47.3
女性	総数	403	20	24	62	50	73	76	98	231	65	66	383
	<400 または(空白)	55		1	6	7	5	6	30	23	8	25	55
	400-449	215	11	12	38	24	39	40	51	120	35	34	204
	450-499	118	8	9	16	18	28	27	12	80	17	5	110
	500-549	15	1	2	2	1	1	3	5	8	5	2	14
	550-599												
	600-649												
	650万個/mm ³ 以上												
	平均値(万個/mm ³)	435.5	451.0	444.0	439.7	437.2	441.4	439.9	418.9	439.5	438.8	409.6	434.7
	標準偏差	35.3	28.7	33.8	30.0	34.8	29.3	32.0	40.8	32.4	35.9	39.8	35.4

表4 白血球数の分布(性・年齢階級別)

	総計	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上	
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	
男性	総数	319	14	21	37	34	55	79	79	200	66	47	305
	3500/μ l未満	5			1	1		3	2	2	1	2	5
	3500-3800	4				1	1	2	3	3	1	1	4
	3900-4300	13		1	3	1		5	8	2	2	1	13
	4400-4800	26		2	4			8	15	6	5	5	26
	4900-5300	27		1	1	2	3	9	19	8	6	6	27
	5400-5800	24	1		2	3	5	8	15	4	6	6	23
	5900-6300	38	3	2	4	3	6	9	23	11	6	6	35
	6400-6800	44	2	3	7	7	4	14	29	11	3	3	42
	6900-7300	35	3	4	6	2	8	7	18	4	4	4	32
	7400-7800	33	2	4	1	5	6	6	18	2	8	8	31
	7900-8300	19	1		2	1	6	4	15	6	1	1	18
	8400-9100	22		2	1	1	7	6	16	5	3	3	22
	9200-9800	10	1	1	1	3	1	3	7	1	1		9
	9900-10400	3			1			2	2	2			3
	10500-10900	10	1		1	2	3	1	7	1	1	1	9
	11000-11600	6		1	2	2		1	3	1			6
	11800/μ l以上												
	平均値(個/μ l)	6745.1	7300.0	7061.9	6789.2	7202.9	7045.5	6598.7	6282.3	6793.0	6598.5	6200.0	6719.7
	標準偏差	1822.5	1341.1	1830.0	2105.7	2148.8	1652.5	1631.1	1762.5	1821.5	1813.3	1567.5	1837.6
女性	総数	403	20	24	62	50	73	76	98	231	65	66	383
	3500/μ l未満	8				2		1	4	1	4	4	8
	3500-3800	4			1	1		2	3	2	2	4	4
	3900-4300	23		2		2	4	9	17	6	4	4	23
	4400-4800	36	1	1	3	2	6	14	26	9	5	5	35
	4900-5300	44		1	8	7	12	2	26	7	9	9	44
	5400-5800	41		2	6	7	6	7	25	10	8	8	41
	5900-6300	50	5	3	6	6	12	8	28	5	8	8	45
	6400-6800	53	4	4	11	6	9	7	26	7	8	8	49
	6900-7300	45	3	2	4	5	8	10	26	7	10	10	42
	7400-7800	43	3	3	12	5	5	11	23	6	2	2	40
	7900-8300	21	1	2	3	2	2	5	10	3	5	5	20
	8400-9100	18	1	3	2	5	6	1	11	1	1	1	17
	9200-9800	8	1		3			1	3	1	1	1	7
	9900-10400	2			1			1	1	1			2
	10500-10900	3			1			1	1		1	1	3
	11000-11600	4	1	1	1		1		1				3
	11800/μ l以上												
	平均値(個/μ l)	6349.4	7255.0	6870.8	6822.6	6264.0	6354.8	6127.6	5949.0	6177.1	5932.3	6043.9	6302.1
	標準偏差	1565.8	1733.6	1713.1	1511.3	1448.0	1494.8	1495.4	1503.0	1493.3	1434.4	1512.5	1542.0

表5 血小板数の分布(性・年齢階級別)

	総計	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上	
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	
男性	総数	319	14	21	37	34	55	79	79	200	66	47	305
	10万/ μ l未満	7	1					6		2	2	4	6
	10-14	17	1				1	7	8	11	8	5	16
	15-19	56			4	8	7	14	23	40	18	12	56
	20-24	105	4	9	10	10	19	28	25	65	17	17	101
	25-29	83	2	6	16	10	16	22	11	54	17	5	81
	30-34	37	3	6	5	6	6	6	5	20	4	3	34
	35-39	11	2		2		5	1	1	6		1	9
	40-44	1						1		1			1
	45-49	2	1				1			1			1
	50万/ μ l以上												
	15万/ μ l未満	24	2				1	7	14	13	10	9	22
	35万/ μ l以上	14	3		2		6	2	1	8		1	11
	平均(万/ μ l)	24.0	27.0	26.7	26.3	24.4	26.2	23.3	20.6	23.9	21.6	20.4	23.9
	標準偏差	6.3	9.1	4.2	4.9	5.0	6.2	5.7	6.2	6.0	5.6	6.4	6.1
女性	総数	403	20	24	62	50	73	76	98	231	65	66	383
	10万/ μ l未満	3				1			2	1		2	3
	10-14	6						3	3	3	2	3	6
	15-19	57			3	5	6	18	25	37	14	17	57
	20-24	132	1	12	22	15	21	23	38	73	25	24	131
	25-29	115	7	7	19	11	28	22	21	69	15	13	108
	30-34	59	9	3	10	10	10	9	8	31	8	6	50
	35-39	22	2		5	6	7	1	1	14	1	1	20
	40-44	7	1	2	3					1			6
	45-49	1				1				1			1
	50万/ μ l以上	1				1				1			1
	15万/ μ l未満	9				1		3	5	4	2	5	9
	35万/ μ l以上	31	3	2	8	8	8	1	1	17	1	1	28
	平均(万/ μ l)	25.6	31.4	26.6	27.6	27.6	26.8	23.8	22.5	25.5	23.7	22.2	25.3
	標準偏差	6.2	4.1	5.6	6.0	7.4	5.3	5.3	5.3	6.0	5.2	5.5	6.1

表6 血糖値の分布(食後3時間以上,性・年齢階級別)[インスリン注射または服薬者除外]

	総数	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上	
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	
男性	総数	240	11	18	28	27	39	57	60	145	47	38	229
	40mg/dl未満												
	40-59												
	60-79	11	1	2		3	2	2	1	8	2		10
	80-99	130	8	14	26	13	21	27	21	68	18	14	122
	100-119	72	2	2	2	6	11	17	32	46	19	20	70
	120-139	12				2	1	6	3	10	5	2	12
	140-159	3				1	1		1	2		1	3
	160-179	3				1		1	1	2	1	1	3
	180-199	7				1	3	2	1	7	2		7
	200-219												
	220-239	1						1		1			1
	240-260	1						1		1			1
	260mg/dl以上 (再掲)110以上	50			1	6	8	16	19	37	16	12	50
	平均値(mg/dl)	101.8	88.1	89.2	89.1	101.9	104.9	108.3	105.9	105.8	106.6	105.9	102.5
	標準偏差	25.1	8.8	7.7	7.0	26.4	29.4	33.7	17.1	29.6	23.3	14.7	25.4
	総数	309	16	17	48	39	60	56	73	180	48	48	293
女性	40mg/dl未満												
	40-59	1					1			1			1
	60-79	15	2	2	6	2	3			5			13
	80-99	200	14	14	35	30	34	34	39	109	23	28	186
	100-119	67		1	7	6	17	13	23	46	16	13	67
	120-139	11					4	1	6	7	2	4	11
	140-159	8				1	1	3	3	7	3	1	8
	160-179	4						3	1	3	3	1	4
	180-199												
	200-219	1						1		1	1		1
	220-239												
	240-260	1							1			1	1
	260mg/dl以上 (再掲)110以上	49		1	1	1	12	15	19	34	14	13	49
	平均値(mg/dl)	98.3	87.2	88.8	89.6	91.5	96.4	108.7	105.9	100.3	109.3	106.7	98.9
	標準偏差	22.3	6.7	7.5	9.0	11.2	16.3	33.5	24.8	23.4	26.6	28.3	22.7

注) インスリン注射または血糖を下げる薬服用者除外

表7 ヘモグロビンA1cの分布(性・年齢階級別)[インスリン注射または服薬者除外]

	総数	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
総数	300	14	21	37	32	52	69	75	182	58	46	286
男性	4.0%以下											
	4.0-4.1											
	4.2-4.3	9	1	3		1	1	2	1	4		1
	4.4-4.5	16	2	7	3	1	1	2		4	1	8
	4.6-4.7	34	5	6	5	3	6	5	4	15	1	3
	4.8-4.9	72	3	5	12	7	17	17	11	49	16	3
	5.0-5.1	71	2		11	7	12	13	26	41	17	17
	5.2	21	1		5		3	4	8	8	4	7
	5.3	14				2	1	5	6	10	3	4
	5.4	15				3	2	6	4	14	6	1
	5.5	9				2	1	2	4	7	3	2
	5.6	7				1		3	3	4		3
	5.7	5				1	2	1	1	4	1	1
	5.8	5			1		2	1	1	4	2	
	5.9	3				2		1		3		
	6.0	2							2			2
	6.1	4				2						
	6.2-6.3	6					2	3	1	6	3	
	6.4-6.5	1							1			1
	6.6-6.7	1						1		1		1
6.8-6.9	1							1		1	1	
7.0-7.1												
7.2-7.3	1					1			1		1	
7.4-7.5												
7.6-7.7	1						1		1		1	
7.8-7.9												
8.0-8.1												
8.2-8.3												
8.4-8.5	1					1			1		1	
8.6-8.7												
8.8-8.9												
9.0%以上	1							1	1	1	1	
(再掲)6.1%以上	17				2	4	7	4	15	4	2	
平均値(%)	5.1	4.7	4.6	4.9	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.2	
標準偏差	0.6	0.3	0.2	0.3	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	
総数	375	20	22	61	49	72	66	85	217	58	55	355
女性	4.0%以下											
	4.0-4.1	1			1							1
	4.2-4.3	4		1	1	1			1		1	4
	4.4-4.5	27	4	2	13	6		2	8			23
	4.6-4.7	48	6	6	12	8	6	5	20	1	4	42
	4.8-4.9	60	2	9	8	11	15	6	9	7	5	58
	5.0-5.1	93	4	4	20	15	17	12	21	53	13	12
	5.2	32	1		2	3	8	12	6	25	6	4
	5.3	24	2		3		5	4	10	11	5	22
	5.4	23			1	2	5	5	10	17	6	5
	5.5	11				2	1	2	6	6	2	5
	5.6	18	1				5	3	9	12	7	5
	5.7	17					7	6	4	13	4	4
	5.8	2					1	1		2		2
	5.9	3				1	1	1		3	1	3
	6											
	6.1	1						1		1	1	1
	6.2-6.3	4						2	2	3	2	4
	6.4-6.5	1						1		1		1
	6.6-6.7	2							2	1	1	2
6.8-6.9	1					1			1		1	
7.0-7.1												
7.2-7.3												
7.4-7.5												
7.6-7.7												
7.8-7.9	1						1		1	1	1	
8.0-8.1												
8.2-8.3												
8.4-8.5	1						1		1		1	
8.6-8.7												
8.8-8.9												
9.0%以上	1						1		1	1	1	
(再掲)6.1%以上	12					1	7	4	10	6	2	
平均値(%)	5.1	4.9	4.8	4.8	4.9	5.2	5.4	5.3	5.2	5.4	5.3	
標準偏差	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.8	0.4	0.6	0.7	0.4	

注) インスリン注射または血糖を下げる薬服用者除外

表8 血清総コレステロール値の分布(性・年齢階級別)

	総数	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上	
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	
男性	総数	321	15	21	37	34	55	79	80	200	66	48	306
	120mg/dl未満	3		1				1	1	1		1	3
	120-139	10	5	2	1		1	1	1	1		1	5
	140-159	35	4	4	3	2	6	9	7	18	6	6	31
	160-179	51	3	3	7	4	5	12	17	28	13	10	48
	180-199	88	2	9	8	10	11	20	28	54	21	15	86
	200-219	71	1	1	10	7	13	26	13	49	13	10	70
	220-239	34		1	4	8	10	4	7	26	6	3	34
	240-259	16			2	2	3	3	6	12	4	2	16
	260-279	11			2		1	5	3	9	2		11
	280-299												
	300mg/dl以上	2					1		1	2	1		2
	(再掲)220以上	63	0	1	8	11	19	11	13	49	13	5	63
	(再掲)240以上	29	0	0	4	3	9	7	6	23	7	2	29
	平均(mg/dl)	194.7	157.9	173.4	197.1	204.3	206.8	195.9	192.5	200.7	197.2	188.6	196.5
	標準偏差	33.0	24.6	26.1	32.4	29.0	36.2	31.6	28.5	32.3	31.5	28.3	32.3
女性	総数	406	20	23	61	53	74	77	98	236	65	66	386
	120mg/dl未満	1	1							2	1	1	8
	120-139	10	2	2	3	1		1	1	9	3	5	26
	140-159	31	5	4	8	1	3	5	5	37	10	11	76
	160-179	85	9	9	19	14	7	9	18	55	17	17	97
	180-199	99	2	5	20	17	15	14	26	47	14	14	69
	200-219	70	1	2	6	10	15	16	20	40	8	11	53
	220-239	53			2	7	15	14	15	24	5	4	28
	240-259	28			1	9	12	6	6	13	3	3	19
	260-279	19			3	2	6	3	5	4	3		4
	280-299	4					1	1	2	5	1		6
	300mg/dl以上	6		1			3	2	2	8	2		6
	(再掲)220以上	110	0	1	5	10	34	32	28	86	20	18	110
	(再掲)240以上	57	0	1	3	3	19	18	13	46	12	7	57
	平均(mg/dl)	199.5	161.2	174.9	181.8	194.7	217.3	213.2	202.6	209.6	206.9	200.2	201.5
	標準偏差	37.1	21.1	33.5	29.7	28.1	36.5	39.8	32.9	36.7	36.7	32.0	36.7

表9 血清総コレステロール値の分布(性・年齢階級別)[服薬者除外]

	総数	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上	
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	
男性	総数	285	15	21	37	32	52	67	61	171	49	41	270
	120mg/dl未満	3		1				1	1	1		1	3
	120-139	10	5	2	1		1	1	1	14	4	3	24
	140-159	28	4	4	3	2	6	6	3	23	10	8	41
	160-179	44	3	3	7	4	5	8	14	45	14	14	76
	180-199	78	2	9	8	10	11	17	21	43	11	9	63
	200-219	64	1	1	10	6	11	24	11	23	5	3	31
	220-239	31		1	4	7	9	4	6	10	2	2	14
	240-259	14			2	2	3	3	4	9	2		11
	260-279	11			2		1	5	3	2			11
	280-299												
	300mg/dl以上	2					1	1		2	1		2
	(再掲)220以上	58	0	1	8	10	18	11	10	44	10	5	58
	(再掲)240以上	27	0	0	4	3	9	7	4	21	5	2	27
	平均(mg/dl)	195.4	157.9	173.4	197.1	203.4	206.5	199.3	193.1	201.9	198.2	191.3	197.4
	標準偏差	33.5	24.6	26.1	32.4	29.6	37.2	32.1	27.9	32.9	32.0	28.3	32.7
女性	総数	352	20	23	61	50	68	60	70	199	49	49	332
	120mg/dl未満	1	1							2	1	1	8
	120-139	10	2	2	3	1		1	1	7	2	2	21
	140-159	26	5	4	8	1	3	3	2	32	8	6	66
	160-179	75	9	9	19	14	6	6	12	46	11	15	86
	180-199	88	2	5	20	16	15	11	19	39	11	12	59
	200-219	60	1	2	6	9	14	12	16	31	6	8	41
	220-239	41			2	7	11	11	10	21	3	2	23
	240-259	23			1	9	10	3	3	12	3	3	18
	260-279	18			3	1	6	3	5	4	3		4
	280-299	4					1	1	2	5	1		6
	300mg/dl以上	6		1			3	2	2	7	16	13	92
	(再掲)220以上	92	0	1	5	9	30	27	20	42	10	5	51
	(再掲)240以上	51	0	1	3	2	19	16	10	38.1	39.5	30.1	37.5
	平均(mg/dl)	199.0	161.2	174.9	181.8	192.9	217.4	216.6	204.3	210.2	208.9	201.9	201.3
	標準偏差	37.9	21.1	33.5	29.7	26.4	37.6	41.7	33.3	38.1	39.5	30.1	37.5

表10 血清中性脂肪(トリグリセライド)値の分布(性・年齢階級別)[服薬者除外]

	総数	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
総数	285	15	21	37	32	52	67	61	171	49	41	270
20mg/dl未満												
20-49	6	3				1		2	1		2	3
50-79	48	1	6	8	4	6	12	11	25	7	8	47
80-109	42	2	6	5	2	10	8	9	24	8	5	40
110-139	54	2	3	4	1	6	18	20	28	11	17	52
140-169	25	3	2	3	3	3	6	5	17	9		22
170-199	19			3	5	4	5	2	15	3	1	19
200mg/dl以上	91	4	4	14	17	22	18	12	61	11	8	87
(再掲)150以上	129	6	6	20	23	28	28	18	88	22	9	123
平均(mg/dl)	173.5	160.3	124.8	208.4	216.4	191.3	164.7	144.4	181.5	166.3	138.4	174.3
標準偏差	117.3	129.1	65.3	151.7	127.1	111.6	108.6	94.4	112.6	114.9	99.0	116.5
総数	352	20	23	61	50	68	60	70	199	49	49	332
20mg/dl未満												
20-49	31	5	4	7	10	3	1	1	14		1	26
50-79	95	10	6	21	16	15	12	15	46	8	12	85
80-109	67	5	8	10	10	11	10	13	35	9	9	62
110-139	48		2	8	5	9	10	14	28	8	10	48
140-169	47		1	7	3	11	12	13	32	13	7	47
170-199	21			2	3	5	4	7	13	3	6	21
200mg/dl以上	43		2	6	3	14	11	7	31	8	4	43
(再掲)150以上	93		2	12	9	26	22	22	65	20	14	93
平均(mg/dl)	122.0	64.8	93.4	110.0	95.6	142.5	146.0	136.8	133.5	153.7	127.3	125.5
標準偏差	79.4	22.3	55.2	75.5	63.0	82.9	87.7	80.9	86.4	92.5	61.4	80.3

注) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者除外

表11 血清HDL-コレステロール値の分布(性・年齢階級別)[服薬者除外]

	総数	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
総数	285	15	21	37	32	52	67	61	171	49	41	270
30mg/dl未満	5			2	1	1	1		3			5
30-39	41	4	3	10	5	7	7	5	22	5	2	37
40-49	79	4	6	4	12	12	19	22	49	19	16	75
50-59	67	3	3	7	7	18	17	12	47	13	7	64
60-69	45	2	6	6	1	7	13	10	22	4	9	43
70-79	28	2	2	2	4	5	5	8	17	5	5	26
80-89	13		1	4	1	2	3	2	7	1	1	13
90-99	4			1	1		1	1	3	2		4
100mg/dl以上	3			1			1	1	1		1	3
平均(mg/dl)	54.8	51.1	55.2	55.3	52.8	54.2	55.4	55.9	54.5	53.5	56.5	55.0
標準偏差	15.6	14.0	12.5	20.4	14.4	13.1	15.1	16.5	14.6	13.9	16.5	15.7
総数	352	20	23	61	50	68	60	70	199	49	49	332
30mg/dl未満	1							1				1
30-39	13			1	2	3	3	4	8	3	4	13
40-49	54	2	1	9	4	10	14	14	32	11	10	52
50-59	103	5	10	14	13	20	18	23	61	15	13	98
60-69	78	9	5	14	8	13	13	16	39	10	11	69
70-79	62	3	4	14	14	11	8	8	34	8	7	59
80-89	22	1	2	2	3	8	2	4	14	2	3	21
90-99	14		1	4	5	3	1		9			14
100mg/dl以上	5			3	1		1		2			5
平均(mg/dl)	61.8	62.9	63.2	64.9	66.9	62.8	57.8	57.4	61.8	57.8	57.2	61.8
標準偏差	15.0	9.1	11.9	16.7	16.9	15.1	14.0	12.5	15.2	12.2	13.6	15.2

注) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者除外

表12 血清LDL-コレステロール値(Friedewaldの式)の分布(性・年齢階級別)[服薬者除外]

	総数	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
男性	総数	267	14	21	31	30	47	65	59	161	46	253
	40mg/dl未満	2	1					1			1	1
	40-49											
	50-59	6		1	1		1	2	1	4	1	6
	60-69	18	5	3	3		2	2	3	5	2	13
	70-79	18	2	1	3	2	4	2	4	9	2	16
	80-89	28	3	5	5	5	6	1	14	4	4	25
	90-99	38	1	3	5	5	8	8	8	24	6	37
	100-109	34		3	2	2	8	9	10	22	6	34
	110-119	39	2	2	2	8	2	12	11	23	6	37
	120-129	31		2	3		6	13	7	22	8	31
	130-139	17		1		3	3	4	5	13	5	2
	140-149	17			4	3	3	3	4	9	1	4
	150-159	3					1	1	1	3	2	3
	160-169	8			2	1	1	2	2	5	1	8
	170-179	4				1				4		4
	180-189	3						2				3
	190-199								1			
	200-209											
	210-219											
	220mg/dl以上	1						1		1		1
	平均値(%)	107.8	78.0	93.3	104.5	111.4	114.8	111.5	110.2	112.8	113.9	108.2
	標準偏差	29.3	20.8	20.8	30.4	25.1	32.7	28.2	27.2	29.4	31.4	25.1
女性	総数	346	20	23	60	50	66	58	69	194	48	326
	40mg/dl未満	1						1		1	1	1
	40-49	3	1		1			1		1	1	2
	50-59	4		1	1	1	1			2		4
	60-69	13	2	2	7	1			1	1		11
	70-79	24	3	4	8	4	2	1	2	7	1	21
	80-89	42	7	5	9	10	5	2	4	20	4	35
	90-99	51	5	3	14	5	8	4	12	21	6	46
	100-109	39	1	3	6	5	10	6	8	23	6	38
	110-119	43		3	6	11	5	9	9	28	7	43
	120-129	33	1	1	2	4	6	10	9	21	7	32
	130-139	28			1	3	7	6	11	20	6	28
	140-149	22			3	3	5	5	6	13	2	22
	150-159	21		1		3	10	5	2	18	1	21
	160-169	4					2	1	1	3		4
	170-179	9				1	3	3	2	8	3	9
	180-189	3			1				2	1	1	3
	190-199	2						1		2		2
	200-209						1	1				
	210-219	2					1	1		2	1	2
	220mg/dl以上	2						2		2	1	2
	平均値(%)	112.5	85.3	93.0	95.3	106.9	124.6	130.0	119.5	121.2	120.4	119.2
	標準偏差	32.7	16.1	21.8	26.6	24.5	30.9	41.2	26.2	34.0	36.2	24.5

注) コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬服用者除外

表13 血清総たんぱく質値の分布(性・年齢階級別)

	総計	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
総数	321	15	21	37	34	55	79	80	200	66	48	306
男性	6.0g/dl未満											
	6.0-6.4	3				1		2	2	1	1	3
	6.5-6.9	37			3	2	4	10	22	8	12	37
	7.0-7.4	139	4	7	16	13	26	40	92	29	20	135
	7.5-7.9	108	6	13	15	15	18	23	65	22	9	102
	8.0-8.4	29	5	1	2	3	6	5	17	6	4	24
	8.5g/dl以上	5			1	1			2		2	5
平均(g/dl)	7.4	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
標準偏差	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
総数	409	20	25	62	53	74	77	98	236	65	66	389
女性	6.0g/dl未満											
	6.0-6.4	3				1		2	2	1	1	3
	6.5-6.9	50	1	2	8	6	3	12	28	13	11	49
	7.0-7.4	178	8	9	32	24	34	30	98	22	31	170
	7.5-7.9	147	11	12	19	18	29	29	87	24	18	136
	8.0-8.4	26		2	3	4	7	4	18	4	3	26
	8.5g/dl以上	5				1			3	1	2	5
平均(g/dl)	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
標準偏差	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4

表14 血清アルブミン値の分布(性・年齢階級別)

	総計	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
総数	321	15	21	37	34	55	79	80	200	66	48	306
男性	3.6g/dl未満											
	3.6-3.7	3						3	1	1	2	3
	3.8-3.9	8					1	6	4	3	4	8
	4.0-4.1	27			1	1	5	13	16	6	10	27
	4.2-4.3	52		1		3	7	21	36	17	15	52
	4.4-4.5	86		2	9	9	13	23	64	22	11	86
	4.6-4.7	71	4	6	12	8	17	16	46	12	3	67
	4.8-4.9	49	6	7	13	8	7	2	20	5	3	43
	5-5.1	22	3	5	2	5	4	3	12			19
	5.2g/dl以上	3	2				1		1			1
平均値(g/dl)	4.5	4.9	4.8	4.7	4.7	4.5	4.4	4.3	4.5	4.4	4.3	4.5
標準偏差	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
総数	409	20	25	62	53	74	77	98	236	65	66	389
女性	3.6g/dl未満	2		1	1							2
	3.6-3.7	3						3			3	3
	3.8-3.9	10		1		1	1	5	5	3	4	10
	4.0-4.1	35	1	1	3	4	5	15	19	7	11	34
	4.2-4.3	89	1	2	15	10	16	25	51	18	20	88
	4.4-4.5	144	7	7	19	23	22	35	91	21	20	137
	4.6-4.7	88	8	6	18	9	21	11	50	13	6	80
	4.8-4.9	29	2	6	4	5	5	3	15	3	2	27
	5-5.1	8	1	1	2	1	3		4			7
	5.2g/dl以上	1					1		1			1
平均値(g/dl)	4.4	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.3	4.4	4.4	4.3	4.4
標準偏差	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3

表15 血清クレアチニン値の分布(性・年齢階級別)

	総数	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
総数	321	15	21	37	34	55	79	80	200	66	48	306
0.4mg/dl未満	1					1			1			1
0.4-0.49	15		1		2	3	5	4	11	2	3	15
0.5-0.59	49	5	2	4	5	8	17	8	32	10	6	44
0.6-0.69	78	4	4	13	11	19	17	10	52	11	5	74
0.7-0.79	85	4	11	12	6	15	20	17	50	18	8	81
0.8-0.89	55	1	3	8	8	6	10	19	31	13	12	54
0.9-0.99	30	1			2	2	9	16	20	10	9	29
1.0-1.19	6					1	1	4	2	1	4	6
1.2-1.39	1							1			1	1
1.4-1.59												
1.6-1.79												
1.8-1.99												
2.0mg/dl以上	1							1	1	1		1
平均値(mg/dl)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.8
標準偏差	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
総数	409	20	25	62	53	74	77	98	236	65	66	389
0.4mg/dl未満	10		3	3		1	3		4			10
0.4-0.49	52	2	5	9	10	8	10	8	30	7	6	50
0.5-0.59	159	8	11	29	23	37	25	26	99	25	12	151
0.6-0.69	122	10	4	16	19	20	27	26	73	18	19	112
0.7-0.79	41		2	4		6	9	20	22	11	13	41
0.8-0.89	12			1	1	2	1	7	4	1	7	12
0.9-0.99	6						1	5	3	3	3	6
1.0-1.19	3							3			3	3
1.2-1.39	2							2			2	2
1.4-1.59												
1.6-1.79												
1.8-1.99												
2.0mg/dl以上	2						1	1	1		1	2
平均値(mg/dl)	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6
標準偏差	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	0.5	0.4	0.1	0.6	0.4

表16 推算GFR値の分布(性・年齢階級別)

	総数	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
総数	321	15	21	37	34	55	79	80	200	66	48	306
5ml/min/1.73m ² 未満	1							1	1	1		1
15-29	46				1	3	11	31	23	13	23	46
30-59	174	1	6	19	21	38	49	40	129	42	19	173
60-89	100	14	15	18	12	14	19	8	47	10	6	86
0ml/min/1.73m ² 以上												
平均値	81.4	116.2	98.8	89.8	86.2	84.8	77.6	65.8	79.3	70.7	65.2	79.7
標準偏差	21.9	18.9	16.2	11.5	17.4	25.9	16.0	16.6	20.4	15.2	17.6	20.6
総数	409	20	25	62	53	74	77	98	236	65	66	389
5ml/min/1.73m ² 未満	2						1	1	1		1	2
15-29	1							1			1	1
30-59	44				1	3	7	33	18	11	26	44
60-89	207		2	17	29	49	53	57	154	46	34	207
0ml/min/1.73m ² 以上	155	20	23	45	23	22	16	6	63	8	4	135
平均値	86.0	118.3	118.6	101.1	90.5	84.0	78.8	66.4	82.3	74.9	63.1	84.4
標準偏差	24.5	13.8	31.2	22.2	13.3	13.5	20.3	17.0	17.0	14.3	17.4	23.8

表17 血清鉄の分布(性・年齢階級別)[服薬者除外]

	総数	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
総数	318	15	21	37	34	55	78	78	198	65	47	303
40μg/dl未満	8	1	1	1		2		3	2		3	7
40-59	30	3	2	5	2	8	5	5	17	4	3	27
60-79	59	2	3	9	7	11	13	14	36	11	9	57
80-99	72	5	5	7	9	11	21	14	46	16	9	67
100-119	57	3	2	7	6	10	11	18	35	15	10	54
120-139	43	1	2	3	5	5	12	15	29	10	8	42
140-159	24		1	2	2	6	10	3	19	4	2	24
160-179	9			2	1	1	2	3	4		3	9
180-199	8		3	1		1	3		4	1		8
200μg/dl以上	8		2		2		1	3	6	4		8
平均値(μg/dl)	102.2	83.5	112.6	96.4	106.1	95.0	107.3	103.9	104.4	107.5	98.4	103.1
標準偏差	39.0	27.3	53.4	37.9	43.1	35.0	35.3	38.7	38.6	39.7	33.5	39.2
総数	397	20	23	61	52	73	74	94	231	63	62	377
40μg/dl未満	47	4	6	12	11	7	1	6	19		6	43
40-59	72	3	4	11	9	16	17	12	44	10	10	69
60-79	93	6	6	9	5	25	18	24	61	20	11	87
80-99	83	2	4	10	9	14	19	25	50	14	17	81
100-119	56	4		12	8	9	11	12	30	6	10	52
120-139	23	1	1	2	5	1	4	9	14	6	5	22
140-159	13		1	1	2	1	2	6	8	5	3	13
160-179	3			1	2				2			3
180-199	2			1	1				1			2
200μg/dl以上	5		1	2			2		2	2		5
平均値(μg/dl)	79.6	69.0	69.9	80.7	80.0	72.3	85.2	84.5	80.5	90.6	82.0	80.1
標準偏差	37.8	32.9	46.7	50.7	44.2	26.5	33.5	30.8	34.3	35.3	31.3	37.9

注) 貧血治療薬服用者除外

表18 総鉄結合能(TIBC)の分布(性・年齢階級別)[服薬者除外]

	総数	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
総数	318	15	21	37	34	55	78	78	198	65	47	303
200μg/dl未満	1							1	1	1		1
200-249	9	1	1		1		3	3	5	1	2	8
250-299	81	1	5	5	4	12	24	30	52	23	18	80
300-349	141	4	10	21	11	25	34	36	84	31	22	137
350-399	74	8	5	10	15	14	15	7	46	7	5	66
400-449	10	1		1	2	3	2	1	8	2		9
450-499	2				1	1			2			2
500μg/dl以上												
平均値(μg/dl)	324.6	347.4	323.6	331.8	347.7	336.1	319.7	304.0	326.7	313.3	303.6	323.5
標準偏差	43.3	44.2	36.3	33.5	43.7	45.0	41.1	39.3	45.2	41.4	36.3	43.0
総数	400	20	25	62	52	73	74	94	231	63	62	380
200μg/dl未満	1							1	1		1	1
200-249	7			1		1		5	1		5	7
250-299	84		1	10	9	17	16	31	55	20	18	84
300-349	155	4	11	16	11	36	39	38	101	29	23	151
350-399	95	9	4	20	16	15	18	13	52	13	10	86
400-449	36	3	5	8	10	3	1	6	15	1	5	33
450-499	20	4	3	6	6	1			7			16
500μg/dl以上	2		1	1								2
平均値(μg/dl)	340.6	386.6	378.2	361.7	367.1	328.0	325.5	313.8	334.0	319.8	313.7	338.1
標準偏差	56.0	50.7	62.8	60.6	61.2	42.2	35.7	48.2	48.1	35.5	53.9	55.2

注) 貧血治療薬服用者除外

表19 AST(GOT)の分布(性・年齢階級別)

		総数	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
男性	総数	321	15	21	37	34	55	79	80	200	66	48	306
	5IU/L未満												
	5-9												
	10-19	84	7	10	4	2	18	19	24	48	12	15	77
	20-29	169	6	10	23	20	27	43	40	104	38	26	163
	30-39	39	1	1	5	3	8	12	9	30	13	2	38
	40-49	19	1		4	5	1	4	4	10		4	18
50IU/L以上	10			1	4	1	1	3	8	3	1	10	
平均値(IU/L)	25.6	21.9	19.8	27.8	32.0	24.3	24.8	25.7	26.3	26.2	24.7	25.8	
標準偏差	10.5	7.4	5.0	10.0	15.4	9.4	7.9	11.0	11.2	10.6	9.2	10.6	
女性	総数	409	20	25	62	53	74	77	98	236	65	66	389
	5IU/L未満												
	5-9												
	10-19	187	17	16	35	31	30	24	34	96	20	23	170
	20-29	178	2	7	21	17	37	42	52	112	35	36	176
	30-39	28	1	1	5	3	4	5	9	15	4	6	27
	40-49	6		1	1		1	2	1	4	2		6
50IU/L以上	10				2	2	4	2	9	4	1	10	
平均値(IU/L)	22.1	16.8	18.6	19.7	21.8	22.9	24.6	23.1	23.3	24.2	22.7	22.4	
標準偏差	10.1	5.0	6.6	6.6	9.9	9.8	14.2	8.7	11.5	11.0	8.1	10.2	

表20 ALT(GPT)の分布(性・年齢階級別)

		総数	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上
		人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数
男性	総数	321	15	21	37	34	55	79	80	200	66	48	306
	5IU/L未満												
	5-9	15	3	2	1		2	1	6	4	1	5	12
	10-19	125	7	12	9	5	19	36	37	72	26	25	118
	20-29	93	1	4	8	10	22	23	25	67	25	13	92
	30-39	30	1	1	6	7	2	7	6	19	5	3	29
	40-49	23		1	3	5	4	7	3	19	7		23
50IU/L以上	35	3	1	10	7	6	5	3	19	2	2	32	
平均値(IU/L)	27.3	25.3	20.7	37.6	40.1	27.2	25.6	21.2	28.3	24.5	19.2	27.4	
標準偏差	18.7	22.0	13.3	24.2	24.9	19.0	13.4	11.6	18.1	11.1	10.7	18.5	
女性	総数	409	20	25	62	53	74	77	98	236	65	66	389
	5IU/L未満												
	5-9	3	1				1		1	1		1	2
	10-19	50	8	5	17	3	2	4	11	11	2	9	42
	20-29	228	10	15	29	31	40	39	64	129	39	45	218
	30-39	82	1	2	10	12	21	19	17	59	13	10	81
	40-49	22		1	2	3	6	7	3	19	7		22
50IU/L以上	9		1	3	2	1	2		5			9	
平均値(IU/L)	19.4	10.6	17.2	17.2	20.8	20.7	25.1	16.9	22.1	22.1	15.3	19.8	
標準偏差	16.5	4.0	12.9	10.5	14.2	12.8	27.8	11.2	19.5	16.1	9.0	16.8	

表21 v-GTPの分布(性・年齢階級別)

	総数	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上	
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	
男性	総数	321	15	21	37	34	55	79	80	200	66	48	306
	10IU/L未満	1		1									1
	10-19	67	7	7	3	5	5	17	23	33	11	17	60
	20-29	88	4	11	7	4	14	22	26	52	21	14	84
	30-39	47	3		8	7	7	10	12	29	11	7	44
	40-49	33		1	5	1	9	10	7	23	9	4	33
	50-59	25		1	4	3	5	8	4	20	7		25
	60-69	10			2	1	5	1	1	7	1	1	10
	70-79	8			3	2	1		2	3		2	8
	80IU/L以上	42	1		5	11	9	11	5	33	6	3	41
	平均値(IU/L)	47.3	26.4	22.9	54.7	69.9	56.2	45.4	40.2	52.7	43.9	36.3	48.3
	標準偏差	49.8	17.8	10.3	40.8	62.5	49.2	48.9	53.1	55.4	51.4	41.2	50.6
女性	総数	409	20	25	62	53	74	77	98	236	65	66	389
	10IU/L未満	18	3	4	6	1	1	1	2	5	2		15
	10-19	221	17	18	38	27	31	34	56	107	31	41	204
	20-29	86		1	10	14	21	19	21	60	17	15	86
	30-39	36		1	3	3	9	13	7	28	8	4	36
	40-49	12			2	1	5	3	1	10	1		12
	50-59	12		1		1	4	1	5	9	3	2	12
	60-69	9				2	1	3	3	8	2	1	9
	70-79	3				1		1	1	2		1	3
	80IU/L以上	12			3	3	2	2	2	7	1	2	12
	平均値(IU/L)	30.0	12.2	16.6	34.7	58.1	27.2	26.4	23.7	33.6	24.4	23.0	30.9
	標準偏差	93.9	3.2	10.4	104.2	229.0	19.9	18.8	19.0	110.6	17.7	20.2	96.2

表22 血清尿酸値の分布(性・年齢階級別)

	総数	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 40-74歳	(再掲) 65-74歳	(再掲) 75歳以上	(再掲) 20歳以上	
	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	人数	
男性	総数	321	15	21	37	34	55	79	80	200	66	48	306
	2.0mg/dl未満	1					1			1			1
	2.0-2.9												
	3.0-3.9	14		1		4	3	3	3	11	3	2	14
	4.0-4.9	55	3	2	8	5	3	19	15	33	11	9	52
	5.0-5.9	78	5	6	9	6	9	22	21	46	19	12	73
	6.0-6.9	91	4	6	10	10	17	20	24	55	18	16	87
	7.0-7.9	61	1	5	6	5	16	13	15	42	14	7	60
	8.0-8.9	15	1	1	3	1	6	1	2	8		2	14
	9.0-9.9	5	1		1	2		1		3	1		4
	10mg/dl以上	1				1				1			1
	平均値(mg/dl)	6.1	6.2	6.2	6.3	6.1	6.4	5.8	5.9	6.0	5.9	5.9	6.1
	標準偏差	1.3	1.4	1.2	1.4	1.6	1.5	1.2	1.1	1.4	1.2	1.2	1.3
女性	総数	409	20	25	62	53	74	77	98	236	65	66	389
	2.0mg/dl未満												
	2.0-2.9	12	1	3	3	4		1		5	1		11
	3.0-3.9	85	1	5	17	18	22	10	12	55	8	7	84
	4.0-4.9	165	13	11	27	19	26	34	35	93	28	21	152
	5.0-5.9	93	5	5	10	7	14	21	31	51	20	22	88
	6.0-6.9	37		1	3	3	9	8	13	22	5	11	37
	7.0-7.9	14			2	1	3	2	6	7	2	5	14
	8.0-8.9	3				1		1	1	3	1		3
	9.0-9.9												
	10mg/dl以上												
	平均値(mg/dl)	4.7	4.5	4.2	4.4	4.3	4.7	4.9	5.1	4.7	4.9	5.2	4.7
	標準偏差	1.1	0.6	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

表23 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の状況(性・年齢階級別)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	726	100.0	45	100.0	99	100.0	90	100.0	130	100.0	166	100.0	196	100.0	457	100.0	144	100.0	125	100.0
メタボリックシンドロームが強く疑われるもの	143	19.7	1	2.2	6	6.1	12	13.3	22	16.9	48	28.9	54	27.6	108	23.6	47	32.6	28	22.4
メタボリックシンドロームの予備群と考えられる者	159	21.9	4	8.9	12	12.1	12	13.3	33	25.4	43	25.9	55	28.1	112	24.5	46	31.9	31	24.8
上記以外	424	58.4	40	88.9	81	81.8	66	73.3	75	57.7	75	45.2	87	44.4	237	51.9	51	35.4	66	52.8
総数	320	100.0	22	100.0	37	100.0	36	100.0	54	100.0	83	100.0	88	100.0	208	100.0	72	100.0	53	100.0
メタボリックシンドロームが強く疑われるもの	88	27.5	1	4.5	6	16.2	10	27.8	13	24.1	29	34.9	29	33.0	68	32.7	29	40.3	13	24.5
メタボリックシンドロームの予備群と考えられる者	105	32.8	4	18.2	10	27.0	7	19.4	22	40.7	28	33.7	34	38.6	71	34.1	29	40.3	20	37.7
上記以外	127	39.7	17	77.3	21	56.8	19	52.8	19	35.2	26	31.3	25	28.4	69	33.2	14	19.4	20	37.7
総数	406	100.0	23	100.0	62	100.0	54	100.0	76	100.0	83	100.0	108	100.0	249	100.0	72	100.0	72	100.0
メタボリックシンドロームが強く疑われるもの	55	13.5		0.0		0.0	2	3.7	9	11.8	19	22.9	25	23.1	40	16.1	18	25.0	15	20.8
メタボリックシンドロームの予備群と考えられる者	54	13.3		0.0	2	3.2	5	9.3	11	14.5	15	18.1	21	19.4	41	16.5	17	23.6	11	15.3
上記以外	297	73.2	23	100.0	60	96.8	47	87.0	56	73.7	49	59.0	62	57.4	168	67.5	37	51.4	46	63.9

表24 「糖尿病が強く疑われる人」及び「糖尿病の可能性を否定できない人」の状況(性・年齢階級別)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	788	100.0	54	100.0	116	100.0	94	100.0	141	100.0	174	100.0	209	100.0	482	100.0	149	100.0	136	100.0
糖尿病が強く疑われる人	27	3.4		0.0		0.0	1	1.1	4	2.8	14	8.0	8	3.8	23	4.8	10	6.7	4	2.9
服薬者*	52	6.6		0.0		0.0	3	3.2	5	3.5	23	13.2	21	10.0	36	7.5	16	10.7	16	11.8
糖尿病予備群	81	10.3		0.0	1	0.9	9	9.6	20	14.2	21	12.1	30	14.4	58	12.0	20	13.4	22	16.2
上記以外	628	79.7	54	100.0	115	99.1	81	86.2	112	79.4	116	66.7	150	71.8	365	75.7	103	69.1	94	69.1
総数	355	100.0	25	100.0	47	100.0	38	100.0	63	100.0	88	100.0	94	100.0	226	100.0	77	100.0	57	100.0
糖尿病が強く疑われる人	15	4.2		0.0		0.0	1	2.6	3	4.8	7	8.0	4	4.3	13	5.8	4	5.2	2	3.5
服薬者*	23	6.5		0.0		0.0	2	5.3	3	4.8	10	11.4	8	8.5	18	8.0	8	10.4	5	8.8
糖尿病予備群	31	8.7		0.0	1	2.1	6	15.8	5	7.9	8	9.1	11	11.7	22	9.7	6	7.8	8	14.0
上記以外	286	80.6	25	100.0	46	97.9	29	76.3	52	82.5	63	71.6	71	75.5	173	76.5	59	76.6	42	73.7
総数	433	100.0	29	100.0	69	100.0	56	100.0	78	100.0	86	100.0	115	100.0	256	100.0	72	100.0	79	100.0
糖尿病が強く疑われる人	12	2.8		0.0		0.0		0.0	1	1.3	7	8.1	4	3.5	10	3.9	6	8.3	2	2.5
服薬者*	29	6.7		0.0		0.0	1	1.8	2	2.6	13	15.1	13	11.3	18	7.0	8	11.1	11	13.9
糖尿病予備群	50	11.5		0.0		0.0	3	5.4	15	19.2	13	15.1	19	16.5	36	14.1	14	19.4	14	17.7
上記以外	342	79.0	29	100.0	69	100.0	52	92.9	60	76.9	53	61.6	79	68.7	192	75.0	44	61.1	52	65.8

*「服薬者」とは、質問票で「インスリン注射または血糖値を下げる薬」の使用有と回答した者

表25 高血圧症有病者の状況(性・年齢階級別)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	788	100.0	54	100.0	116	100.0	94	100.0	141	100.0	174	100.0	209	100.0	482	100.0	149	100.0	136	100.0
高血圧症有病者	128	16.2	1	1.9	11	9.5	13	13.8	30	21.3	40	23.0	33	15.8	93	19.3	25	16.8	23	16.9
服薬者*	232	29.4	1	1.9	1	0.9	9	9.6	34	24.1	66	37.9	121	57.9	147	30.5	73	49.0	83	61.0
高血圧症予備群	95	12.1	4	7.4	6	5.2	16	17.0	23	16.3	23	13.2	23	11.0	72	14.9	22	14.8	13	9.6
上記以外	333	42.3	48	88.9	98	84.5	56	59.6	54	38.3	45	25.9	32	15.3	170	35.3	29	19.5	17	12.5
総数	355	100.0	25	100.0	47	100.0	38	100.0	63	100.0	88	100.0	94	100.0	226	100.0	77	100.0	57	100.0
高血圧症有病者	70	19.7	1	4.0	8	17.0	10	26.3	14	22.2	20	22.7	17	18.1	50	22.1	13	16.9	11	19.3
服薬者*	123	34.6		0.0		0.0	3	7.9	20	31.7	41	46.6	59	62.8	86	38.1	46	59.7	37	64.9
高血圧症予備群	42	11.8	3	12.0	4	8.5	11	28.9	9	14.3	5	5.7	10	10.6	30	13.3	8	10.4	5	8.8
上記以外	120	33.8	21	84.0	35	74.5	14	36.8	20	31.7	22	25.0	8	8.5	60	26.5	10	13.0	4	7.0
総数	433	100.0	29	100.0	69	100.0	56	100.0	78	100.0	86	100.0	115	100.0	256	100.0	72	100.0	79	100.0
高血圧症有病者	58	13.4		0.0	3	4.3	3	5.4	16	20.5	20	23.3	16	13.9	43	16.8	12	16.7	12	15.2
服薬者*	109	25.2	1	3.4	1	1.4	6	10.7	14	17.9	25	29.1	62	53.9	61	23.8	27	37.5	46	58.2
高血圧症予備群	53	12.2	1	3.4	2	2.9	5	8.9	14	17.9	18	20.9	13	11.3	42	16.4	14	19.4	8	10.1
上記以外	213	49.2	27	93.1	63	91.3	42	75.0	34	43.6	23	26.7	24	20.9	110	43.0	19	26.4	13	16.5

*「服薬者」とは、質問票で「血圧を下げる薬」の使用有と回答した者

表26 「脂質異常が疑われる人」の状況(性・年齢階級別)

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	788	100.0	54	100.0	116	100.0	94	100.0	141	100.0	174	100.0	209	100.0	482	100.0	149	100.0	136	100.0
脂質異常が疑われる人	55	7.0	3	5.6	13	11.2	7	7.4	11	7.8	11	6.3	10	4.8	32	6.6	8	5.4	7	5.1
服薬者*	102	12.9		0.0		0.0	5	5.3	10	7.1	32	18.4	55	26.3	73	15.1	37	24.8	29	21.3
上記以外	631	80.1	51	94.4	103	88.8	82	87.2	120	85.1	131	75.3	144	68.9	377	78.2	104	69.8	100	73.5
総数	355	100.0	25	100.0	47	100.0	38	100.0	63	100.0	88	100.0	94	100.0	226	100.0	77	100.0	57	100.0
脂質異常が疑われる人	41	11.5	3	12.0	12	25.5	5	13.2	8	12.7	8	9.1	5	5.3	24	10.6	5	6.5	2	3.5
服薬者*	41	11.5		0.0		0.0	2	5.3	3	4.8	14	15.9	22	23.4	32	14.2	19	24.7	9	15.8
上記以外	273	76.9	22	88.0	35	74.5	31	81.6	52	82.5	66	75.0	67	71.3	170	75.2	53	68.8	46	80.7
総数	433	100.0	29	100.0	69	100.0	56	100.0	78	100.0	86	100.0	115	100.0	256	100.0	72	100.0	79	100.0
脂質異常が疑われる人	14	3.2		0.0	1	1.4	2	3.6	3	3.8	3	3.5	5	4.3	8	3.1	3	4.2	5	6.3
服薬者*	61	14.1		0.0		0.0	3	5.4	7	9.0	18	20.9	33	28.7	41	16.0	18	25.0	20	25.3
上記以外	358	82.7	29	100.0	68	98.6	51	91.1	68	87.2	65	75.6	77	67.0	207	80.9	51	70.8	54	68.4

*「服薬者」とは、質問票で「コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬」の使用有と回答した者

表27 腹囲区分別、血中脂質、血圧、血糖のいずれかのリスクを有する割合(性・年齢階級別)

	腹囲	総数		リスク保有数								
				0		1つ		2つ		3つ		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	<85cm(男)/90cm(女)	376	100.0	176	46.8	143	38.0	46	12.2	11	2.9
		≧85cm(男)/90cm(女)	350	100.0	48	13.7	159	45.4	106	30.3	37	10.6
	20-29歳	<85cm(男)/90cm(女)	37	100.0	35	94.6	2	5.4		0.0		0.0
		≧85cm(男)/90cm(女)	8	100.0	3	37.5	4	50.0	1	12.5		0.0
	30-39歳	<85cm(男)/90cm(女)	69	100.0	62	89.9	7	10.1		0.0		0.0
		≧85cm(男)/90cm(女)	30	100.0	12	40.0	12	40.0	5	16.7	1	3.3
	40-49歳	<85cm(男)/90cm(女)	58	100.0	37	63.8	17	29.3	4	6.9		0.0
		≧85cm(男)/90cm(女)	32	100.0	8	25.0	12	37.5	10	31.3	2	6.3
	50-59歳	<85cm(男)/90cm(女)	65	100.0	23	35.4	32	49.2	10	15.4		0.0
		≧85cm(男)/90cm(女)	65	100.0	10	15.4	33	50.8	16	24.6	6	9.2
	60-69歳	<85cm(男)/90cm(女)	64	100.0	10	15.6	40	62.5	10	15.6	4	6.3
		≧85cm(男)/90cm(女)	102	100.0	11	10.8	43	42.2	34	33.3	14	13.7
	70歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	83	100.0	9	10.8	45	54.2	22	26.5	7	8.4
		≧85cm(男)/90cm(女)	113	100.0	4	3.5	55	48.7	40	35.4	14	12.4
	(再掲)	40-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	207	100.0	76	36.7	99	47.8	28	13.5	4
		≧85cm(男)/90cm(女)	250	100.0	30	12.0	112	44.8	77	30.8	31	12.4
65-74歳		<85cm(男)/90cm(女)	48	100.0	9	18.8	27	56.3	9	18.8	3	6.3
		≧85cm(男)/90cm(女)	96	100.0	3	3.1	46	47.9	33	34.4	14	14.6
75歳以上		<85cm(男)/90cm(女)	63	100.0	3	4.8	35	55.6	18	28.6	7	11.1
		≧85cm(男)/90cm(女)	62	100.0	3	4.8	31	50.0	23	37.1	5	8.1
男性	総数	<85cm	98	100.0	37	37.8	48	49.0	12	12.2	1	1.0
		≧85cm	222	100.0	29	13.1	105	47.3	68	30.6	20	9.0
	20-29歳	<85cm	15	100.0	14	93.3	1	6.7		0.0		0.0
		≧85cm	7	100.0	2	28.6	4	57.1	1	14.3		0.0
	30-39歳	<85cm	12	100.0	10	83.3	2	16.7		0.0		0.0
		≧85cm	25	100.0	9	36.0	10	40.0	5	20.0	1	4.0
	40-49歳	<85cm	16	100.0	6	37.5	8	50.0	2	12.5		0.0
		≧85cm	20	100.0	3	15.0	7	35.0	9	45.0	1	5.0
	50-59歳	<85cm	12	100.0	1	8.3	9	75.0	2	16.7		0.0
		≧85cm	42	100.0	7	16.7	22	52.4	11	26.2	2	4.8
	60-69歳	<85cm	19	100.0	4	21.1	12	63.2	3	15.8		0.0
		≧85cm	64	100.0	7	10.9	28	43.8	22	34.4	7	10.9
	70歳以上	<85cm	24	100.0	2	8.3	16	66.7	5	20.8	1	4.2
		≧85cm	64	100.0	1	1.6	34	53.1	20	31.3	9	14.1
	(再掲)	40-74歳	<85cm	52	100.0	12	23.1	32	61.5	8	15.4	
		≧85cm	156	100.0	17	10.9	71	45.5	53	34.0	15	9.6
65-74歳		<85cm	12	100.0	3	25.0	8	66.7	1	8.3		0.0
		≧85cm	60	100.0	2	3.3	29	48.3	20	33.3	9	15.0
75歳以上		<85cm	19	100.0	1	5.3	13	68.4	4	21.1	1	5.3
		≧85cm	34	100.0	1	2.9	20	58.8	9	26.5	4	11.8
女性	総数	<90cm	278	100.0	139	50.0	95	34.2	34	12.2	10	3.6
		≧90cm	128	100.0	19	14.8	54	42.2	38	29.7	17	13.3
	20-29歳	<90cm	22	100.0	21	95.5	1	4.5		0.0		0.0
		≧90cm	1	100.0	1	100.0		0.0		0.0		0.0
	30-39歳	<90cm	57	100.0	52	91.2	5	8.8		0.0		0.0
		≧90cm	5	100.0	3	60.0	2	40.0		0.0		0.0
	40-49歳	<90cm	42	100.0	31	73.8	9	21.4	2	4.8		0.0
		≧90cm	12	100.0	5	41.7	5	41.7	1	8.3	1	8.3
	50-59歳	<90cm	53	100.0	22	41.5	23	43.4	8	15.1		0.0
		≧90cm	23	100.0	3	13.0	11	47.8	5	21.7	4	17.4
	60-69歳	<90cm	45	100.0	6	13.3	28	62.2	7	15.6	4	8.9
		≧90cm	38	100.0	4	10.5	15	39.5	12	31.6	7	18.4
	70歳以上	<90cm	59	100.0	7	11.9	29	49.2	17	28.8	6	10.2
		≧90cm	49	100.0	3	6.1	21	42.9	20	40.8	5	10.2
	(再掲)	40-74歳	<90cm	155	100.0	64	41.3	67	43.2	20	12.9	4
		≧90cm	94	100.0	13	13.8	41	43.6	24	25.5	16	17.0
65-74歳		<90cm	36	100.0	6	16.7	19	52.8	8	22.2	3	8.3
		≧90cm	36	100.0	1	2.8	17	47.2	13	36.1	5	13.9
75歳以上		<90cm	44	100.0	2	4.5	22	50.0	14	31.8	6	13.6
		≧90cm	28	100.0	2	7.1	11	39.3	14	50.0	1	3.6

