

第6部 生活習慣調査

—集計結果表—


目 次

第6部 生活習慣調査

調査実施者の性・年齢階級別人員構成	224
表1 朝食の状況（性・年齢階級別）	225
表1-1 朝食を食べない理由（性・年齢階級別）	226
表2 平日の夕食は何時頃か（性・年齢階級別）	227
表3 夕食後の飲食の頻度（性・年齢階級別）	228
表4 健康増進のために意識的に運動をこころがけているか（性・年齢階級別）	229
表4-1 運動ができない理由	230
表5 ふだんの生活でストレスを感じるか（性・年齢階級別）	238
表5-1 悩みやストレスの理由（性・年齢階級別）	239
表5-2 あなたのまわりにはどのような人がいるか（性・年齢階級別）	240
表6 休養についてどう思うか（性・年齢階級別）	241
表7 睡眠で十分な休養がとれているか（性・年齢階級別）	242
表8 睡眠時間は（性・年齢階級別）	243
表9 飲酒の頻度（性・年齢階級別）	244
表9-1 飲酒日1日当たりの飲酒量（性・年齢階級別）	245
表10 はじめて酒を飲んだ時期は（性・年齢階級別）	246
表11 「節度ある適度な飲酒量」を知っているか（性・年齢階級別）	247
表12 タバコが健康に与える影響についてどう思うか（性・年齢階級別）	248
表13 喫煙経験（性・年齢階級別）	255
表14 喫煙の状況（性・年齢階級別）	256
表14-1 禁煙に対する意欲について（性・年齢階級別）	257
表15 1日の喫煙本数（性・年齢階級別）	258
表16 健診や人間ドックを受診したか（性・年齢階級別）	259
表16-1 健診結果で指摘を受けたか（性・年齢階級別）	260
表16-2 指摘を受けた内容（性・年齢階級別）	261
表16-3 保健指導の有無（性・年齢階級別）	262
表16-3付問 指導内容を実行しているか（性・年齢階級別）	263
表16-4 医療機関の受診勧奨（性・年齢階級別）	264
表16-4付問 医療機関へ行ったか（性・年齢階級別）	265
表17 メタボリックシンドロームの概念を知っている者（性・年齢階級別）	266
表18-1 医師からメタボリック症候群と言われた人の状況（性・年齢階級別）	267
表18-2 医師から高血圧と言われた人の状況（性・年齢階級別）	268
表18-2-1 医師から高血圧と言われた人の治療状況（性・年齢階級別）	269
表18-3 医師から糖尿病と言われた人の状況（性・年齢階級別）	270
表18-3-1 医師から糖尿病と言われた人の治療状況（性・年齢階級別）	271
表18-4 医師から血中の脂質異常と言われた人の状況（性・年齢階級別）	272
表18-4-1 医師から血中の脂質異常と言われた人の治療状況（性・年齢階級別）	273
表18-5 医師から何も言われたことがない人の状況（性・年齢階級別）	274
表18-5-1 治療を受けている疾患がない人の状況（性・年齢階級別）	275
表19 がん健診を受けているか（性・年齢階級別）	276
表19-1 がん健診を受けない理由（性・年齢階級別）	277
表20 歯をみがく頻度（性・年齢階級別）	278
表21 歯間ブラシやフロスを使用するか（性・年齢階級別）	279
表22 歯科健診や治療を受けているか（性・年齢階級別）	280
表22-1 歯科健診や治療を受けた理由（性・年齢階級別）	281
表23 「8020運動」の認知（性・年齢階級別）	282
表24 「健康おきなわ21」の認知（性・年齢階級別）	283
表25 「チャーガンジューおきなわ9か条」の認知（性・年齢階級別）	284
表26 「チャーガンジューおきなわ応援団」の認知（性・年齢階級別）	285

第6部 生活習慣調査



調査実施者の性・年齢階級別人員構成



	1- 6	7-14	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-74	75-79	80歳以上	総計
男性 761人			55	85	98	97	135	147	57	46	41	761
女性 827人			51	72	124	106	150	133	50	55	86	827
男女計			106	157	222	203	285	280	107	101	127	1,588

表1 朝食の状況(性・年齢階級別)

性別	問1 朝食を食べるか	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1.ほとんど毎日食べる	43	44	55	62	103	131	134	572	529
	2.週4~5日食べる	6	7	9	10	7	5	1	45	39
	3.週2~3日食べる	1	12	8	8	5	3	2	39	38
	4.ほとんど食べない	5	22	26	17	20	8	7	105	100
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	761	706
女	1.ほとんど毎日食べる	37	50	80	79	120	121	181	668	631
	2.週4~5日食べる	6	7	13	3	8		4	41	35
	3.週2~3日食べる	2	5	12	8	6	4		37	35
	4.ほとんど食べない	6	10	19	16	16	8	6	81	75
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	827	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	1588	1482



* 年齢階級別にみた朝食欠食者の割合







表1-1 朝食を食べない理由(性・年齢階級別)

問1で、2~4を選択したもの:朝食欠食者

性別	問1-1 食べない理由?	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1.時間がない	5	12	11	11	4	3	1	47	42
	2.食欲がわかない	4	11	8	7	5	3	4	42	38
	3.朝食を食べるより寝ていたい	2	11	9	4	6			32	30
	4.減量(ダイエット)のため		1	1		4	1		7	7
	5.朝食が用意されていない			1	3	1	1		6	6
	6.以前から食べる習慣がない	1	4	12	7	10	6	4	44	43
	7.その他		2	1	3	1	2	1	10	10
	無回答					1			1	1
男 集計		12	41	43	35	32	16	10	189	177
女	1.時間がない	4	6	16	13	6	2	1	49	45
	2.食欲がわかない	4	5	13	4	11	4	2	43	39
	3.朝食を食べるより寝ていたい	2	6	9	2		2		21	19
	4.減量(ダイエット)のため			1		2	1		4	4
	5.朝食が用意されていない		1				1		2	2
	6.以前から食べる習慣がない	1	1	5	6	9	2	4	28	27
	7.その他	3	3		2	2		3	13	10
	無回答									
女 集計		14	22	44	27	30	12	10	159	145
総計		26	63	87	62	62	28	20	348	322



* 年齢階級別にみた朝食欠食の理由







表2 平日の夕食は何時頃か(性・年齢階級別)

性別	問2 夕食時間	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1.午後6時まで	4	11	7	13	11	9	11	66	62
	2.午後6時～8時まで	38	41	76	60	87	104	96	502	464
	3.午後8時～10時まで	12	28	14	22	30	27	32	165	153
	4.午後10時以降	1	4	1	2	7	7	5	27	26
	無回答		1						1	1
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	761	706
女	1.午後6時まで	5	6	9	11	10	13	13	67	62
	2.午後6時～8時まで	40	55	81	68	103	93	129	569	529
	3.午後8時～10時まで	6	9	28	24	31	22	43	163	157
	4.午後10時以降		2	5	3	6	5	6	27	27
	無回答			1					1	1
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	827	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	1588	1482



* 年齢階級別にみた夕食時間が午後8時以降の者の割合







表3 夕食後の飲食の頻度(性・年齢階級別)

性別	問3 夕食後の飲食	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1.ほとんど毎日食べる	12	21	14	20	20	25	19	131	119
	2.週に3~4回食べる	11	14	20	20	18	18	14	115	104
	3.週に1~2回食べる	20	27	37	31	56	41	39	251	231
	4.まったく食べない	12	22	27	26	41	63	72	263	251
	無回答		1						1	1
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	761	706
女	1.ほとんど毎日食べる	11	11	18	15	24	24	28	131	120
	2.週に3~4回食べる	16	7	23	14	19	11	7	97	81
	3.週に1~2回食べる	19	32	54	51	54	48	33	291	272
	4.まったく食べない	5	22	29	26	53	50	122	307	302
	無回答							1	1	1
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	827	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	1588	1482



* 年齢階級別にみた夕食後に飲食する者の割合







表4 健康増進のために意識的に運動をころがけているか(性・年齢階級別)

性別	問4 運動の有無	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1.はい	36	37	48	30	56	82	92	381	345
	2.いいえ	19	48	50	67	79	65	52	380	361
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	761	706
女	1.はい	23	20	25	32	62	78	100	340	317
	2.いいえ	28	52	99	74	88	55	91	487	459
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	827	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	1588	1482



* 年齢階級別にみた意識的に運動をころがけていない者の割合





表4-1 運動ができない理由

問4で2を選択した者：運動をこころがけていない者(重複回答あり)

性別	問4-1 運動ができない理由	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1 必要ないと思う	3	5	6	9	13	12	3	51	48
	2 時間に余裕がない	10	26	27	41	39	24	10	177	167
	3 めんどうだから	5	25	24	21	27	24	14	140	135
	4 嫌いだから	1	3	3	4	6	5	6	28	27
	5 効果があると思えない	0	0	1	2	1	0	0	4	4
	6 病気や身体上の理由	0	3	2	3	9	10	18	45	45
	7 その他	2	0	6	6	7	8	13	42	40
男 集計		19	48	50	67	79	65	52	380	361
女	1 必要ないと思う	2	1	2	4	2	1	14	26	24
	2 時間に余裕がない	17	34	66	48	52	27	9	253	236
	3 めんどうだから	8	20	38	23	28	12	9	138	130
	4 嫌いだから	3	2	14	8	17	9	2	55	52
	5 効果があると思えない	0	0	1	1	1	1	0	4	4
	6 病気や身体上の理由	0	3	3	5	10	15	54	90	90
	7 その他	5	6	9	9	9	4	14	56	51
女 集計		28	52	99	74	88	55	91	487	459
総計		47	100	149	141	167	120	143	867	820






表4-1-1 運動をしない理由：必要ないと思うから

問4で2を選択した者：運動をこころがけていない者

性別	問4-1-1必要ないと思うから	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	選択あり	3	5	6	9	13	12	3	51	48
	選択なし	16	43	44	58	66	53	49	329	313
男 集計		19	48	50	67	79	65	52	380	361
女	選択あり	2	1	2	4	2	1	14	26	24
	選択なし	26	51	97	70	86	54	77	461	435
女 集計		28	52	99	74	88	55	91	487	459
総計		47	100	149	141	167	120	143	867	820



* 年齢階級別にみた運動ができない理由の割合







表4-1-2運動をしない理由:時間に余裕がないから

問4で2を選択した者:運動をこころがけていない者

性別	問4-1-2時間に余裕がないから	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	選択あり	10	26	27	41	39	24	10	177	167
	選択なし	9	22	23	26	40	41	42	203	194
男 集計		19	48	50	67	79	65	52	380	361
女	選択あり	17	34	66	48	52	27	9	253	236
	選択なし	11	18	33	26	36	28	82	234	223
女 集計		28	52	99	74	88	55	91	487	459
総計		47	100	149	141	167	120	143	867	820



* 年齢階級別にみた運動ができない理由の割合







表4-1-3運動をしない理由:めんどうだから

問4で2を選択した者:運動をこころがけていない者

性別	問4-1-3めんどうだから	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	選択あり	5	25	24	21	27	24	14	140	135
	選択なし	14	23	26	46	52	41	38	240	226
男 集計		19	48	50	67	79	65	52	380	361
女	選択あり	8	20	38	23	28	12	9	138	130
	選択なし	20	32	61	51	60	43	82	349	329
女 集計		28	52	99	74	88	55	91	487	459
総計		47	100	149	141	167	120	143	867	820



*年齢階級別にみた運動ができない理由の割合







表4-1-4運動をしない理由：身体を動かすことが嫌い

問4で2を選択した者：運動をこころがけていない者

性別	問4-1-4身体を動かすことが嫌い	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	選択あり	1	3	3	4	6	5	6	28	27
	選択なし	18	45	47	63	73	60	46	352	334
男 集計		19	48	50	67	79	65	52	380	361
女	選択あり	3	2	14	8	17	9	2	55	52
	選択なし	25	50	85	66	71	46	89	432	407
女 集計		28	52	99	74	88	55	91	487	459
総計		47	100	149	141	167	120	143	867	820



* 年齢階級別にみた運動ができない理由の割合







表4-1-5運動をしない理由:効果があると思えない

問4で2を選択した者: 運動をこころがけていない者

性別	問4-1-5効果があると思えない	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	選択あり			1	2	1			4	4
	選択なし	19	48	49	65	78	65	52	376	357
男 集計		19	48	50	67	79	65	52	380	361
女	選択あり			1	1	1	1		4	4
	選択なし	28	52	98	73	87	54	91	483	455
女 集計		28	52	99	74	88	55	91	487	459
総計		47	100	149	141	167	120	143	867	820



* 年齢階級別にみた運動ができない理由の割合







表4-1-6運動をしない理由:病気や身体上の理由がある

問4で2を選択した者:運動をこころがけていない者

性別	問4-1-6病気や身体上の理由	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	選択あり		3	2	3	9	10	18	45	45
	選択なし	19	45	48	64	70	55	34	335	316
男 集計		19	48	50	67	79	65	52	380	361
女	選択あり		3	3	5	10	15	54	90	90
	選択なし	28	49	96	69	78	40	37	397	369
女 集計		28	52	99	74	88	55	91	487	459
総計		47	100	149	141	167	120	143	867	820



* 年齢階級別にみた運動ができない理由の割合







表4-1-7運動をしない理由:その他

問4で2を選択した者：運動をこころがけていない者

性別	問4-1-7その他	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	選択あり	2		6	6	7	8	13	42	40
	選択なし	17	48	44	61	72	57	39	338	321
男 集計		19	48	50	67	79	65	52	380	361
女	選択あり	5	6	9	9	9	4	14	56	51
	選択なし	23	46	90	65	79	51	77	431	408
女 集計		28	52	99	74	88	55	91	487	459
総計		47	100	149	141	167	120	143	867	820



* 年齢階級別にみた運動ができない理由の割合







表5 ふだんの生活でストレスを感じるか(性・年齢階級別)

性別	問5 ストレスを感じるか	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1.非常にある	5	11	11	16	19	11	6	79	74
	2.ややある	13	37	48	40	56	41	36	271	258
	3.あまりない	27	33	32	35	53	75	59	314	287
	4.まったくない	10	4	6	6	7	20	43	96	86
	無回答			1					1	1
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	761	706
女	1.非常にある	6	10	11	13	24	9	15	88	82
	2.ややある	21	33	72	63	56	53	53	351	330
	3.あまりない	18	26	39	28	65	65	77	318	300
	4.まったくない	6	3	2	2	5	6	45	69	63
	無回答							1	1	1
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	827	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	1588	1482



* 年齢階級別にみたストレスを感じている者の割合





表5-1 悩みやストレスの理由(性・年齢階級別)

問5で1,2を選択した者: ストレスのある者(重複回答あり)

性別	問5-1 悩んでいること	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1 仕事上のこと	2	35	49	45	51	25	5	212	210
	2 人間関係	9	19	21	22	26	19	10	126	117
	3 生きがい・将来のこと	6	23	15	11	15	17	7	94	88
	4 自分の健康・病気	1	3	7	11	21	18	25	86	85
	5 家族の健康・病気	0	1	1	5	8	21	14	50	50
	6 収入・家計・借金	1	16	19	25	35	16	7	119	118
	7 出産・育児	0	0	1	0	0	0	0	1	1
	8 子供の教育	0	1	4	7	8	0	2	22	22
	9 自分の学業	4	2	2	5	6	2	2	23	19
	10 その他	0	1	1	2	1	2	4	11	11
男 集計		18	48	59	56	75	52	42	350	332
女	1 仕事上のこと	3	19	43	39	32	8	1	145	142
	2 人間関係	17	20	36	27	32	21	7	160	143
	3 生きがい・将来のこと	6	15	22	10	20	19	15	107	101
	4 自分の健康・病気	0	3	9	11	24	30	45	122	122
	5 家族の健康・病気	2	2	9	18	26	30	28	115	113
	6 収入・家計・借金	3	16	44	37	42	15	10	167	164
	7 出産・育児	0	6	14	4	1	0	0	25	25
	8 子供の教育	0	1	14	26	12	1	3	57	57
	9 自分の学業	0	1	2	3	9	5	4	24	24
	10 その他	0	2	3	3	1	0	1	10	10
女 集計		27	43	83	76	80	62	68	439	412
総計		45	91	142	132	155	114	110	789	744

* 年齢階級別にみたストレスを感じている者の割合




表5-2 あなたのまわりにはどのような人がいるか(性・年齢階級別)

問5で1,2を選択した者: ストレスのある者(重複回答あり)

性別	問5-1 悩んでいること	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	ア 安心できる人	17	37	49	40	60	38	34	275	258
	イ 悩みを相談できる人	16	37	47	39	53	33	30	255	239
	ウ 話し合う事のできる人	17	34	41	42	54	35	30	253	236
	エ 支持してくれる人	17	37	49	41	56	36	31	267	250
男 集計		18	48	59	56	75	52	42	350	332
女	ア 安心できる人	26	40	68	66	65	49	57	371	345
	イ 悩みを相談できる人	25	42	69	65	68	52	59	380	355
	ウ 話し合う事のできる人	26	41	68	65	67	48	56	371	345
	エ 支持してくれる人	26	41	68	66	66	48	58	373	347
女 集計		27	43	83	76	80	62	68	439	412
総計		45	91	142	132	155	114	110	789	744

* 年齢階級別にみたストレスを感じている者の割合







表6 休養についてどう思うか(性・年齢階級別)

性別	問6 休養は？	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1.充分にとれている	14	15	20	13	29	63	72	226	212
	2.まあまあとれている	28	50	47	44	73	73	62	377	349
	3.不足がち	10	15	28	30	25	8	8	124	114
	4.不足	3	5	2	10	8	3	2	33	30
	無回答			1					1	1
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	761	706
女	1.充分にとれている	7	15	18	20	29	37	100	226	219
	2.まあまあとれている	35	40	71	57	79	76	77	435	400
	3.不足がち	9	12	21	25	29	17	9	122	113
	4.不足		5	14	4	13	3	3	42	42
	無回答							2	2	2
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	827	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	1588	1482



* 年齢階級別にみた休養不足の者の割合







表7 睡眠で十分な休養がとれているか(性・年齢階級別)

性別	問7 睡眠は？	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳	(再掲) 75歳以上	総計 (20歳以上)
男	1.充分にとれている	13	23	25	22	34	61	80	84	142	58	55	245
	2.まあまあとれている	29	42	54	39	72	71	54	159	207	48	29	332
	3.あまりとれていない	11	16	18	32	27	15	10	71	81	10	3	118
	4.まったくとれていない	2	4		4	2			6	6			10
	無回答			1									1
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	320	436	116	87	706
女	1.充分にとれている	10	23	22	22	36	49	104	79	130	51	81	256
	2.まあまあとれている	36	38	72	61	78	66	68	181	230	49	43	383
	3.あまりとれていない	4	8	25	23	32	17	17	67	73	6	16	122
	4.まったくとれていない	1	3	5		4	1		5	5			13
	無回答							2		1	1	1	2
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	332	439	107	141	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	652	875	223	228	1482



* 年齢階級別にみた睡眠不足の者の割合







表8 睡眠時間は(性・年齢階級別)

性別	問8 睡眠時間は？	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1. 5時間未満	8	6	4	13	11	7	8	57	49
	2. 5時間以上6時間未満	7	24	31	33	37	37	30	199	192
	3. 6時間以上7時間未満	26	35	43	36	50	59	41	290	264
	4. 7時間以上8時間未満	7	16	18	8	26	28	30	133	126
	5. 8時間以上9時間未満	7	2	1	6	9	13	23	61	54
	6. 9時間以上		2		1	1	2	3	11	19
	無回答			1					1	2
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	761	706
女	1. 5時間未満	2	9	12	9	25	13	20	90	88
	2. 5時間以上6時間未満	19	21	38	33	44	48	32	235	216
	3. 6時間以上7時間未満	16	19	48	48	55	47	69	302	286
	4. 7時間以上8時間未満	8	17	23	15	19	19	38	139	131
	5. 8時間以上9時間未満	5	5	3	1	5	5	22	46	41
	6. 9時間以上	1	1			1	1	8	12	11
	無回答							1	2	3
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	827	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	1588	1482



* 年齢階級別にみた睡眠時間の分布







表9 飲酒の頻度(性・年齢階級別)

性別	問9 酒を飲むか	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1.毎日		7	19	22	28	34	25	135	135
	2.週に5~6日		5	14	10	20	12	8	69	69
	3.週に3~4日		4	15	14	18	13	15	79	79
	4.週に1~2日	1	22	9	16	20	18	11	97	96
	5.月に1~3日	1	17	16	9	17	21	8	89	88
	6.やめた(1年以上やめている)	1	2	1	4	12	12	25	57	56
	7.ほとんど飲まない(飲めない)	52	28	23	22	19	37	52	233	181
	無回答			1			1		2	2
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	761	706
女	1.毎日		3	9	6	5	1	1	25	25
	2.週に5~6日		2	5	6	2	1	1	17	17
	3.週に3~4日		4	9	8	9	6	6	36	36
	4.週に1~2日	1	8	26	9	7	2	2	55	54
	5.月に1~3日		18	18	23	11	9	1	80	80
	6.やめた(1年以上やめている)		5	4	3	6	1		19	19
	7.ほとんど飲まない(飲めない)	50	32	53	51	110	112	185	593	543
	無回答						1		2	2
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	827	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	1588	1482



* 年齢階級別にみた飲酒している者の割合







表9-1 飲酒日の1日当たりの飲酒量(性・年齢階級別)

問9で1~5を選択した者：飲酒している者

性別	問9-1 酒の量は？	年齢階級							再掲				総計 (20歳以上)
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	40~64歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	
男	1. 1合(180ml)未満	1	7	8	11	14	28	32	45	64	19	21	100
	2. 1合以上2合(360ml)未満	1	14	24	26	39	40	25	88	121	33	9	168
	3. 2合以上3合(540ml)未満		12	22	18	33	21	6	62	75	13	3	112
	4. 3合以上4合(720ml)未満		7	7	9	10	7	2	24	27	3	1	42
	5. 4合以上5合(900ml)未満		3	8	4	4	1	1	8	10	2		21
	6. 5合(900ml)以上		12	4	3	3	1	1	6	7	1	1	24
無回答													
男 集計		2	55	73	71	103	98	67	233	304	71	35	467
女	1. 1合(180ml)未満		5	17	28	11	12	5	47	55	8	1	78
	2. 1合以上2合(360ml)未満		13	24	11	12	5		26	28	2		65
	3. 2合以上3合(540ml)未満		13	15	9	7	2		17	18	1		46
	4. 3合以上4合(720ml)未満		2	7		1			1	1			10
	5. 4合以上5合(900ml)未満				3				3	3			3
	6. 5合(900ml)以上	1	2	2	1	3			4	4			8
無回答				2									2
女 集計		1	35	67	52	34	19	5	98	109	11	1	212
総計		3	90	140	123	137	117	72	331	413	82	36	679



* 年齢階級別にみた飲酒量の分布








表10 はじめて酒を飲んだ時期は(性・年齢階級別)

		問9で1~6を選択した者：飲酒している(いた)者								
性別	問10 はじめて飲酒したのは何歳?	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計(20歳以上)
男	15歳未満	1	3	2	1	2			9	8
	15-19歳	1	27	38	41	63	44	29	243	242
	20-24歳	1	26	32	29	48	58	44	238	237
	25-29歳			2	2	1	3	8	16	16
	30歳以上			1	1	1	5	9	16	16
	無回答		1		1				2	4
男 集計		3	57	74	75	115	110	92	526	523
女	15歳未満		4	2	1				7	7
	15-19歳	1	13	20	16	7	2	1	60	59
	20-24歳		23	44	37	23	11	1	139	139
	25-29歳			1	1	3	1		6	6
	30歳以上					5	6	3	14	14
	無回答			4		2			6	6
女 集計		1	40	71	55	40	20	5	232	231
総計		4	97	145	130	155	130	97	758	754



* 年齢階級別にみた飲酒開始年齢の分布



問9で1~6を選択した者：飲酒している(いた)者






表11 「節度ある適度な飲酒量」を知っているか(性・年齢階級別)

性別	問11 節度ある飲酒量を知っている?	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1.はい	9	24	33	31	50	49	39	235	226
	2.いいえ	46	60	64	66	84	98	104	522	476
	無回答		1	1		1		1	4	4
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	761	706
女	1.はい	4	16	37	42	41	25	24	189	185
	2.いいえ	47	56	87	64	109	107	166	636	589
	無回答						1	1	2	2
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	827	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	1588	1482



* 年齢階級別にみた節度ある飲酒量を知っている者の割合









表12 タバコが健康に与える影響についてどう思うか(性・年齢階級別)

—ア. 肺がん—

性別	問12- ア 肺がん	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1.影響ある	50	73	89	89	116	129	114	660	610
	2.どちらともいえない		4	6	6	12	12	4	44	44
	3.たばこと関係ない		1		1		2	8	12	12
	4.わからない	5	7	2	1	6	4	18	43	38
	無回答			1		1			2	2
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	761	706
女	1.影響ある	49	69	117	99	138	123	154	749	700
	2.どちらともいえない		2	4	5	7	3	3	24	24
	3.たばこと関係ない			1		1	1	2	5	5
	4.わからない	1	1	2	2	4	5	28	43	42
	無回答	1						1	6	5
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	827	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	1588	1482





* 年齢階級別にみたタバコ影響度認識状況の分布





—イ. ぜんそく—

性別	問12- イ ぜんそく	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1.影響ある	41	62	74	70	108	118	95	568	527
	2.どちらともいえない	6	4	10	18	8	15	4	65	59
	3.たばこ関係ない		6	3	5	4	4	11	33	33
	4.わからない	8	13	10	4	14	10	32	91	83
	無回答			1		1		2	4	4
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	761	706
女	1.影響ある	37	61	101	88	128	111	128	654	617
	2.どちらともいえない	6	4	9	9	8	6	6	48	42
	3.たばこ関係ない		3	5	3	4	2	6	23	23
	4.わからない	7	4	9	6	10	14	47	97	90
	無回答	1						4	5	4
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	827	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	1588	1482





* 年齢階級別にみたタバコ影響度認識状況の分布





—ウ. 心臓病—

性別	問12- ウ 心臓病	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1.影響ある	36	58	63	71	96	110	81	515	479
	2.どちらともいえない	6	6	17	13	17	14	8	81	75
	3.たばこ関係ない		5	4	3	4	4	7	27	27
	4.わからない	13	16	13	10	17	19	47	135	122
	無回答			1		1		1	3	3
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	761	706
女	1.影響ある	29	53	86	79	110	89	117	563	534
	2.どちらともいえない	5	8	18	15	18	15	7	86	81
	3.たばこ関係ない	3	1	5	3	3	3	6	24	21
	4.わからない	13	10	15	9	19	25	57	148	135
	無回答	1						1	6	5
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	827	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	1588	1482





* 年齢階級別にみたタバコ影響度認識状況の分布





—工. 脳卒中—

性別	問12- 工 脳卒中	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1.影響ある	34	54	68	72	97	98	72	495	461
	2.どちらともいえない	5	6	12	13	16	14	12	78	73
	3.たばこ関係ない	1	8	4	3	2	5	12	35	34
	4.わからない	15	17	13	9	19	30	47	150	135
	無回答			1		1		1	3	3
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	761	706
女	1.影響ある	30	49	88	73	108	79	97	524	494
	2.どちらともいえない	5	13	20	19	14	19	6	96	91
	3.たばこ関係ない		1	3	1	5	4	9	23	23
	4.わからない	15	9	13	13	23	30	75	178	163
	無回答	1						1	6	5
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	827	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	1588	1482





* 年齢階級別にみたタバコ影響度認識状況の分布





—オ. 胃かいよう—

性別	問12- オ 胃かいよう	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1.影響ある	26	29	36	37	57	75	60	320	294
	2.どちらともいえない	9	12	25	31	37	26	14	154	145
	3.たばこ関係ない	2	23	11	10	9	14	13	82	80
	4.わからない	18	21	25	19	31	32	56	202	184
	無回答			1		1		1	3	3
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	761	706
女	1.影響ある	18	32	51	49	72	59	94	375	357
	2.どちらともいえない	9	20	33	32	34	25	11	164	155
	3.たばこ関係ない	3	5	16	5	10	8	8	55	52
	4.わからない	20	15	24	20	34	40	74	227	207
	無回答	1					1	4	6	5
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	827	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	1588	1482





* 年齢階級別にみたタバコ影響度認識状況の分布





—カ. 妊娠に関連した異常—

性別	問12- カ 妊娠に関連した異常	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1.影響ある	43	70	77	79	101	111	90	571	528
	2.どちらともいえない	2	2	7	9	12	9	3	44	42
	3.たばこ関係ない		3		2		1	6	12	12
	4.わからない	10	10	13	7	21	24	44	129	119
	無回答			1		1	2	1	5	5
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	761	706
女	1.影響ある	43	68	109	100	137	118	139	714	671
	2.どちらともいえない		1	9	3	5	4	3	25	25
	3.たばこ関係ない	1					1	2	4	3
	4.わからない	6	3	6	3	8	9	43	78	72
	無回答	1					1	4	6	5
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	827	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	1588	1482





* 年齢階級別にみたタバコ影響度認識状況の分布



—キ. 歯周病—

性別	問12- キ 歯周病	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1.影響ある	38	44	53	43	68	65	55	366	328
	2.どちらともいえない	2	12	17	26	30	21	7	115	113
	3.たばこ関係ない		4	2	7	6	11	13	43	43
	4.わからない	15	25	25	21	30	50	68	234	219
	無回答			1		1		1	3	3
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	761	706
女	1.影響ある	29	52	73	64	73	54	83	428	399
	2.どちらともいえない	6	6	25	25	31	19	9	121	115
	3.たばこ関係ない	3	3	4	3	8	7	9	37	34
	4.わからない	12	11	22	14	38	52	86	235	223
	無回答	1					1	4	6	5
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	827	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	1588	1482



* 年齢階級別にみたタバコ影響度認識状況の分布







表13 喫煙経験(性・年齢階級別)

性別	問13 タバコを吸ったことがあるか	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	1.吸っている(100本以上または6ヶ月以上)	1	41	62	63	81	88	66	402	401
	2.吸ったことがある(100本未満または6ヶ月未満)	2	7	1	9	19	11	18	67	65
	3.まったく吸ったことがない	52	37	34	25	34	48	60	290	238
	無回答			1		1			2	2
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	761	706
女	1.吸っている(100本以上または6ヶ月以上)		11	33	22	30	13	4	113	113
	2.吸ったことがある(100本未満または6ヶ月未満)	1	2	7	6	8	4	9	37	36
	3.まったく吸ったことがない	49	59	84	78	112	114	176	672	623
	無回答	1					2	2	5	4
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	827	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	1588	1482



* 年齢階級別にみた喫煙者の割合







表14 喫煙の状況(性・年齢階級別)

		問13で1, 2を選択した者 : タバコを吸ったことのある者											
性別	問14 現在吸っているか	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳	(再掲) 75歳以上	総計 (20歳以上)
		男	1.毎日吸う	1	33	33	39	45	32	16	105	125	
	2.時々吸っている		3	2	3	4	3	2	10	12	2		17
	3.今は(この1ヶ月間)吸っていない	2	12	27	30	51	64	66	116	167	51	44	250
	無回答			1									1
男 集計		3	48	63	72	100	99	84	231	304	73	51	466
女	1.毎日吸う		3	15	10	21	8	1	36	39	3	1	58
	2.時々吸っている	1		2									2
	3.今は(この1ヶ月間)吸っていない		10	23	18	17	9	12	42	44	2	12	89
	無回答												
女 集計		1	13	40	28	38	17	13	78	83	5	13	149
総計		4	61	103	100	138	116	97	309	387	78	64	615



* 年齢階級別にみた現在(この1ヶ月)の喫煙状況の分布

問13で1, 2を選択した者 : タバコを吸ったことのある者







表14-1 禁煙に対する意欲について(性・年齢階級製)

問14で1, 2を選択した者 : 現在タバコを吸っている者

性別	問14-1 タバコを止めたいと思うか	現在タバコを吸っている者												総計 (20歳以上)
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳	(再掲) 75歳以上		
男	1.強く思う		4	4	9	4	3	7	15	19	4	4	31	
	2.思う		21	26	21	36	18	7	70	80	10	2	129	
	3.思わない	1	11	5	12	9	14	4	30	38	8	1	55	
	無回答													
男集計		1	36	35	42	49	35	18	115	137	22	7	215	
女	1.強く思う			3	1	6	4		8	11	3		14	
	2.思う	1	3	11	5	11	4	1	20	20		1	35	
	3.思わない			3	4	4			8	8			11	
	無回答													
女集計		1	3	17	10	21	8	1	36	39	3	1	60	
総計		2	39	52	52	70	43	19	151	176	25	8	275	



* 年齢階級別にみた禁煙意志の分布

問14で1, 2を選択した者 : 現在タバコを吸っている者







表15 1日の喫煙本数(性・年齢階級別)

問14で1～3を選択した者：現在または過去喫煙者

性別	問15 タバコの本数	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	総計	総計 (20歳以上)
男	10本未満	1	9	7	7	10	8	7	49	48
	10-19本	2	16	25	16	28	28	21	136	134
	20-29本		22	22	35	40	32	34	185	185
	30-39本			4	6	6	6	3	25	25
	40-59本		1	1	7	11	15	11	46	46
	60本以上					1	2	2	5	5
無回答			3	1	4	8	6	22	22	22
男集計		3	48	62	72	100	99	84	468	465
女	10本未満	1	3	6	6	8	4	7	35	34
	10-19本		4	16	14	22	8	3	67	67
	20-29本		5	12	7	6	3	3	36	36
	30-39本			2					2	2
	40-59本		1			2	1		4	4
	60本以上									
無回答			4	1	2	2	1	8	8	8
女集計		1	13	40	28	38	18	14	152	151
総計		4	61	102	100	138	117	98	620	616



* 年齢階級別にみた喫煙本数の分布

問14で1～3を選択した者：現在または過去喫煙者







表16 健診や人間ドッグを受診したか(性・年齢階級別)

性別	問16 健診の有無	年齢階級							(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	総計 (20歳以上)	
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	40~64歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上		
男	1.ある	13	43	68	65	101	100	97	220	305	85	58	474	
	2.ない	42	42	30	32	34	47	46	100	131	31	28		231
	無回答							1				1		
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	320	436	116	87	706	
女	1.ある	17	38	66	69	95	87	131	211	286	75	96	486	
	2.ない	34	34	58	37	55	45	59	120	152	32	44		288
	無回答							1	1	1		1		
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	332	439	107	141	776	
総計		106	157	222	203	285	280	335	652	875	223	228	1482	



* 年齢階級別にみた健診を受診した者の割合







表16-1 健診結果で指摘を受けたか(性・年齢階級別)

		問16で1を選択した者：健診を受けた者											
性別	問16-1指摘を受けたか	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳	(再掲) 75歳以上	総計 (20歳以上)
		男	1.はい	3	13	30	42	76	76	75	157	228	
	2.いいえ	10	30	38	23	25	24	22	63	77	14	17	162
	無回答												
男 集計		13	43	68	65	101	100	97	220	305	85	58	474
女	1.はい		3	16	30	59	64	95	119	180	61	68	267
	2.いいえ	17	35	50	39	36	23	35	92	106	14	27	218
	無回答							1				1	1
女 集計		17	38	66	69	95	87	131	211	286	75	96	486
総計		30	81	134	134	196	187	228	431	591	160	154	960



* 年齢階級別にみた健診結果で指摘を受けた者の割合

問16で1を選択した者：健診を受けた者





表16-2 指摘を受けた内容(性・年齢階級別)

問16-1で1を選択した者：指摘を受けたもの(重複回答あり)

性別	問16-2 指摘事項	問16-1で1を選択した者：指摘を受けたもの(重複回答あり)											総計 (20歳以上)
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳	(再掲) 75歳以上	
男	1 肥満	1	8	19	22	33	35	20	77	101	24	9	137
	2 高血圧	0	2	7	11	41	52	47	76	124	48	27	160
	3 糖尿病	2	0	4	10	12	19	12	33	47	14	6	57
	4 脂質異常	0	5	20	24	36	26	26	75	102	27	10	137
男 集計		3	13	30	42	76	76	75	157	228	71	41	312
女	1 肥満	0	2	5	18	25	22	26	57	76	19	15	98
	2 高血圧	0	0	3	10	26	36	59	54	84	30	47	134
	3 糖尿病	0	0	0	2	7	18	14	18	32	14	9	41
	4 脂質異常	0	1	13	14	30	31	38	61	89	28	24	127
女 集計		0	3	16	30	59	64	95	119	180	61	68	267
総計		3	16	46	72	135	140	170	276	408	132	109	579










表16-3 保健指導の有無(性・年齢階級別)

		問16-1で1を選択した者：指摘を受けた者											
性別	問16-3 保健指導の有無	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳	(再掲) 75歳以上	総計 (20歳以上)
		男	1.はい	1	5	11	29	56	43	57	105	157	
	2.いいえ	2	8	19	13	20	33	18	52	71	19	13	111
	無回答												
男	集計	3	13	30	42	76	76	75	157	228	71	41	312
女	1.はい		1	8	22	38	44	59	78	123	45	40	172
	2.いいえ		2	8	8	21	20	36	41	57	16	28	95
	無回答												
女	集計		3	16	30	59	64	95	119	180	61	68	267
総計		3	16	46	72	135	140	170	276	408	132	109	579



* 年齢階級別にみた保健指導を受けた者の割合



問16-1で1を選択した者:指摘を受けた者






表16-3-付問 指導内容の実行をしているか(性・年齢階級別)

問16-3で1を選択した者:指導を受けた者

性別	問16-3-付問	年齢階級							再掲				総計 (20歳以上)
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳	(再掲) 75歳以上	
男	1.おおむね実行している		1		8	23	21	34	39	67	28	19	87
	2.一部実行している	1	3	8	12	25	20	20	47	68	21	9	88
	3.実行していない		1	3	9	6	2	1	17	18	1		22
	無回答					2		2	2	4	2		4
男 集計		1	5	11	29	56	43	57	105	157	52	28	201
女	1.おおむね実行している			2	4	13	22	34	24	50	26	23	75
	2.一部実行している			4	13	21	21	25	45	63	18	17	84
	3.実行していない		1	2	4	4	1		8	9	1		12
	無回答				1				1	1			1
女 集計			1	8	22	38	44	59	78	123	45	40	172
総計		1	6	19	51	94	87	116	183	280	97	68	373



* 年齢階級別にみた保健指導実行状況の分布

問16-3で1を選択した者:指導を受けた者







表16-4 医療機関の受診勧奨(性・年齢階級別)

		問16-1で1を選択した者：指摘を受けた者											
性別	問16-4 医療機関の受診勧奨	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳	(再掲) 75歳以上	総計 (20歳以上)
		男	1.はい	1		3	14	36	36	44	68	108	
	2.いいえ		5	7	15	20	7	13	37	49	12	6	67
	無回答	2	8	20	13	20	33	18	52	71	19	13	112
男 集計		3	13	30	42	76	76	75	157	228	71	41	312
女	1.はい			5	7	20	33	41	39	74	35	27	106
	2.いいえ		1	3	15	18	11	18	39	49	10	13	66
	無回答		2	8	8	21	20	36	41	57	16	28	95
女 集計			3	16	30	59	64	95	119	180	61	68	267
総計		3	16	46	72	135	140	170	276	408	132	109	579



* 年齢階級別にみた医療機関受診を勧められた者の割合

問16-1で1を選択した者：指摘を受けた者







表16-4-付問 医療機関へ行ったか(性・年齢階級別)

問16-4で1を選択した者：受診を勧められた者

性別	問16-4付問	問16-4で1を選択した者：受診を勧められた者										総計 (20歳以上)	
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上
男	1.はい	1		3	10	29	33	41	55	92	37	21	116
	2.いいえ				4	7	3	3	13	16	3	1	17
	無回答												
男 集計		1		3	14	36	36	44	68	108	40	22	133
女	1.はい			1	6	19	32	37	37	70	33	24	95
	2.いいえ			4	1	1	1	4	2	4	2	3	11
	無回答												
女 集計				5	7	20	33	41	39	74	35	27	106
総計		1		8	21	56	69	85	107	182	75	49	239



* 年齢階級別にみた医療機関を受診した者の割合

問16-4で1を選択した者：受診を勧められた者







表17 メタボリックシンドロームの概念を知っている者(性・年齢階級別)

性別	問17 メタボリックの内容	年齢階級							再掲				総計 (20歳以上)
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	40~64歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	
男	1.内容を知っている	15	40	57	65	92	97	71	214	294	80	31	422
	2.言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	33	37	34	27	40	42	33	94	116	22	26	213
	3.知らない(今回の調査で始めて聞いた場合を含む)	7	8	6	5	3	8	40	12	26	14	30	70
	無回答			1									1
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	320	436	116	87	706
女	1.内容を知っている	12	41	70	79	109	97	85	245	320	75	50	481
	2.言葉を聞いたことはあるが内容は知らない	27	24	52	25	34	25	46	73	95	22	35	206
	3.知らない(今回の調査で始めて聞いた場合を含む)	12	7	2	2	7	10	59	13	23	10	55	87
	無回答						1	1	1	1		1	2
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	332	439	107	141	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	652	875	223	228	1482



* 年齢階級別にみたメタボリックシンドロームの内容把握状況の分布







表18-1 医師からメタボリック症候群といわれた人の状況(性・年齢階級別)

性別	問18 メタボリック と言われた								(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	総計 (20歳以上)
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	40~64歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	
男	1.あり		7	17	23	30	29	17	73	93	20	6	123
	2.なし	55	78	81	74	105	118	127	247	343	96	81	583
	無回答												
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	320	436	116	87	706
女	1.あり		1	4	10	9	16	6	29	37	8	4	46
	2.なし	51	71	120	96	141	117	185	303	402	99	137	730
	無回答												
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	332	439	107	141	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	652	875	223	228	1482



* 年齢階級別にみたメタボリックといわれたことのある者の割合







表18-2 医師から高血圧といわれた人の状況(性・年齢階級別)

性別	問18 高血圧と言われた	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳	(再掲) 75歳以上	総計 (20歳以上)
男	1.あり		5	14	13	50	82	80	108	180	72	45	244
	2.なし	55	80	84	84	85	65	64	212	256	44	42	462
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	320	436	116	87	706
女	1.あり		2	6	17	41	52	97	86	135	49	72	215
	2.なし	51	70	118	89	109	81	94	246	304	58	69	561
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	332	439	107	141	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	652	875	223	228	1482



* 年齢階級別にみた高血圧といわれたことのある者の割合







表18-2-1 医師から高血圧といわれた人の治療状況(性・年齢階級別)

問18で2を選択した者：高血圧といわれたことがある者

性別	問18-1 高血圧治療の有無	問18で2を選択した者：高血圧といわれたことがある者											総計 (20歳以上)
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳	(再掲) 75歳以上	
男	1.あり			4	8	39	70	74	86	149	63	42	195
	2.なし		5	10	5	11	12	6	22	31	9	3	49
男 集計			5	14	13	50	82	80	108	180	72	45	244
女	1.あり			4	13	33	46	93	69	115	46	70	189
	2.なし		2	2	4	8	6	4	17	20	3	2	26
女 集計			2	6	17	41	52	97	86	135	49	72	215
総計			7	20	30	91	134	177	194	315	121	117	459



* 年齢階級別にみた高血圧治療状況の分布

問18で2を選択した者：高血圧といわれたことがある者







表18-3 医師から糖尿病といわれた人の状況(性・年齢階級別)

性別	問18 糖尿病 と言われた	年齢階級							(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	総計 (20歳以上)
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	40~64歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	
男	1.あり	1		3	11	13	25	21	42	58	16	12	73
	2.なし	54	85	95	86	122	122	123	278	378	100	75	633
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	320	436	116	87	706
女	1.あり			1	4	5	20	21	20	37	17	13	51
	2.なし	51	72	123	102	145	113	170	312	402	90	128	725
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	332	439	107	141	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	652	875	223	228	1482



* 年齢階級別にみた糖尿病といわれたことのある者の割合







表18-3-1 医師から糖尿病といわれた人の治療状況(性・年齢階級別)

問18で3を選択した者：糖尿病といわれたことがある者

性別	問18-1 糖尿病治療の有無	年齢階級							再掲				総計 (20歳以上)
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	40~64歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	
男	1.あり	1		3	7	7	16	17	25	36	11	11	50
	2.なし				4	6	9	4	17	22	5	1	
男 集計		1		3	11	13	25	21	42	58	16	12	73
女	1.あり				1	5	14	19	14	26	12	13	39
	2.なし			1	3		6	2	6	11	5		
女 集計				1	4	5	20	21	20	37	17	13	51
総計		1		4	15	18	45	42	62	95	33	25	124



* 年齢階級別にみた糖尿病治療状況の分布

問18で3を選択した者：糖尿病といわれたことがある者







表18-4 医師から血中の脂質異常といわれた人の状況(性・年齢階級別)

性別	問18 脂質異常 と言われた	年齢階級							(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	総計 (20歳以上)
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	40~64歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	
男	1.あり		3	20	29	43	32	41	93	130	37	15	168
	2.なし	55	82	78	68	92	115	103	227	306	79	72	538
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	320	436	116	87	706
女	1.あり	1	1	13	17	40	48	46	87	118	31	33	165
	2.なし	50	71	111	89	110	85	145	245	321	76	108	611
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	332	439	107	141	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	652	875	223	228	1482



* 年齢階級別にみた脂質異常と言われことのある者の割合







表18-4-1 医師から脂質異常といわれた人の治療状況(性・年齢階級別)

問18で4を選択した者：血中の脂質異常といわれたことがある者

性別	問18-1 脂質異常治療の有無	年齢階級							再掲				総計 (20歳以上)
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	40~64歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	
男	1.あり			5	12	11	16	30	33	59	26	10	74
	2.なし		3	15	17	32	16	11	60	71	11	5	94
男集計			3	20	29	43	32	41	93	130	37	15	168
女	1.あり			1	6	18	28	34	44	62	18	24	87
	2.なし	1	1	12	11	22	20	12	43	56	13	9	78
女集計		1	1	13	17	40	48	46	87	118	31	33	165
総計		1	4	33	46	83	80	87	180	248	68	48	333



* 年齢階級別に見脂質異常治療状況の分布

問18で4を選択した者：脂質異常といわれたことがある者







表18-5 医師から何も言われたことがない人の状況(性・年齢階級別)

性別	問18 言われたことはない	年齢階級							(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	総計 (20歳以上)
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	40~64歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	
男	1.言われたことはない	54	73	60	45	49	40	32	117	141	24	25	299
	2.言われたことがある	1	12	38	52	86	107	112	203	295	92	62	407
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	320	436	116	87	706
女	1.言われたことはない	50	68	104	77	78	44	58	184	212	28	45	429
	2.言われたことがある	1	4	20	29	72	89	133	148	227	79	96	347
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	332	439	107	141	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	652	875	223	228	1482



* 年齢階級にみた言われたことのない者の割合







表18-5-1 治療を受けている疾患がないひとの状況(性・年齢階級別)

性別	問18-1治療の有無	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳	(再掲) 75歳以上	総計 (20歳以上)
		男	1.治療を受けている疾患はない	54	85	88	77	83	66	50	200	242	
	2.治療を受けている	1		10	20	52	81	94	120	194	74	53	257
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	320	436	116	87	706
女	1.治療を受けている疾患はない	51	72	119	91	104	69	74	238	283	45	55	529
	2.治療を受けている			5	15	46	64	117	94	156	62	86	247
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	332	439	107	141	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	652	875	223	228	1482



* 年齢階級別にみた治療の有無の分布







表19 がん検診を受けているか(性・年齢階級別)

性別	問19 がん検診の有無	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳	(再掲) 75歳以上	総計 (20歳以上)
		男	1.あり		3	7	17	49	56	67	93	150	
	2.なし	55	82	91	80	86	91	77	227	286	59	48	507
	無回答												
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	320	436	116	87	706
女	1.あり		9	44	53	70	68	82	160	216	56	57	326
	2.なし	51	63	80	53	80	64	108	171	222	51	83	448
	無回答						1	1	1	1		1	2
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	332	439	107	141	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	652	875	223	228	1482



* 年齢階級別にみた過去1年間にがん検診を受診した者の割合







表19-1 がん検診を受けない理由(性・年齢階級別)

性別	問19-1 未受診の理由	問19で2を選択した者:がん検診を受けていない者											総計 (20歳以上)
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳	(再掲) 75歳以上	
男	1.受診の必要性を感じない	33	40	31	17	28	40	38	68	96	28	27	194
	2.受診する時間がない	4	18	24	23	20	16	8	56	63	7	4	109
	3.受診のための費用が問題		8	10	17	7	5	2	28	30	2	1	49
	4.どこで受診できるかわからない	3	12	17	6	8	8	2	20	24	4		53
	5.以前(1年以上前)に受診したため			2	8	7	8	16	20	28	8	11	41
	6.その他	15	4	6	8	16	14	10	34	44	10	4	58
	無回答			1	1			1	1	1			3
男集計		55	82	91	80	86	91	77	227	286	59	48	507
女	1.受診の必要性を感じない	37	19	20	7	15	14	52	32	45	13	43	127
	2.受診する時間がない	6	22	20	15	21	9	8	40	48	8	5	95
	3.受診のための費用が問題	1	9	23	11	15	9	2	32	36	4	1	69
	4.どこで受診できるかわからない	1	8	7	3	2	2	3	5	7	2	3	25
	5.以前(1年以上前)に受診したため			5	9	18	25	20	42	59	17	13	77
	6.その他	6	5	5	8	9	5	23	20	27	7	18	55
	無回答												
女集計		51	63	80	53	80	64	108	171	222	51	83	448
総計		106	145	171	133	166	155	185	398	508	110	131	955



* 年齢階級別にみたがん検診を受けなかった理由の分布

問19で2を選択した者:がん検診を受けていない者







表20 歯をみがく頻度(性・年齢階級別)

性別	問20 歯をみがくか								(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	総計 (20歳以上)
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	40~64歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	
男	1.毎日1回みがく	13	37	37	50	54	58	60	137	179	42	43	296
	2.毎日2回みがく	31	37	45	34	53	54	42	122	164	42	19	265
	3.毎日3回以上みがく	10	6	14	13	23	23	35	49	74	25	20	114
	4.ときどきみがく		5	2		4	6	4	7	12	5	2	21
	5.みがかない	1				1	6	3	5	7	2	3	10
	無回答												
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	320	436	116	87	706
女	1.毎日1回みがく	13	16	28	22	29	17	48	61	79	18	37	160
	2.毎日2回みがく	25	34	54	47	78	67	92	167	218	51	66	372
	3.毎日3回以上みがく	9	22	42	37	43	48	44	104	141	37	31	236
	4.ときどきみがく	4					1	3		1	1	3	4
	5.みがかない							3				3	3
	無回答							1				1	1
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	332	439	107	141	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	652	875	223	228	1482



* 年齢階級別にみた歯みがき状況の分布







表21 歯間ブラシやフロスを使用するか(性・年齢階級別)

性別	問21 用具の使用は?								(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	総計 (20歳以上)	
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	40~64歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上		
男	1.毎日1回使う	1	7	9	7	15	10	9	30	33	3	8	57	
	2.毎日2回使う	3	1	1	2	5	7	4	11	17	6	1		20
	3.毎日3回以上使う	2		1		6	7	6	10	15	5	4		20
	4.とどき使う	15	17	28	29	21	29	16	67	90	23	5		140
	5.使用しない	34	60	59	59	87	94	108	201	280	79	68		467
	無回答					1		1	1	1	1	1		2
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	320	436	116	87	706	
女	1.毎日1回使う	1	9	15	17	16	15	17	43	54	11	11	89	
	2.毎日2回使う	1	1	2	7	9	13	14	22	32	10	11		46
	3.毎日3回以上使う		1	1	3	7	11	7	14	23	9	5		30
	4.とどき使う	15	23	63	42	51	28	22	108	129	21	14		229
	5.使用しない	34	38	43	37	67	65	130	144	200	56	99		380
	無回答						1	1	1	1		1		2
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	332	439	107	141	776	
総計		106	157	222	203	285	280	335	652	875	223	228	1482	



* 年齢階級別にみた歯みがき用具使用状況の分布







表22 歯科健診や治療を受けているか(性・年齢階級別)

性別	問22 歯科健診・治療の有無	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳	(再掲) 75歳以上	総計 (20歳以上)
		男	1.ある	23	24	37	32	59	66	64	136	189	
	2.ない	32	61	61	65	76	81	79	184	247	63	54	423
	無回答							1				1	1
男	集計	55	85	98	97	135	147	144	320	436	116	87	706
女	1.ある	33	38	66	55	61	62	75	145	201	56	52	357
	2.ない	18	34	58	51	89	71	115	187	238	51	88	418
	無回答							1				1	1
女	集計	51	72	124	106	150	133	191	332	439	107	141	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	652	875	223	228	1482



* 年齢階級別にみた歯科健診・治療を受けたことがある者の割合





表22-1 歯科健診や治療を受けた理由(性・年齢階級別)

性別	問22-1 歯科健診や治療を受けた理由	年齢階級							(再掲)				総計 (20歳以上)
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	40~64歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	
男	1 歯科健診	8	0	6	3	3	2	4	8	10	2	2	18
	2 健康管理	4	6	12	8	20	24	20	45	65	20	7	90
	3 むし歯の治療	15	21	25	22	34	24	25	73	93	20	12	151
	4 歯周病	1	0	1	5	10	11	10	23	32	9	4	37
	5 抜けた歯の治療	2	3	3	7	22	34	28	54	76	22	15	97
	6 歯並びや噛み合わせ	1	0	0	0	0	2	5	2	5	3	2	7
	7 けがの治療	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	2
	8 その他	1	0	1	1	0	1	1	2	2	0	1	4
男 集計		23	24	37	32	59	66	64	136	189	53	32	282
女	1 歯科健診	11	2	0	3	0	2	2	3	6	3	1	9
	2 健康管理	6	14	29	22	19	29	25	55	80	25	15	138
	3 むし歯の治療	18	27	41	37	37	27	18	87	108	21	11	187
	4 歯周病	0	4	4	6	11	8	7	21	27	6	5	40
	5 抜けた歯の治療	1	3	3	7	19	30	43	40	69	29	30	105
	6 歯並びや噛み合わせ	4	0	4	2	1	2	4	4	6	2	3	13
	7 けがの治療	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	8 その他	3	1	3	2	1	1	1	3	4	1	1	9
女 集計		33	38	66	55	61	62	75	145	201	56	52	357
総計		56	62	103	87	120	128	139	281	390	109	84	639









表23 「8020運動」の認知(性・年齢階級別)

性別	問23 8020の認知	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳	(再掲) 75歳以上	総計 (20歳以上)
		男	1.知っている	34	51	53	58	97	86	70	209	280	
	2.聞いたことはあるが内容は知らない	7	9	10	19	15	12	10	41	50	9	6	75
	3.知らない	14	25	34	20	23	49	63	70	106	36	49	214
	無回答			1				1				1	2
男	集計	55	85	98	97	135	147	144	320	436	116	87	706
女	1.知っている	42	55	97	84	125	101	83	270	343	73	50	545
	2.聞いたことはあるが内容は知らない	3	9	11	7	9	10	19	20	29	9	16	65
	3.知らない	6	8	16	15	16	21	87	41	65	24	74	163
	無回答						1	2	1	2	1	1	3
女	集計	51	72	124	106	150	133	191	332	439	107	141	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	652	875	223	228	1482



* 年齢階級別にみた「8020」認知状況の分布







表24 「健康おきなわ21」の認知(性・年齢階級別)

性別	問24 健康おきなわ21の認知								(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	総計 (20歳以上)
		15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	40~64歳	40~74歳	65~74歳	75歳以上	
男	1.知っている	2	5	5	7	13	16	9	30	44	14	1	55
	2.聞いたことはあるが内容は知らない	10	9	23	19	37	25	27	70	92	22	16	140
	3.知らない	42	71	69	71	85	106	108	220	300	80	70	510
	無回答	1		1									1
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	320	436	116	87	706
女	1.知っている	4	16	16	9	19	22	14	40	55	15	9	96
	2.聞いたことはあるが内容は知らない	13	11	27	37	46	36	25	105	128	23	16	182
	3.知らない	34	45	81	60	85	74	152	186	255	69	116	497
	無回答						1		1	1			1
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	332	439	107	141	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	652	875	223	228	1482



* 年齢階級別にみた「健康おきなわ21」の内容把握状況の分布







表25 「チャーガンジューおきなわ9か条」の認知(性・年齢階級別)

性別	問25 チャーガンジューおきなわ9か条の認知	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳	(再掲) 75歳以上	総計 (20歳以上)
		男	1.知っている	1	7	2	5	8	10	8	19	28	
	2.聞いたことはあるが内容は知らない	8	10	16	15	31	27	30	61	85	24	18	129
	3.知らない	46	68	79	77	96	110	106	240	323	83	66	536
	無回答			1									1
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	320	436	116	87	706
女	1.知っている	1	10	7	6	15	12	20	27	38	11	15	70
	2.聞いたことはあるが内容は知らない	7	12	22	28	46	47	29	101	133	32	17	184
	3.知らない	43	50	95	72	89	73	141	203	267	64	108	520
	無回答						1	1	1	1		1	2
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	332	439	107	141	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	652	875	223	228	1482



* 年齢階級別にみた「チャーガンジューおきなわ9か条」の内容把握状況の分布







表26 「チャーガンジューおきなわ応援団」の認知(性・年齢階級別)

性別	問26 応援団の認知	15-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70歳以上	(再掲) 40~64歳	(再掲) 40~74歳	(再掲) 65~74歳	(再掲) 75歳以上	総計 (20歳以上)
		男	1.知っている	1	2		5	2	13	4	14	22	
	2.聞いたことはあるが 内容は知らない	4	5	6	8	15	12	19	31	41	10	13	65
	3.知らない	50	78	91	84	118	122	121	275	373	98	72	614
	無回答			1									1
男 集計		55	85	98	97	135	147	144	320	436	116	87	706
女	1.知っている		5	2	2	8	7	13	13	20	7	10	37
	2.聞いたことはあるが 内容は知らない	1	5	5	12	20	32	20	49	72	23	12	94
	3.知らない	50	62	117	92	122	93	156	269	346	77	117	642
	無回答						1	2	1	1		2	3
女 集計		51	72	124	106	150	133	191	332	439	107	141	776
総計		106	157	222	203	285	280	335	652	875	223	228	1482



* 年齢階級別にみた「チャーガンジューおきなわ応援団」の内容把握状況の分布

