

【参考】 該当者割合の都道府県の状況

沖縄県の位置を把握するため、各検査項目および質問項目の該当者割合の都道府県別データを高い方から低い方に4区分に分け、色分けして示した。


BMI25以上の者の割合　（40～74歳）




BMI25以上の者の割合　（40～74歳，年齢調整値）




腹囲　男性85cm以上、女性90cm以上の者の割合　（40～74歳）




腹囲　男性85cm以上、女性90cm以上の者の割合　（40～74歳，年齢調整値）




収縮期血圧130mmHg以上の者の割合　（40～74歳）




収縮期血圧130mmHg以上の者の割合　（40～74歳，年齢調整値）




拡張期血圧85mmHg以上の者の割合 （40～74歳）




拡張期血圧85mmHg以上の者の割合 （40～74歳，年齢調整値）




空腹時血糖100mg/dl以上の者の割合 （40～74歳）




空腹時血糖100mg/dl以上の者の割合 （40～74歳，年齢調整値）



HbA1c（NGSP）5.6%以上の者の割合　（40～74歳）




HbA1c（NGSP）5.6%以上の者の割合　（40～74歳，年齢調整値）




※注）女性（年齢調整値）について
最小集計単位の原則により、集計区分「8.0以上8.4未満」において総計以外の全ての年齢階級または一部の集計値が「-」で表示された県が19県あります。グラフは沖縄県の位置を把握するための参考として掲載。


中性脂肪150mg/dl以上の者の割合　（40～74歳）




中性脂肪150mg/dl以上の者の割合　（40～74歳，年齢調整値）




HDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合 （40～74歳）




HDLコレステロール40mg/dl未満の者の割合 （40～74歳，年齢調整値）




LDLコレステロール120mg/dl以上の者の割合 （40～74歳）




LDLコレステロール120mg/dl以上の者の割合 （40～74歳，年齢調整値）




GOT（AST）31U/l以上の者の割合　（40～74歳）




GOT（AST）31U/l以上の者の割合　（40～74歳，年齢調整値）




GPT（ALT）31U/l以上の者の割合　（40～74歳）




GPT（ALT）31U/l以上の者の割合　（40～74歳，年齢調整値）




γ-GT（γ-GTP）51U/l以上の者の割合　（40～74歳）




γ-GT（γ-GTP）51U/l以上の者の割合　（40～74歳，年齢調整値）



尿蛋白+以上の者の割合　（40～74歳）




尿蛋白+以上の者の割合　（40～74歳，年齢調整値）




※注）女性（年齢調整値）について

最小集計単位の原則により、集計区分「＋＋＋」において総計以外の全ての年齢階級または一部の集計値が「-」で表示された県が16県あります。グラフは沖縄県の位置を把握するための参考として掲載。

尿糖+以上の者の割合　（40～74歳）




尿糖+以上の者の割合　（40～74歳，年齢調整値）




※注）女性（年齢調整値）について

最小集計単位の原則により、集計区分「＋＋」において総計以外の全ての年齢階級の集計値が「-」で表示された県が3県あります。グラフは沖縄県の位置を把握するための参考として掲載。


質問項目１:「血圧を下げる薬」を使用している者の割合 （40～74歳）




質問項目１:「血圧を下げる薬」を使用している者の割合 （40～74歳，年齢調整値）




質問項目２:「インスリン注射又は血糖を下げる薬を使用している者の割合（40～74歳）




質問項目２:「インスリン注射又は血糖を下げる薬を使用している者の割合（40～74歳，年齢調整値）




質問項目３:「コレステロールを下げる薬」を使用している者の割合 （40～74歳）




質問項目３:「コレステロールを下げる薬」を使用している者の割合 （40～74歳，年齢調整値）




質問項目４：医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合　（40～74歳）




質問項目４：医師から、脳卒中（脳出血、脳梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことがある者の割合　（40～74歳，年齢調整値）



質問項目５：医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことのある者の割合　（40～74歳）




質問項目５：医師から、心臓病（狭心症、心筋梗塞等）にかかっているといわれたり、治療を受けたことのある者の割合　（40～74歳，年齢調整値）




質問項目６：医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析）を受けたことのある者の割合 （40～74歳）




質問項目６：医師から、慢性の腎不全にかかっているといわれたり、治療（人工透析）を受けたことのある者の割合 （40～74歳，年齢調整値）




質問項目７：医師から、貧血といわれたことがある者の割合 （40～74歳）




質問項目７：医師から、貧血といわれたことがある者の割合 （40～74歳，年齢調整値）




質問項目８：現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合　（40～74歳）




質問項目８：現在、たばこを習慣的に吸っている者の割合　（40～74歳，年齢調整値）




質問項目９:20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合 （40～74歳）




質問項目９:20歳の時の体重から10kg以上増加している者の割合 （40～74歳，年齢調整値）




質問項目10：1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していない者の割合（40～74歳）




質問項目10：1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していない者の割合（40～74歳，年齢調整値）




質問項目11：日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施しない者の割合（40～74歳）




質問項目11：日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施しない者の割合（40～74歳，年齢調整値）




質問項目12：ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合（40～74歳）




質問項目12：ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が遅い者の割合（40～74歳，年齢調整値）




質問項目13：この1年間で体重の増減が±3kg以上あった者の割合　（40～74歳）




質問項目13：この1年間で体重の増減が±3kg以上あった者の割合　（40～74歳，年齢調整値）




質問項目14：人と比べて食べる速度が速い者の割合 （40～74歳）




質問項目14：人と比べて食べる速度が速い者の割合 （40～74歳，年齢調整値）




質問項目15：就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある者の割合（40～74歳）




質問項目15：就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある者の割合（40～74歳，年齢調整値）




質問項目16：夕食後に間食（3食以外の夜食）をとることが週に3回以上ある者の割合（40～74歳）




質問項目16：夕食後に間食（3食以外の夜食）をとることが週に3回以上ある者の割合（40～74歳，年齢調整値）



質問項目17：朝食を抜くことが週に3回以上ある者の割合 （40～74歳）




質問項目17：朝食を抜くことが週に3回以上ある者の割合 （40～74歳，年齢調整値）




質問項目18：お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度　（40～74歳）

①　毎日




質問項目18：お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度　（40～74歳，年齢調整値）

①　毎日




質問項目18：お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度　（40～74歳）

② 時々




質問項目18：お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度　（40～74歳，年齢調整値）

② 時々




質問項目18：お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度 （40～74歳）

③ 飲まない




質問項目18：お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度 （40～74歳，年齢調整値）

③ 飲まない




質問項目19：飲酒日の1日当たりの飲酒量 （40～74歳）

① 3合以上



質問項目19：飲酒日の1日当たりの飲酒量 （40～74歳，年齢調整値）

① 3合以上




※注）女性（年齢調整値）について

最小集計単位の原則により、一部または全ての年齢階級の集計値が「-」で表示された県が11県あります。グラフは沖縄県の位置を把握するための参考として掲載。


質問項目19：飲酒日の1日当たりの飲酒量 （40～74歳）

② 2～3合未満

男性 （年齢調整なし）




女性 （年齢調整なし）




質問項目19：飲酒日の1日当たりの飲酒量 （40～74歳，年齢調整値）

② 2～3合未満

男性 （年齢調整値）




女性 （年齢調整値）




質問項目19：飲酒日の1日当たりの飲酒量 （40～74歳，年齢調整値）

③ 1～2合未満




質問項目19：飲酒日の1日当たりの飲酒量 （40～74歳，年齢調整値）

③ 1～2合未満




質問項目19：飲酒日の1日当たりの飲酒量 （40～74歳）

④ 1合未満




質問項目19：飲酒日の1日当たりの飲酒量 （40～74歳，年齢調整値）

④ 1合未満



質問項目20:睡眠で休養が十分とれていない者の割合 （40～74歳）



質問項目20:睡眠で休養が十分とれていない者の割合 （40～74歳，年齢調整値）

