

全国

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 全国の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

全国	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	79.64	79.60	79.67	80.79	80.76	80.82	81.64	81.61	81.67	▲▲	▲▲
		65	18.86	18.84	18.87	19.46	19.44	19.47	20.05	20.04	20.07	▲▲	▲▲
	女	0	86.39	86.36	86.42	87.05	87.02	87.08	87.74	87.72	87.77	▲▲	▲▲
		65	23.89	23.88	23.91	24.31	24.30	24.33	24.91	24.90	24.93	▲▲	▲▲
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	78.18	78.16	78.21	79.29	79.26	79.32	80.12	80.09	80.15	▲▲	▲▲
		65	17.25	17.23	17.27	17.83	17.81	17.85	18.42	18.41	18.44	▲▲	▲▲
	女	0	83.20	83.17	83.22	83.78	83.75	83.80	84.48	84.46	84.51	▲▲	▲▲
		65	20.53	20.52	20.54	20.88	20.87	20.89	21.51	21.50	21.52	▲▲	▲▲
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.45	1.45	1.45	1.50	1.49	1.50	1.51	1.51	1.52	▲▲	▲▲
		65	1.60	1.60	1.61	1.63	1.62	1.63	1.63	1.63	1.63	▲▲	△
	女	0	3.19	3.19	3.20	3.28	3.27	3.28	3.26	3.26	3.27	▲▲	▼▼
		65	3.36	3.36	3.37	3.43	3.42	3.44	3.41	3.40	3.41	▲▲	▼▼


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



沖縄県

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 沖縄県の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

沖縄県	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	79.34	79.02	79.66	80.49	80.18	80.79	81.18	80.87	81.48	▲▲	▲▲
		65	19.46	19.25	19.67	20.00	19.80	20.20	20.58	20.39	20.77	▲▲	▲▲
	女	0	86.80	86.51	87.10	87.48	87.20	87.75	88.31	88.03	88.58	▲▲	▲▲
		65	24.67	24.48	24.86	25.20	25.03	25.37	25.92	25.75	26.09	▲▲	▲▲
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	77.62	77.32	77.92	78.66	78.38	78.94	79.33	79.05	79.61	▲▲	▲▲
		65	17.50	17.31	17.68	17.95	17.78	18.12	18.52	18.36	18.69	▲▲	▲▲
	女	0	83.01	82.75	83.26	83.58	83.35	83.82	84.30	84.06	84.54	▲▲	▲▲
		65	20.63	20.49	20.78	21.07	20.93	21.20	21.69	21.56	21.82	▲▲	▲▲
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.72	1.67	1.77	1.83	1.78	1.88	1.85	1.80	1.89	▲▲	△
		65	1.96	1.91	2.02	2.05	2.00	2.10	2.06	2.01	2.11	▲▲	△
	女	0	3.80	3.73	3.87	3.89	3.83	3.96	4.01	3.94	4.07	▲▲	▲▲
		65	4.04	3.97	4.11	4.13	4.07	4.20	4.23	4.17	4.30	▲▲	▲▲


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



北部保健医療圏

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 北部保健医療圏の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

北部保健医療圏	性別	年齢 (歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	78.96	78.25	79.67	79.96	79.32	80.60	80.55	79.90	81.21	▲▲	△
		65	19.71	19.28	20.14	19.84	19.45	20.23	20.37	20.01	20.74	▲▲	△
	女	0	87.93	87.32	88.53	88.19	87.58	88.80	87.91	87.34	88.48	▽	▽
		65	25.57	25.18	25.96	25.61	25.24	25.98	25.35	25.01	25.69	▽	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	77.28	76.61	77.95	78.23	77.63	78.82	78.77	78.15	79.38	▲▲	△
		65	17.75	17.36	18.14	17.85	17.50	18.20	18.35	18.02	18.68	▲▲	▲▲
	女	0	84.12	83.58	84.66	84.32	83.77	84.87	83.98	83.47	84.48	▽	▽
		65	21.53	21.20	21.87	21.55	21.24	21.87	21.19	20.91	21.48	▽	▽
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.68	1.56	1.80	1.73	1.61	1.85	1.78	1.67	1.90	△	△
		65	1.95	1.81	2.10	1.99	1.85	2.12	2.02	1.89	2.15	△	△
	女	0	3.81	3.64	3.99	3.87	3.70	4.04	3.93	3.76	4.10	△	△
		65	4.04	3.85	4.22	4.06	3.88	4.23	4.15	3.98	4.33	△	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



中部保健医療圏

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 中部保健医療圏の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

中部保健医療圏	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	79.42	79.10	79.74	80.20	79.90	80.49	80.92	80.62	81.21	▲▲	▲▲
		65	19.69	19.47	19.91	19.77	19.57	19.97	20.28	20.09	20.47	▲▲	▲▲
	女	0	87.01	86.72	87.31	87.49	87.21	87.77	87.65	87.38	87.91	▲▲	△
		65	24.99	24.79	25.18	25.30	25.12	25.48	25.20	25.03	25.37	△	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	77.62	77.32	77.92	78.37	78.09	78.64	79.09	78.82	79.36	▲▲	▲▲
		65	17.62	17.43	17.82	17.70	17.52	17.88	18.25	18.08	18.42	▲▲	▲▲
	女	0	83.10	82.84	83.36	83.42	83.17	83.67	83.91	83.67	84.14	▲▲	▲▲
		65	20.81	20.64	20.98	20.97	20.82	21.12	21.25	21.11	21.39	▲▲	▲▲
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.80	1.73	1.88	1.83	1.77	1.90	1.82	1.76	1.88	△	▽
		65	2.07	1.98	2.16	2.07	1.99	2.14	2.03	1.96	2.10	▽	▽
	女	0	3.91	3.82	4.01	4.07	3.98	4.17	3.74	3.66	3.82	▼▼	▼▼
		65	4.18	4.08	4.28	4.33	4.23	4.43	3.95	3.87	4.04	▼▼	▼▼


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



南部保健医療圏

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 南部保健医療圏の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

南部保健医療圏	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	79.19	78.93	79.45	80.40	80.15	80.65	81.16	80.91	81.40	▲▲	▲▲
		65	19.35	19.18	19.52	19.89	19.73	20.06	20.40	20.25	20.55	▲▲	▲▲
	女	0	86.62	86.38	86.85	87.29	87.07	87.51	88.21	87.98	88.43	▲▲	▲▲
		65	24.32	24.17	24.47	25.02	24.87	25.16	25.79	25.65	25.93	▲▲	▲▲
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	77.52	77.27	77.77	78.60	78.37	78.83	79.36	79.13	79.58	▲▲	▲▲
		65	17.44	17.29	17.60	17.88	17.74	18.03	18.41	18.27	18.54	▲▲	▲▲
	女	0	82.97	82.76	83.18	83.45	83.25	83.65	84.25	84.06	84.45	▲▲	▲▲
		65	20.46	20.33	20.59	20.94	20.82	21.06	21.61	21.49	21.73	▲▲	▲▲
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.67	1.61	1.73	1.80	1.75	1.85	1.80	1.75	1.85	▲▲	▽
		65	1.91	1.84	1.97	2.01	1.95	2.07	1.99	1.94	2.05	▲▲	▽
	女	0	3.65	3.58	3.73	3.84	3.77	3.91	3.95	3.88	4.02	▲▲	▲▲
		65	3.86	3.78	3.94	4.08	4.00	4.16	4.18	4.10	4.25	▲▲	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



宮古保健医療圏

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 宮古保健医療圏の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

宮古保健医療圏	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	76.64	75.59	77.69	79.75	78.87	80.64	78.64	77.65	79.63	▲▲	▽
		65	18.83	18.33	19.34	19.05	18.51	19.59	19.16	18.67	19.65	△	△
	女	0	85.56	84.71	86.41	86.67	85.89	87.45	87.05	86.29	87.80	▲▲	△
		65	23.61	23.14	24.08	24.02	23.57	24.48	24.45	24.02	24.89	▲▲	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	75.09	74.10	76.09	77.93	77.10	78.75	77.06	76.13	78.00	▲▲	▽
		65	16.92	16.47	17.38	16.97	16.50	17.44	17.33	16.90	17.77	△	△
	女	0	81.93	81.17	82.70	83.26	82.55	83.96	83.53	82.86	84.20	▲▲	△
		65	19.72	19.32	20.11	20.44	20.05	20.82	20.74	20.38	21.10	▲▲	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.55	1.40	1.69	1.83	1.67	1.98	1.58	1.44	1.71	△	▼▼
		65	1.91	1.74	2.08	2.08	1.90	2.25	1.82	1.67	1.98	▽	▼▼
	女	0	3.63	3.41	3.84	3.41	3.21	3.61	3.52	3.31	3.73	▽	△
		65	3.89	3.67	4.12	3.58	3.38	3.79	3.71	3.50	3.93	▽	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



八重山保健医療圏

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 八重山保健医療圏の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

八重山保健医療圏	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	78.66	77.70	79.63	79.02	78.03	80.00	80.30	79.45	81.15	▲▲	△
		65	19.00	18.39	19.62	19.03	18.44	19.61	19.61	19.06	20.15	△	△
	女	0	87.73	86.81	88.65	85.86	84.93	86.79	87.57	86.74	88.41	▽	▲▲
		65	25.77	25.19	26.35	24.35	23.82	24.88	25.28	24.80	25.77	▽	▲▲
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	76.71	75.81	77.61	77.29	76.37	78.21	78.59	77.80	79.38	▲▲	▲▲
		65	16.77	16.23	17.31	17.05	16.54	17.56	17.69	17.21	18.18	▲▲	△
	女	0	82.71	81.91	83.51	82.30	81.46	83.13	84.03	83.28	84.79	▲▲	▲▲
		65	20.43	19.96	20.90	20.49	20.05	20.93	21.53	21.11	21.95	▲▲	▲▲
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.95	1.75	2.15	1.73	1.55	1.91	1.71	1.54	1.88	▽	▽
		65	2.23	2.00	2.46	1.98	1.77	2.18	1.92	1.72	2.11	▼▼	▽
	女	0	5.02	4.70	5.34	3.56	3.32	3.81	3.54	3.30	3.78	▼▼	▽
		65	5.34	5.01	5.67	3.86	3.60	4.12	3.75	3.50	4.00	▼▼	▽


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



南部保健所管内

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 南部保健所管内の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

南部保健所管内	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	79.53	79.17	79.88	80.70	80.37	81.04	81.44	81.12	81.77	▲▲	▲▲
		65	19.70	19.46	19.94	20.18	19.96	20.40	20.81	20.60	21.01	▲▲	▲▲
	女	0	86.98	86.66	87.30	87.73	87.43	88.02	88.33	88.04	88.63	▲▲	▲▲
		65	24.53	24.31	24.74	25.28	25.08	25.48	25.87	25.69	26.06	▲▲	▲▲
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	77.79	77.46	78.13	78.84	78.52	79.15	79.62	79.32	79.93	▲▲	▲▲
		65	17.73	17.51	17.94	18.11	17.91	18.30	18.78	18.60	18.97	▲▲	▲▲
	女	0	83.29	83.01	83.57	83.79	83.53	84.05	84.39	84.13	84.65	▲▲	▲▲
		65	20.65	20.46	20.83	21.12	20.95	21.29	21.71	21.55	21.87	▲▲	▲▲
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.73	1.65	1.81	1.87	1.79	1.94	1.82	1.75	1.89	△	▽
		65	1.97	1.88	2.07	2.07	1.99	2.16	2.02	1.95	2.10	△	▽
	女	0	3.69	3.58	3.79	3.94	3.84	4.04	3.94	3.85	4.04	▲▲	△
		65	3.88	3.77	3.99	4.16	4.06	4.27	4.16	4.06	4.26	▲▲	▽


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



那覇市

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 那覇市の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

那覇市	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	78.79	78.40	79.18	80.03	79.65	80.40	80.81	80.45	81.16	▲▲	▲▲
		65	18.94	18.69	19.19	19.55	19.31	19.80	19.90	19.67	20.13	▲▲	▲▲
	女	0	86.14	85.79	86.49	86.78	86.45	87.11	88.03	87.69	88.38	▲▲	▲▲
		65	24.04	23.83	24.25	24.71	24.51	24.91	25.69	25.49	25.89	▲▲	▲▲
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	77.19	76.82	77.56	78.31	77.96	78.66	79.04	78.70	79.37	▲▲	▲▲
		65	17.11	16.88	17.34	17.62	17.40	17.84	17.94	17.73	18.15	▲▲	▲▲
	女	0	82.52	82.20	82.84	83.05	82.75	83.35	84.07	83.76	84.38	▲▲	▲▲
		65	20.19	20.01	20.36	20.72	20.55	20.89	21.50	21.32	21.67	▲▲	▲▲
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.60	1.52	1.68	1.72	1.64	1.80	1.77	1.70	1.84	▲▲	△
		65	1.83	1.74	1.92	1.94	1.85	2.02	1.96	1.88	2.04	▲▲	△
	女	0	3.62	3.51	3.73	3.73	3.63	3.83	3.96	3.86	4.06	▲▲	▲▲
		65	3.85	3.74	3.97	3.99	3.88	4.10	4.19	4.09	4.30	▲▲	▲▲


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



宜野湾市

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 宜野湾市の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

宜野湾市	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	79.98	79.24	80.73	80.64	79.98	81.31	81.67	81.00	82.34	▲▲	▲▲
		65	19.87	19.34	20.39	19.69	19.24	20.15	20.67	20.22	21.12	▲▲	▲▲
	女	0	87.04	86.36	87.72	88.18	87.53	88.83	89.02	88.44	89.60	▲▲	△
		65	25.02	24.59	25.46	25.86	25.42	26.31	26.53	26.14	26.92	▲▲	▲▲
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	78.19	77.49	78.88	78.71	78.09	79.33	79.93	79.30	80.56	▲▲	▲▲
		65	17.82	17.35	18.29	17.54	17.13	17.95	18.78	18.37	19.19	▲▲	▲▲
	女	0	82.74	82.13	83.35	83.68	83.10	84.25	84.88	84.36	85.41	▲▲	▲▲
		65	20.42	20.05	20.79	21.07	20.69	21.45	22.15	21.80	22.50	▲▲	▲▲
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.79	1.60	1.99	1.93	1.77	2.09	1.74	1.60	1.88	▽	▽
		65	2.05	1.82	2.27	2.15	1.97	2.33	1.90	1.74	2.06	▽	▼▼
	女	0	4.30	4.04	4.56	4.50	4.25	4.75	4.13	3.92	4.35	▽	▼▼
		65	4.60	4.33	4.88	4.79	4.53	5.06	4.38	4.16	4.60	▽	▼▼


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



石垣市

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 石垣市の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

石垣市	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	78.79	77.76	79.81	78.91	77.89	79.93	80.73	79.85	81.60	▲▲	▲▲
		65	19.26	18.61	19.92	18.80	18.19	19.42	19.88	19.30	20.47	△	▲▲
	女	0	87.36	86.37	88.35	85.76	84.76	86.76	87.44	86.54	88.34	△	▲▲
		65	25.48	24.85	26.11	24.38	23.83	24.93	25.29	24.78	25.80	▽	▲▲
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	76.73	75.78	77.68	77.21	76.25	78.17	78.95	78.14	79.77	▲▲	▲▲
		65	16.90	16.33	17.48	16.87	16.33	17.41	17.90	17.38	18.42	▲▲	▲▲
	女	0	82.36	81.51	83.21	82.14	81.24	83.04	83.96	83.14	84.79	▲▲	▲▲
		65	20.15	19.65	20.65	20.45	19.99	20.91	21.60	21.16	22.04	▲▲	▲▲
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	2.05	1.83	2.28	1.70	1.52	1.89	1.77	1.59	1.96	▽	△
		65	2.36	2.10	2.61	1.93	1.72	2.14	1.98	1.77	2.19	▼▼	△
	女	0	5.00	4.65	5.34	3.62	3.36	3.88	3.47	3.22	3.72	▼▼	▽
		65	5.32	4.97	5.68	3.94	3.66	4.21	3.69	3.43	3.95	▼▼	▽


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



浦添市

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 浦添市の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

浦添市	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	79.62	78.94	80.30	80.97	80.32	81.62	81.58	80.94	82.22	▲▲	△
		65	19.91	19.45	20.36	20.46	20.02	20.91	20.96	20.56	21.36	▲▲	△
	女	0	86.59	86.01	87.16	88.64	88.08	89.21	88.77	88.19	89.35	▲▲	△
		65	23.90	23.48	24.32	26.21	25.83	26.59	26.53	26.15	26.91	▲▲	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	77.90	77.26	78.53	79.08	78.47	79.69	79.79	79.19	80.40	▲▲	△
		65	17.93	17.52	18.34	18.34	17.94	18.74	18.96	18.60	19.33	▲▲	▲▲
	女	0	82.81	82.31	83.32	84.43	83.93	84.94	84.85	84.32	85.37	▲▲	△
		65	19.93	19.58	20.28	21.75	21.41	22.09	22.36	22.02	22.69	▲▲	▲▲
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.72	1.55	1.89	1.89	1.73	2.04	1.79	1.65	1.92	△	▽
		65	1.98	1.78	2.18	2.12	1.94	2.30	2.00	1.85	2.15	△	▽
	女	0	3.77	3.55	3.99	4.21	3.99	4.44	3.93	3.73	4.12	△	▽
		65	3.97	3.74	4.20	4.46	4.23	4.69	4.17	3.97	4.38	△	▽


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



名護市

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 名護市の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

名護市	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	80.05	79.10	81.00	79.92	79.10	80.74	80.81	79.99	81.62	△	△
		65	20.66	20.02	21.30	19.65	19.12	20.17	20.22	19.72	20.72	▽	△
	女	0	87.45	86.64	88.25	89.07	88.38	89.76	87.86	87.15	88.57	△	▼▼
		65	25.26	24.71	25.81	25.89	25.41	26.38	25.30	24.85	25.76	△	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	78.36	77.47	79.25	78.38	77.61	79.15	79.21	78.44	79.98	△	△
		65	18.71	18.13	19.30	17.89	17.41	18.37	18.45	17.99	18.90	▽	△
	女	0	83.77	83.05	84.49	85.25	84.63	85.87	84.33	83.69	84.96	△	▼▼
		65	21.35	20.87	21.83	21.94	21.52	22.36	21.57	21.18	21.97	△	▽
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.69	1.50	1.88	1.54	1.38	1.70	1.60	1.45	1.75	▽	△
		65	1.95	1.73	2.17	1.76	1.58	1.93	1.78	1.61	1.95	▽	△
	女	0	3.67	3.42	3.93	3.82	3.57	4.06	3.53	3.31	3.75	▽	▽
		65	3.91	3.65	4.18	3.96	3.70	4.21	3.73	3.50	3.96	▽	▽


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



糸満市

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 糸満市の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

糸満市	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	77.71	76.79	78.63	79.05	78.13	79.96	80.28	79.39	81.16	▲▲	△
		65	18.68	18.07	19.30	19.40	18.84	19.97	20.47	19.93	21.02	▲▲	▲▲
	女	0	86.25	85.43	87.08	86.72	85.97	87.46	87.03	86.27	87.78	△	△
		65	23.88	23.31	24.44	24.28	23.78	24.79	24.61	24.13	25.09	△	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	76.01	75.15	76.86	77.39	76.53	78.26	78.38	77.55	79.21	▲▲	△
		65	16.68	16.14	17.22	17.54	17.02	18.05	18.29	17.81	18.78	▲▲	▲▲
	女	0	82.49	81.77	83.22	82.79	82.14	83.44	83.10	82.43	83.76	△	△
		65	19.92	19.46	20.39	20.12	19.70	20.53	20.45	20.05	20.85	△	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.71	1.51	1.90	1.65	1.48	1.82	1.90	1.72	2.07	△	△
		65	2.00	1.77	2.23	1.87	1.67	2.07	2.18	1.98	2.38	△	▲▲
	女	0	3.76	3.49	4.03	3.93	3.67	4.18	3.93	3.69	4.17	△	△
		65	3.95	3.67	4.23	4.16	3.90	4.43	4.17	3.91	4.42	△	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



沖縄市

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 沖縄市の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

沖縄市	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	78.36	77.69	79.03	80.49	79.92	81.06	80.71	80.15	81.27	▲▲	△
		65	19.43	18.99	19.88	20.24	19.84	20.63	20.05	19.68	20.42	▲▲	▽
	女	0	85.66	85.09	86.23	87.39	86.86	87.92	87.33	86.80	87.85	▲▲	▽
		65	23.84	23.46	24.22	25.17	24.82	25.52	24.97	24.66	25.29	▲▲	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	76.49	75.87	77.11	78.64	78.11	79.17	78.89	78.37	79.42	▲▲	△
		65	17.23	16.84	17.63	18.12	17.76	18.47	18.03	17.70	18.35	▲▲	▽
	女	0	81.68	81.18	82.17	83.40	82.93	83.87	83.91	83.43	84.38	▲▲	△
		65	19.55	19.24	19.86	20.93	20.64	21.23	21.36	21.09	21.63	▲▲	▲▲
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.87	1.72	2.03	1.85	1.72	1.98	1.81	1.70	1.93	▽	▽
		65	2.20	2.01	2.39	2.12	1.97	2.27	2.02	1.89	2.15	▽	▽
	女	0	3.98	3.79	4.18	3.99	3.81	4.17	3.42	3.27	3.57	▼▼	▼▼
		65	4.29	4.08	4.49	4.23	4.05	4.42	3.61	3.46	3.77	▼▼	▼▼


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



豊見城市

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 豊見城市の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

豊見城市	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	81.17	80.16	82.18	81.15	80.27	82.03	81.59	80.80	82.38	△	△
		65	20.65	19.90	21.40	20.28	19.66	20.90	20.46	19.92	21.01	▽	△
	女	0	89.05	88.14	89.96	88.32	87.52	89.13	90.12	89.36	90.87	△	▲▲
		65	26.92	26.28	27.57	25.97	25.43	26.52	27.25	26.72	27.77	△	▲▲
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	79.08	78.15	80.02	79.22	78.40	80.04	79.89	79.16	80.63	△	△
		65	18.35	17.69	19.02	18.18	17.62	18.74	18.62	18.13	19.12	△	△
	女	0	84.95	84.13	85.77	84.48	83.75	85.20	86.28	85.60	86.97	▲▲	▲▲
		65	22.59	22.03	23.15	21.91	21.44	22.39	23.27	22.80	23.74	△	▲▲
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	2.09	1.80	2.38	1.93	1.70	2.16	1.70	1.52	1.87	▼▼	▽
		65	2.30	1.98	2.62	2.10	1.85	2.35	1.84	1.64	2.03	▼▼	▽
	女	0	4.10	3.76	4.43	3.85	3.56	4.14	3.83	3.57	4.10	▽	▽
		65	4.33	3.98	4.68	4.06	3.76	4.36	3.97	3.70	4.25	▽	▽


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



うるま市

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 うるま市の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

うるま市	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	79.45	78.85	80.06	79.23	78.62	79.85	80.43	79.86	81.00	▲▲	▲▲
		65	19.43	19.01	19.85	19.18	18.79	19.58	19.79	19.43	20.14	△	▲▲
	女	0	87.36	86.80	87.92	87.22	86.65	87.80	86.81	86.23	87.38	▽	▽
		65	24.92	24.52	25.32	24.97	24.61	25.34	24.66	24.33	25.00	▽	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	77.61	77.05	78.17	77.49	76.91	78.06	78.62	78.08	79.15	▲▲	▲▲
		65	17.32	16.94	17.70	17.20	16.84	17.55	17.75	17.43	18.07	△	▲▲
	女	0	83.43	82.94	83.92	82.99	82.48	83.49	82.94	82.43	83.46	▽	▽
		65	20.75	20.41	21.09	20.47	20.17	20.78	20.56	20.28	20.84	▽	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.84	1.70	1.98	1.75	1.62	1.87	1.82	1.70	1.93	▽	△
		65	2.11	1.94	2.27	1.99	1.85	2.13	2.04	1.91	2.16	▽	△
	女	0	3.93	3.74	4.12	4.24	4.05	4.42	3.86	3.70	4.02	▽	▼▼
		65	4.16	3.96	4.36	4.50	4.31	4.69	4.10	3.94	4.27	▽	▼▼


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



宮古島市

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 宮古島市の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

宮古島市	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	76.64	75.58	77.71	79.80	78.90	80.71	78.64	77.65	79.62	▲▲	▽
		65	18.87	18.35	19.39	19.09	18.54	19.63	19.13	18.64	19.63	△	△
	女	0	85.47	84.61	86.33	86.74	85.95	87.53	87.04	86.27	87.80	▲▲	△
		65	23.55	23.07	24.02	24.07	23.61	24.53	24.49	24.05	24.94	▲▲	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	75.08	74.07	76.10	77.97	77.13	78.81	77.06	76.12	77.99	▲▲	▽
		65	16.94	16.48	17.41	17.00	16.52	17.48	17.31	16.87	17.74	△	△
	女	0	81.85	81.08	82.63	83.28	82.57	83.99	83.49	82.81	84.17	▲▲	△
		65	19.66	19.26	20.06	20.43	20.04	20.82	20.74	20.37	21.11	▲▲	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.56	1.41	1.71	1.84	1.68	2.00	1.58	1.44	1.72	△	▼▼
		65	1.92	1.75	2.10	2.09	1.91	2.27	1.83	1.67	1.99	▽	▼▼
	女	0	3.62	3.40	3.84	3.46	3.25	3.67	3.55	3.34	3.76	▽	△
		65	3.89	3.66	4.11	3.63	3.42	3.85	3.75	3.53	3.97	▽	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



南城市

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 南城市の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

南城市	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	79.28	78.06	80.49	80.59	79.65	81.53	81.07	80.05	82.09	▲▲	△
		65	20.29	19.60	20.98	19.48	18.93	20.04	20.78	20.22	21.33	△	▲▲
	女	0	86.20	85.24	87.17	87.23	86.36	88.09	87.52	86.57	88.46	△	△
		65	23.85	23.30	24.40	24.71	24.15	25.28	25.43	24.91	25.96	▲▲	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	77.61	76.46	78.76	78.82	77.94	79.70	79.23	78.27	80.19	▲▲	△
		65	18.38	17.75	19.00	17.58	17.08	18.08	18.71	18.21	19.21	△	▲▲
	女	0	83.08	82.19	83.96	83.43	82.67	84.19	83.59	82.74	84.44	△	△
		65	20.58	20.10	21.06	20.70	20.23	21.18	21.25	20.81	21.69	▲▲	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.67	1.46	1.88	1.77	1.58	1.95	1.84	1.66	2.03	△	△
		65	1.91	1.67	2.16	1.90	1.70	2.10	2.07	1.86	2.27	△	△
	女	0	3.13	2.88	3.37	3.80	3.53	4.06	3.93	3.66	4.19	▲▲	△
		65	3.27	3.02	3.53	4.01	3.73	4.29	4.18	3.91	4.45	▲▲	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



本部町

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 本部町の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

本部町	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	77.71	75.82	79.61	79.33	77.58	81.07	79.30	77.23	81.37	△	▽
		65	19.16	18.05	20.26	19.05	18.02	20.08	20.01	19.13	20.89	△	△
	女	0	89.84	88.36	91.33	86.83	84.64	89.02	87.30	85.29	89.30	▼▼	△
		65	26.81	25.94	27.68	25.66	24.59	26.73	25.62	24.73	26.52	▽	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	76.13	74.35	77.91	77.64	76.01	79.28	77.52	75.57	79.48	△	▽
		65	17.26	16.26	18.26	17.12	16.21	18.03	17.93	17.15	18.72	△	△
	女	0	85.84	84.49	87.19	82.97	80.96	84.98	83.11	81.30	84.91	▼▼	△
		65	22.66	21.89	23.44	21.51	20.61	22.41	21.11	20.37	21.85	▼▼	▽
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.59	1.30	1.87	1.68	1.39	1.98	1.77	1.48	2.07	△	△
		65	1.90	1.56	2.23	1.93	1.60	2.26	2.08	1.74	2.41	△	△
	女	0	4.00	3.56	4.45	3.86	3.41	4.31	4.19	3.71	4.67	△	△
		65	4.15	3.70	4.60	4.15	3.69	4.61	4.51	4.03	5.00	△	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



読谷村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 読谷村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

読谷村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	79.36	78.29	80.43	80.49	79.43	81.55	81.37	80.34	82.39	▲▲	△
		65	19.11	18.36	19.86	20.23	19.56	20.90	20.99	20.34	21.65	▲▲	△
	女	0	87.24	86.27	88.22	86.70	85.80	87.61	87.75	86.94	88.55	△	△
		65	24.78	24.14	25.43	24.15	23.55	24.76	24.75	24.16	25.35	▽	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	77.72	76.73	78.71	78.54	77.55	79.52	79.44	78.49	80.39	▲▲	△
		65	17.24	16.57	17.91	18.03	17.43	18.62	18.83	18.25	19.42	▲▲	△
	女	0	83.37	82.50	84.24	82.90	82.11	83.70	83.71	83.02	84.40	△	△
		65	20.68	20.12	21.24	20.13	19.64	20.63	20.52	20.03	21.02	▽	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.64	1.39	1.88	1.96	1.71	2.20	1.92	1.71	2.14	△	▽
		65	1.87	1.59	2.15	2.20	1.93	2.48	2.16	1.92	2.40	△	▽
	女	0	3.87	3.53	4.22	3.80	3.49	4.11	4.04	3.74	4.34	△	△
		65	4.10	3.74	4.46	4.02	3.70	4.34	4.23	3.92	4.54	△	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



嘉手納町

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 嘉手納町の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

嘉手納町	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	78.57	76.73	80.42	78.56	76.69	80.44	79.96	78.02	81.91	△	△
		65	19.13	18.00	20.27	19.25	18.08	20.41	19.96	18.79	21.12	△	△
	女	0	87.37	85.79	88.95	87.35	85.82	88.87	87.23	85.92	88.53	▽	▽
		65	25.56	24.54	26.59	24.87	23.91	25.83	24.25	23.34	25.16	▽	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	76.82	75.09	78.56	76.79	75.04	78.54	78.10	76.29	79.92	△	△
		65	17.15	16.13	18.18	17.26	16.22	18.30	17.85	16.82	18.87	△	△
	女	0	83.56	82.17	84.95	83.74	82.38	85.11	83.89	82.73	85.04	△	△
		65	21.45	20.56	22.34	21.11	20.29	21.94	20.75	19.97	21.54	▽	▽
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.75	1.39	2.11	1.77	1.44	2.10	1.86	1.52	2.20	△	△
		65	1.98	1.56	2.40	1.99	1.61	2.37	2.11	1.73	2.49	△	△
	女	0	3.81	3.31	4.31	3.60	3.16	4.05	3.34	2.94	3.75	▽	▽
		65	4.11	3.59	4.64	3.76	3.30	4.21	3.50	3.09	3.91	▽	▽


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



北谷町

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 北谷町の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

北谷町	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	82.02	80.66	83.37	82.11	80.96	83.26	81.05	79.77	82.33	▽	▽
		65	21.35	20.34	22.37	20.77	19.90	21.65	20.26	19.44	21.09	▽	▽
	女	0	88.58	87.32	89.84	88.08	86.82	89.35	88.16	87.20	89.12	▽	△
		65	26.20	25.40	27.01	26.65	25.89	27.42	25.02	24.33	25.71	▼▼	▼▼
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	80.03	78.77	81.29	80.04	78.98	81.09	79.19	78.00	80.38	▽	▽
		65	19.15	18.23	20.08	18.52	17.73	19.30	18.21	17.48	18.95	▽	▽
	女	0	84.65	83.50	85.80	83.75	82.62	84.88	84.38	83.53	85.22	▽	△
		65	22.08	21.36	22.80	21.98	21.31	22.65	21.08	20.49	21.67	▼▼	▼▼
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.98	1.60	2.37	2.07	1.76	2.38	1.86	1.59	2.13	▽	▽
		65	2.20	1.77	2.63	2.26	1.91	2.60	2.05	1.76	2.35	▽	▽
	女	0	3.93	3.49	4.37	4.33	3.91	4.76	3.79	3.44	4.14	▽	▽
		65	4.12	3.67	4.58	4.67	4.23	5.12	3.94	3.58	4.30	▽	▼▼


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



北中城村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 北中城村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

北中城村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	81.12	79.16	83.09	82.93	81.21	84.64	83.38	81.41	85.34	△	△
		65	21.65	20.49	22.82	22.47	21.25	23.69	24.27	23.03	25.50	▲▲	▲▲
	女	0	91.40	89.69	93.11	90.63	88.80	92.46	91.95	90.38	93.51	△	△
		65	29.41	28.27	30.56	29.50	28.36	30.64	29.94	28.99	30.89	△	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	79.45	77.58	81.32	80.86	79.26	82.45	81.44	79.58	83.29	△	△
		65	19.75	18.67	20.84	20.13	19.02	21.25	22.06	20.92	23.20	▲▲	▲▲
	女	0	87.79	86.22	89.35	86.17	84.52	87.82	88.08	86.65	89.52	△	△
		65	25.58	24.54	26.62	24.66	23.65	25.68	25.85	24.98	26.71	△	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.67	1.28	2.07	2.07	1.66	2.48	1.94	1.58	2.31	△	▽
		65	1.90	1.45	2.35	2.34	1.88	2.80	2.21	1.79	2.62	△	▽
	女	0	3.62	3.09	4.14	4.46	3.89	5.03	3.87	3.40	4.33	△	▽
		65	3.83	3.28	4.38	4.84	4.24	5.44	4.09	3.60	4.58	△	▽


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



中城村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 中城村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

中城村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	81.62	79.90	83.33	81.62	80.27	82.98	80.63	79.14	82.11	▽	▽
		65	20.79	19.59	21.99	19.94	18.97	20.90	20.18	19.16	21.19	▽	△
	女	0	90.41	88.61	92.21	90.23	88.78	91.69	88.55	87.29	89.81	▽	▽
		65	27.98	26.71	29.26	27.91	26.86	28.96	25.90	25.03	26.76	▼▼	▼▼
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	79.78	78.17	81.39	79.74	78.48	80.99	78.78	77.40	80.16	▽	▽
		65	18.80	17.70	19.90	17.93	17.06	18.79	18.09	17.20	18.99	▽	△
	女	0	86.11	84.50	87.71	85.38	84.11	86.66	84.40	83.29	85.51	▽	▽
		65	23.50	22.41	24.58	22.79	21.89	23.68	21.52	20.78	22.26	▼▼	▼▼
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.83	1.45	2.22	1.89	1.56	2.21	1.85	1.54	2.16	△	▽
		65	1.99	1.56	2.42	2.01	1.66	2.36	2.08	1.74	2.43	△	△
	女	0	4.31	3.72	4.89	4.85	4.30	5.40	4.15	3.71	4.59	▽	▽
		65	4.49	3.88	5.09	5.12	4.55	5.69	4.38	3.92	4.83	▽	▼▼


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



西原町

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 西原町の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

西原町	性別	年齢 (歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	80.86	79.64	82.08	81.98	80.74	83.23	83.56	82.56	84.56	▲▲	△
		65	20.33	19.49	21.17	21.49	20.70	22.27	21.43	20.71	22.16	△	▽
	女	0	87.42	86.26	88.57	88.48	87.53	89.44	89.26	88.25	90.26	▲▲	△
		65	24.88	24.09	25.67	25.48	24.80	26.17	26.47	25.83	27.11	▲▲	▲▲
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	79.06	77.91	80.20	79.86	78.69	81.02	81.60	80.67	82.53	▲▲	▲▲
		65	18.33	17.56	19.10	19.15	18.43	19.86	19.36	18.71	20.02	▲▲	△
	女	0	83.43	82.40	84.45	84.34	83.49	85.19	84.63	83.73	85.53	△	△
		65	20.70	20.03	21.37	21.14	20.54	21.74	21.63	21.07	22.19	▲▲	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.80	1.50	2.11	2.13	1.82	2.43	1.96	1.70	2.22	△	▽
		65	2.00	1.66	2.34	2.34	2.00	2.67	2.07	1.79	2.35	△	▽
	女	0	3.99	3.58	4.40	4.15	3.76	4.54	4.63	4.25	5.01	▲▲	△
		65	4.18	3.75	4.61	4.34	3.94	4.75	4.84	4.45	5.23	▲▲	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



与那原町

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 与那原町の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

与那原町	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	78.98	77.35	80.62	80.80	79.16	82.44	80.75	79.28	82.21	△	▽
		65	18.80	17.63	19.97	20.71	19.64	21.78	19.67	18.75	20.58	△	▽
	女	0	88.48	87.07	89.89	87.06	85.57	88.55	88.07	86.55	89.59	▽	△
		65	25.22	24.14	26.29	25.01	24.04	25.99	25.98	25.15	26.81	△	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	77.29	75.77	78.81	78.79	77.27	80.31	78.88	77.52	80.25	△	△
		65	16.84	15.80	17.88	18.42	17.46	19.37	17.62	16.80	18.44	△	▽
	女	0	84.64	83.41	85.88	83.57	82.22	84.92	83.76	82.38	85.14	▽	△
		65	21.25	20.34	22.15	21.28	20.43	22.12	21.43	20.72	22.15	△	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.70	1.33	2.06	2.01	1.62	2.39	1.86	1.55	2.18	△	▽
		65	1.96	1.54	2.38	2.29	1.85	2.73	2.04	1.70	2.39	△	▽
	女	0	3.83	3.31	4.36	3.49	3.05	3.93	4.31	3.84	4.78	△	▲▲
		65	3.97	3.44	4.51	3.74	3.28	4.20	4.55	4.06	5.03	△	▲▲


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



南風原町

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 南風原町の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

南風原町	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	82.22	81.09	83.34	82.70	81.61	83.79	82.19	81.02	83.36	▽	▽
		65	20.88	20.00	21.75	21.47	20.67	22.28	21.84	21.11	22.56	△	△
	女	0	87.97	86.80	89.14	88.37	87.34	89.40	89.43	88.46	90.40	△	△
		65	25.87	24.99	26.74	26.32	25.64	27.00	26.98	26.34	27.62	▲▲	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	80.22	79.18	81.26	80.67	79.65	81.68	80.37	79.26	81.47	△	▽
		65	18.70	17.91	19.50	19.27	18.54	20.00	19.81	19.14	20.48	▲▲	△
	女	0	83.95	82.92	84.98	84.33	83.40	85.26	85.46	84.58	86.33	▲▲	△
		65	21.59	20.85	22.33	22.01	21.41	22.61	22.78	22.20	23.35	▲▲	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.99	1.66	2.32	2.03	1.74	2.32	1.82	1.58	2.06	▽	▽
		65	2.17	1.81	2.54	2.21	1.88	2.53	2.03	1.76	2.30	▽	▽
	女	0	4.02	3.61	4.43	4.04	3.67	4.41	3.98	3.64	4.32	▽	▽
		65	4.28	3.84	4.71	4.31	3.92	4.69	4.20	3.85	4.55	▽	▽


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



八重瀬町

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 八重瀬町の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

八重瀬町	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	78.48	77.26	79.70	79.95	78.60	81.31	81.80	80.63	82.98	▲▲	▲▲
		65	18.22	17.38	19.05	20.05	19.21	20.90	21.15	20.38	21.92	▲▲	△
	女	0	85.27	84.04	86.49	87.29	86.17	88.42	87.62	86.67	88.58	▲▲	△
		65	23.24	22.49	23.99	24.35	23.60	25.10	24.95	24.29	25.60	▲▲	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	76.83	75.70	77.96	77.93	76.67	79.19	80.02	78.92	81.12	▲▲	▲▲
		65	16.35	15.61	17.09	17.79	17.05	18.54	19.18	18.49	19.87	▲▲	▲▲
	女	0	81.97	80.86	83.08	83.77	82.76	84.78	84.24	83.39	85.09	▲▲	△
		65	19.75	19.11	20.39	20.72	20.09	21.35	21.38	20.82	21.95	▲▲	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.65	1.39	1.91	2.03	1.74	2.32	1.78	1.54	2.02	△	▽
		65	1.87	1.57	2.16	2.26	1.94	2.59	1.97	1.70	2.24	△	▽
	女	0	3.30	2.97	3.63	3.52	3.19	3.85	3.38	3.08	3.68	△	▽
		65	3.49	3.14	3.84	3.63	3.29	3.97	3.56	3.25	3.88	△	▽


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】国頭村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】 国頭村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

国頭村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	75.85	72.62	79.08	78.48	75.14	81.82	79.99	77.14	82.85	△	△
		65	18.38	16.62	20.14	20.42	18.88	21.95	20.03	18.47	21.59	△	▽
	女	0	86.32	83.15	89.49	86.30	83.51	89.08	87.09	83.36	90.83	△	△
		65	24.63	23.19	26.07	23.85	22.15	25.55	25.39	24.40	26.37	△	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	74.27	71.23	77.31	76.68	73.54	79.83	78.18	75.52	80.83	△	△
		65	16.37	14.80	17.95	18.27	16.91	19.64	17.98	16.60	19.35	△	▽
	女	0	82.92	79.98	85.86	83.07	80.57	85.57	83.00	79.50	86.50	△	▽
		65	20.94	19.70	22.19	20.47	19.04	21.90	21.10	20.15	22.06	△	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.58	1.14	2.02	1.80	1.32	2.28	1.82	1.33	2.30	△	△
		65	2.01	1.48	2.54	2.14	1.59	2.69	2.05	1.52	2.58	△	▽
	女	0	3.40	2.79	4.01	3.23	2.61	3.84	4.09	3.42	4.77	△	△
		65	3.69	3.06	4.31	3.38	2.76	4.00	4.28	3.63	4.94	△	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】大宜味村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】 大宜味村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

大宜味村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	79.66	76.28	83.04	78.67	73.78	83.56	85.51	82.30	88.73	▲▲	▲▲
		65	20.02	17.74	22.30	19.57	17.73	21.41	24.31	22.04	26.58	▲▲	▲▲
	女	0	87.15	84.36	89.95	87.17	83.22	91.13	87.03	84.26	89.80	▽	▽
		65	24.36	22.13	26.59	25.50	23.78	27.22	23.67	21.57	25.76	▽	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	77.59	74.48	80.70	76.37	71.77	80.97	82.13	79.32	84.93	▲▲	▲▲
		65	17.56	15.55	19.56	16.85	15.31	18.40	20.47	18.52	22.43	▲▲	▲▲
	女	0	83.43	81.03	85.83	82.62	79.14	86.10	81.88	79.69	84.08	▽	▽
		65	20.38	18.49	22.27	20.55	19.11	21.99	18.27	16.70	19.83	▽	▼▼
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	2.07	1.41	2.73	2.30	1.61	3.00	3.39	2.45	4.32	▲▲	△
		65	2.46	1.70	3.22	2.72	1.95	3.49	3.83	2.83	4.84	▲▲	△
	女	0	3.72	2.91	4.53	4.55	3.59	5.51	5.15	4.06	6.23	▲▲	△
		65	3.98	3.15	4.81	4.95	4.00	5.90	5.40	4.31	6.49	△	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】東村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】東村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

東村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	79.99	76.16	83.82	79.05	74.18	83.92	76.64	70.62	82.66	▽	▽
		65	18.63	16.63	20.63	22.15	19.61	24.69	20.48	18.08	22.87	△	▽
	女	0	90.42	86.51	94.34	85.51	77.59	93.43	86.88	82.34	91.42	▽	△
		65	26.28	22.65	29.90	27.46	24.54	30.38	24.83	22.48	27.18	▽	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	78.37	74.75	81.99	77.14	72.62	81.67	74.77	69.17	80.36	▽	▽
		65	16.93	15.07	18.78	19.71	17.45	21.98	18.03	15.95	20.10	△	▽
	女	0	83.79	80.76	86.81	79.85	72.94	86.77	81.13	77.47	84.79	▽	△
		65	19.63	16.88	22.38	20.97	18.76	23.18	18.59	16.85	20.32	▽	▽
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.62	0.92	2.32	1.90	1.08	2.73	1.87	1.08	2.67	△	▽
		65	1.70	0.95	2.45	2.44	1.43	3.45	2.45	1.52	3.37	△	△
	女	0	6.64	4.75	8.52	5.66	3.94	7.38	5.75	4.14	7.36	▽	△
		65	6.65	4.76	8.54	6.49	4.78	8.20	6.24	4.67	7.82	▽	▽


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】今帰仁村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】今帰仁村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

今帰仁村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	77.27	74.39	80.15	82.21	80.18	84.24	79.49	76.56	82.42	△	▽
		65	19.43	18.12	20.74	21.09	19.73	22.46	20.92	19.84	21.99	△	▽
	女	0	89.65	87.74	91.56	86.73	83.89	89.57	90.46	89.01	91.90	△	▲▲
		65	26.63	25.31	27.94	26.18	24.92	27.44	26.82	25.77	27.88	△	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	75.45	72.71	78.19	79.93	78.07	81.79	77.44	74.67	80.21	△	▽
		65	17.26	16.09	18.43	18.57	17.38	19.76	18.52	17.57	19.47	△	▽
	女	0	85.36	83.67	87.04	82.67	80.07	85.27	85.58	84.36	86.80	△	▲▲
		65	22.14	21.01	23.28	21.79	20.75	22.84	21.80	20.92	22.68	▽	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.82	1.45	2.19	2.28	1.84	2.72	2.05	1.67	2.43	△	▽
		65	2.17	1.74	2.59	2.52	2.04	3.00	2.40	1.98	2.82	△	▽
	女	0	4.29	3.73	4.86	4.06	3.52	4.61	4.87	4.28	5.47	△	▲▲
		65	4.48	3.92	5.05	4.39	3.83	4.94	5.03	4.43	5.62	△	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】恩納村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】恩納村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

恩納村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	81.58	79.58	83.59	78.93	77.07	80.79	81.97	80.19	83.76	△	▲▲
		65	20.77	19.46	22.07	18.06	16.98	19.15	20.78	19.67	21.89	△	▲▲
	女	0	84.95	82.61	87.29	85.09	82.91	87.27	87.34	85.88	88.81	△	△
		65	24.86	23.80	25.92	23.34	22.26	24.42	24.09	23.13	25.04	▽	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	79.62	77.75	81.49	77.31	75.57	79.04	79.94	78.28	81.59	△	▲▲
		65	18.57	17.39	19.76	16.25	15.29	17.20	18.59	17.59	19.58	△	▲▲
	女	0	81.27	79.14	83.41	81.62	79.63	83.60	83.81	82.49	85.14	▲▲	△
		65	20.74	19.80	21.67	19.61	18.74	20.49	20.48	19.63	21.32	▽	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.96	1.52	2.40	1.62	1.28	1.97	2.04	1.63	2.45	△	△
		65	2.19	1.70	2.68	1.81	1.43	2.20	2.19	1.75	2.64	△	△
	女	0	3.67	3.14	4.20	3.47	2.97	3.97	3.53	3.05	4.01	▽	△
		65	4.12	3.57	4.68	3.73	3.21	4.24	3.61	3.13	4.09	▽	▽


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】宜野座村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】 宜野座村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

宜野座村	性別	年齢 (歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	78.41	75.74	81.07	81.59	78.98	84.20	79.98	77.44	82.52	△	▽
		65	17.54	15.83	19.25	20.02	18.55	21.48	18.97	17.45	20.50	△	▽
	女	0	82.24	78.48	86.00	87.36	85.55	89.17	85.49	83.02	87.95	△	▽
		65	23.58	21.92	25.24	23.74	22.42	25.06	23.72	22.08	25.37	△	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	77.18	74.65	79.71	80.16	77.67	82.64	78.43	76.06	80.81	△	▽
		65	16.19	14.62	17.75	18.45	17.11	19.79	17.28	15.92	18.64	△	▽
	女	0	79.95	76.39	83.50	84.99	83.33	86.64	82.60	80.43	84.78	△	▽
		65	20.98	19.51	22.46	21.27	20.08	22.46	20.60	19.23	21.98	▽	▽
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.23	0.81	1.65	1.44	0.97	1.91	1.55	1.09	2.00	△	△
		65	1.36	0.89	1.83	1.57	1.05	2.08	1.69	1.20	2.19	△	△
	女	0	2.29	1.75	2.83	2.38	1.84	2.91	2.89	2.26	3.51	△	△
		65	2.60	2.01	3.19	2.47	1.92	3.02	3.12	2.47	3.78	△	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】金武町

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】金武町の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

金武町	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	75.89	73.58	78.20	77.68	75.56	79.79	79.08	77.22	80.95	▲▲	△
		65	19.59	18.45	20.74	18.97	17.80	20.13	19.44	18.40	20.48	▽	△
	女	0	85.79	83.58	87.99	86.39	84.20	88.58	86.19	84.11	88.26	△	▽
		65	24.77	23.61	25.93	25.47	24.53	26.41	24.33	23.18	25.49	▽	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	74.06	71.91	76.22	75.91	73.93	77.88	77.26	75.53	78.99	▲▲	△
		65	17.18	16.18	18.18	16.89	15.87	17.91	17.28	16.37	18.19	△	△
	女	0	82.09	80.09	84.09	82.88	80.87	84.90	82.44	80.58	84.30	△	▽
		65	20.73	19.75	21.71	21.70	20.89	22.51	20.32	19.38	21.26	▽	▼▼
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.83	1.42	2.23	1.77	1.40	2.13	1.82	1.48	2.17	▽	△
		65	2.41	1.90	2.92	2.08	1.65	2.50	2.16	1.77	2.55	▽	△
	女	0	3.70	3.18	4.21	3.51	3.04	3.98	3.75	3.25	4.24	△	△
		65	4.04	3.50	4.57	3.77	3.29	4.26	4.01	3.51	4.51	▽	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】伊江村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】伊江村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

伊江村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	80.26	77.75	82.77	80.22	77.98	82.46	83.05	80.36	85.75	△	△
		65	18.69	17.16	20.23	19.40	17.81	20.98	21.14	19.46	22.81	▲▲	△
	女	0	86.74	82.98	90.51	86.58	84.27	88.89	87.62	85.41	89.82	△	△
		65	25.43	23.86	27.01	23.82	22.26	25.39	24.67	23.12	26.22	▽	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	78.43	76.09	80.78	78.34	76.29	80.38	80.82	78.35	83.30	△	△
		65	16.71	15.34	18.09	17.26	15.86	18.66	18.75	17.29	20.22	▲▲	△
	女	0	82.30	78.89	85.70	82.87	80.86	84.88	83.61	81.72	85.50	△	△
		65	20.68	19.34	22.01	19.90	18.59	21.21	20.45	19.17	21.72	▽	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.82	1.30	2.34	1.89	1.38	2.39	2.23	1.62	2.84	△	△
		65	1.98	1.42	2.54	2.14	1.57	2.71	2.38	1.74	3.03	△	△
	女	0	4.45	3.62	5.27	3.71	3.05	4.37	4.01	3.28	4.73	▽	△
		65	4.76	3.94	5.58	3.92	3.25	4.60	4.22	3.48	4.96	▽	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】渡嘉敷村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】 渡嘉敷村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

渡嘉敷村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	70.57	62.45	78.70	79.30	72.39	86.21	83.42	76.60	90.24	▲▲	△
		65	15.01	9.72	20.29	20.84	14.89	26.79	22.77	19.38	26.16	▲▲	△
	女	0	92.74	84.98	100.50	89.04	85.25	92.84	93.94	85.50	102.38	△	△
		65	31.77	30.09	33.44	24.04	20.25	27.84	28.94	20.50	37.38	▽	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	69.07	61.48	76.67	77.19	71.01	83.37	81.16	74.59	87.73	▲▲	△
		65	13.09	8.47	17.71	18.19	13.00	23.39	20.23	16.72	23.74	▲▲	△
	女	0	86.17	79.00	93.33	85.34	82.12	88.57	88.17	80.99	95.36	△	△
		65	24.81	21.86	27.77	20.46	17.26	23.66	23.17	15.99	30.36	▽	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.50	0.19	2.81	2.11	0.42	3.79	2.26	0.48	4.04	△	△
		65	1.92	0.24	3.59	2.65	0.55	4.75	2.54	0.58	4.49	△	▽
	女	0	6.57	3.73	9.42	3.70	1.56	5.84	5.77	2.45	9.08	▽	△
		65	6.96	4.11	9.80	3.58	1.47	5.69	5.77	2.45	9.08	▽	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】座間味村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】座間味村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

座間味村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	77.73	70.96	84.49	79.26	73.91	84.60	78.82	68.58	89.05	△	▽
		65	22.70	20.15	25.26	15.35	10.18	20.52	19.89	16.25	23.52	▽	△
	女	0	90.84	89.83	91.84	88.15	88.15	88.15	85.06	80.40	89.72	▼▼	▽
		65	25.84	24.83	26.84	23.15	23.15	23.15	20.06	15.40	24.72	▼▼	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	76.28	69.86	82.69	76.74	72.57	80.91	75.98	66.28	85.68	▽	▽
		65	20.63	18.07	23.19	12.71	8.78	16.64	16.71	13.70	19.73	▽	△
	女	0	87.00	85.30	88.69	82.73	81.06	84.40	80.80	77.45	84.15	▼▼	▽
		65	22.00	20.30	23.69	17.73	16.06	19.40	15.80	12.45	19.15	▼▼	▽
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.45	0.38	2.52	2.51	0.67	4.36	2.84	1.02	4.66	△	△
		65	2.07	0.65	3.49	2.64	0.72	4.56	3.17	1.20	5.14	△	△
	女	0	3.84	2.26	5.42	5.42	3.75	7.09	4.26	2.10	6.43	△	▽
		65	3.84	2.26	5.42	5.42	3.75	7.09	4.26	2.10	6.43	△	▽


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】栗国村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】栗国村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

栗国村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	76.31	68.94	83.68	83.24	76.60	89.88	81.83	76.32	87.33	△	▽
		65	19.06	14.95	23.18	22.08	16.87	27.30	21.29	18.38	24.20	△	▽
	女	0	82.84	68.09	97.60	89.92	86.42	93.41	87.03	80.80	93.25	△	▽
		65	29.22	26.22	32.22	24.92	21.42	28.41	22.03	15.80	28.25	▼▼	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	74.37	67.59	81.14	80.53	74.63	86.43	79.00	74.05	83.94	△	▽
		65	16.57	12.95	20.18	19.04	14.61	23.47	18.04	15.35	20.73	△	▽
	女	0	76.91	63.68	90.13	84.90	82.02	87.79	81.41	77.27	85.55	△	▽
		65	22.21	19.64	24.78	19.90	17.02	22.79	16.52	12.39	20.64	▼▼	▽
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.94	0.81	3.08	2.71	1.16	4.27	2.83	1.41	4.25	△	△
		65	2.50	1.17	3.82	3.04	1.35	4.74	3.25	1.72	4.77	△	△
	女	0	5.94	3.54	8.33	5.01	2.93	7.10	5.62	2.45	8.79	▽	△
		65	7.01	4.83	9.18	5.01	2.93	7.10	5.51	2.36	8.66	▽	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】渡名喜村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】 渡名喜村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

渡名喜村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	79.34	73.09	85.60	80.86	76.62	85.11	83.85	78.85	88.85	△	△
		65	21.13	16.72	25.53	17.45	13.45	21.46	21.54	17.52	25.56	△	△
	女	0	92.66	88.55	96.76	86.41	80.57	92.26	82.46	72.80	92.12	▽	▽
		65	27.66	23.55	31.76	24.59	24.59	24.59	21.98	16.19	27.76	▽	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	77.83	72.03	83.64	78.80	75.17	82.43	81.82	77.23	86.42	△	△
		65	19.16	15.14	23.17	15.21	11.84	18.59	19.26	15.51	23.00	△	△
	女	0	86.43	82.61	90.25	80.61	75.95	85.28	78.84	70.60	87.09	▽	▽
		65	21.43	17.61	25.25	18.01	16.31	19.71	17.81	13.30	22.33	▽	▽
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.51	0.21	2.81	2.06	0.58	3.54	2.03	0.47	3.59	△	▽
		65	1.97	0.34	3.60	2.24	0.65	3.83	2.29	0.57	4.00	△	△
	女	0	6.23	3.36	9.09	5.80	3.73	7.87	3.62	1.20	6.04	▽	▽
		65	6.23	3.36	9.09	6.58	4.88	8.28	4.17	1.63	6.70	▽	▽


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】南大東村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】 南大東村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

南大東村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	84.30	80.23	88.36	79.83	73.68	85.97	84.32	79.15	89.50	△	△
		65	23.02	19.91	26.14	19.53	15.82	23.24	25.54	23.27	27.81	△	▲▲
	女	0	84.61	80.02	89.20	89.83	85.62	94.05	86.57	81.52	91.63	△	▽
		65	24.06	21.73	26.39	27.21	24.21	30.21	22.47	17.55	27.40	▽	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	83.19	79.23	87.16	78.78	72.86	84.71	82.06	77.12	87.00	▽	△
		65	21.80	18.69	24.90	18.34	14.88	21.80	22.87	20.46	25.27	△	▲▲
	女	0	81.83	77.59	86.06	84.98	81.21	88.75	82.08	78.29	85.87	△	▽
		65	20.90	18.55	23.25	21.97	19.07	24.86	17.87	14.22	21.51	▽	▽
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.11	0.00	2.21	1.04	0.22	1.86	2.27	0.97	3.56	△	△
		65	1.23	-0.03	2.49	1.19	0.27	2.11	2.67	1.17	4.18	△	△
	女	0	2.78	1.34	4.23	4.86	2.74	6.98	4.49	2.42	6.57	△	▽
		65	3.16	1.57	4.75	5.25	3.03	7.47	4.61	2.49	6.72	△	▽


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】北大東村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】 北大東村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

北大東村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	算定不能			81.33	77.71	84.95	82.78	69.81	95.76	-	△
		65	算定不能			16.33	12.71	19.95	26.12	17.74	34.51	-	▲▲
	女	0	92.03	92.03	92.03	88.10	77.59	98.61	算定不能			-	-
		65	27.03	27.03	27.03	28.65	19.94	37.36	算定不能			-	-
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	算定不能			79.86	76.60	83.11	80.18	68.36	91.99	-	△
		65	算定不能			14.94	11.69	18.19	23.00	15.94	30.07	-	▲▲
	女	0	89.86	87.50	92.23	81.65	73.03	90.26	算定不能			-	-
		65	24.86	22.50	27.23	21.29	14.22	28.37	算定不能			-	-
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	算定不能			1.47	0.22	2.72	2.60	-0.66	5.87	-	△
		65	算定不能			1.39	0.16	2.63	3.12	-0.71	6.95	-	△
	女	0	2.16	-0.20	4.53	6.45	1.39	11.51	算定不能			-	-
		65	2.16	-0.20	4.53	7.35	1.72	12.99	算定不能			-	-


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】伊平屋村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】伊平屋村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

伊平屋村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	79.42	72.93	85.92	79.33	71.49	87.18	79.18	74.53	83.83	▽	▽
		65	20.06	17.00	23.12	21.59	18.49	24.69	19.92	16.57	23.27	▽	▽
	女	0	88.63	82.50	94.76	89.23	87.16	91.29	95.54	89.17	101.90	△	△
		65	29.22	27.54	30.90	24.23	22.16	26.29	30.54	24.17	36.90	△	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	77.48	71.35	83.60	77.40	69.99	84.80	77.80	73.52	82.08	△	△
		65	17.79	15.09	20.48	19.19	16.41	21.98	18.23	15.32	21.15	△	▽
	女	0	84.16	78.79	89.53	85.17	83.31	87.03	88.98	83.97	93.99	△	△
		65	23.97	22.13	25.81	20.17	18.31	22.03	24.03	19.03	29.04	△	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.95	0.90	2.99	1.94	0.90	2.98	1.38	0.51	2.25	▽	▽
		65	2.27	1.10	3.45	2.40	1.21	3.59	1.69	0.63	2.75	▽	▽
	女	0	4.47	2.90	6.04	4.06	2.71	5.41	6.56	3.85	9.26	△	△
		65	5.25	3.70	6.81	4.06	2.71	5.41	6.50	3.80	9.20	△	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】伊是名村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】伊是名村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

伊是名村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	77.70	73.88	81.53	79.23	74.43	84.04	76.68	71.88	81.48	▽	▽
		65	16.53	13.86	19.20	20.37	17.65	23.10	17.68	15.10	20.25	△	▽
	女	0	83.45	75.21	91.69	87.63	83.24	92.03	83.51	78.49	88.53	△	▽
		65	23.28	20.21	26.35	24.99	22.02	27.97	21.40	18.35	24.45	▽	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	76.16	72.60	79.73	77.17	72.76	81.57	75.10	70.64	79.55	▽	▽
		65	14.88	12.47	17.29	17.85	15.43	20.27	15.74	13.49	17.98	△	▽
	女	0	80.25	72.54	87.95	83.81	79.98	87.64	80.19	75.84	84.54	▽	▽
		65	19.92	17.20	22.63	20.92	18.38	23.45	17.79	15.32	20.27	▽	▽
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.54	0.82	2.26	2.06	1.11	3.02	1.59	0.81	2.36	△	▽
		65	1.65	0.87	2.43	2.52	1.42	3.63	1.94	1.04	2.84	△	▽
	女	0	3.20	2.10	4.30	3.83	2.55	5.10	3.31	1.99	4.63	△	▽
		65	3.37	2.31	4.43	4.08	2.78	5.37	3.61	2.26	4.96	△	▽


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】久米島町

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】久米島町の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

久米島村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	76.20	73.55	78.84	80.09	78.01	82.16	78.78	76.24	81.32	△	▽
		65	18.69	17.31	20.07	20.16	18.79	21.52	19.22	17.99	20.46	△	▽
	女	0	90.07	88.40	91.75	84.71	81.91	87.51	86.64	84.75	88.53	▼▼	△
		65	26.75	25.61	27.90	24.23	22.71	25.76	23.91	22.64	25.18	▼▼	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	74.81	72.28	77.33	78.03	76.13	79.93	76.99	74.59	79.39	△	▽
		65	16.93	15.68	18.19	17.75	16.56	18.95	17.17	16.08	18.26	△	▽
	女	0	85.46	83.99	86.92	80.49	78.04	82.94	82.36	80.75	83.97	▼▼	△
		65	21.97	20.98	22.95	19.57	18.38	20.75	19.39	18.36	20.41	▼▼	▽
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.39	1.07	1.71	2.06	1.64	2.48	1.79	1.40	2.17	△	▽
		65	1.76	1.37	2.15	2.40	1.93	2.88	2.05	1.62	2.48	△	▽
	女	0	4.62	3.98	5.25	4.22	3.56	4.87	4.29	3.65	4.92	▽	△
		65	4.79	4.15	5.43	4.67	3.99	5.34	4.52	3.88	5.16	▽	▽


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】多良間村

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】多良間村の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

多良間村	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	76.47	72.26	80.68	78.09	74.08	82.11	81.16	67.01	95.31	△	△
		65	17.13	14.77	19.49	17.63	14.61	20.64	25.42	20.39	30.45	▲▲	▲▲
	女	0	90.61	86.58	94.65	83.80	78.38	89.23	88.27	86.37	90.17	▽	△
		65	26.88	23.51	30.25	22.52	20.37	24.67	23.27	21.37	25.17	▽	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	75.35	71.41	79.28	76.58	72.92	80.24	77.64	64.21	91.07	△	△
		65	15.74	13.66	17.83	15.76	13.11	18.41	21.32	16.73	25.91	▲▲	▲▲
	女	0	86.42	82.87	89.96	82.18	77.05	87.30	86.30	84.71	87.89	▽	△
		65	22.55	19.55	25.55	20.71	18.78	22.63	21.30	19.71	22.89	▽	△
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.13	0.38	1.87	1.51	0.72	2.31	3.52	0.93	6.11	△	△
		65	1.39	0.48	2.29	1.87	0.93	2.80	4.10	1.18	7.02	△	△
	女	0	4.20	2.56	5.84	1.63	0.79	2.47	1.97	1.14	2.80	▼▼	△
		65	4.33	2.67	5.99	1.82	0.92	2.71	1.97	1.14	2.80	▽	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】竹富町

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】 竹富町の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

竹富町	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	77.40	73.83	80.96	78.09	68.77	87.41	78.25	74.34	82.16	△	△
		65	16.69	14.52	18.85	21.42	19.41	23.44	19.42	17.70	21.15	△	▽
	女	0	92.41	89.97	94.85	87.72	84.47	90.96	88.47	85.69	91.25	▼▼	△
		65	28.66	26.88	30.45	25.85	23.57	28.13	25.39	23.22	27.57	▼▼	▽
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	76.22	72.81	79.62	76.53	67.50	85.56	76.88	73.12	80.64	△	△
		65	15.36	13.38	17.34	19.51	17.79	21.24	17.84	16.30	19.38	△	▽
	女	0	87.52	85.30	89.75	84.33	81.48	87.19	84.16	81.93	86.40	▼▼	▽
		65	23.64	21.93	25.34	22.24	20.33	24.16	20.84	19.19	22.49	▼▼	▽
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.18	0.69	1.67	1.56	0.90	2.21	1.36	0.84	1.89	△	▽
		65	1.33	0.79	1.88	1.91	1.17	2.66	1.58	0.98	2.19	△	▽
	女	0	4.89	3.73	6.04	3.38	2.52	4.24	4.31	3.28	5.34	▽	△
		65	5.03	3.86	6.19	3.60	2.71	4.50	4.55	3.49	5.61	▽	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020




0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020



【参考】与那国町

【健康な状態の定義】 日常生活動作が自立している期間の平均（平均自立期間：要介護2以上）


【算定方法】 2020年：人口 2020年の3倍、死亡数 2019-2021年の合計

【推移検定】 【参考】与那国町の2010年と2020年、2015年と2020年の比較で、5%有意水準による差の検定結果により判定


【数値表】

与那国町	性別	年齢(歳)	2010			2015			2020			推移検定結果	
			推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		推定値	95%信頼区間		2010-2020	2015-2020
平均余命	男	0	79.80	76.02	83.58	76.40	70.22	82.58	75.59	72.24	78.94	▽	▽
		65	18.54	15.75	21.34	18.21	14.38	22.03	14.21	11.67	16.76	▼▼	▽
	女	0	87.20	82.75	91.65	84.63	81.46	87.79	87.97	84.29	91.66	△	△
		65	25.81	23.58	28.04	20.16	17.09	23.22	24.19	21.21	27.16	▽	△
平均自立期間 (要介護2以上)	男	0	77.95	74.49	81.42	73.77	68.21	79.33	74.42	71.33	77.52	▽	△
		65	16.42	13.91	18.93	15.05	12.12	17.99	12.98	10.72	15.25	▼▼	▽
	女	0	81.45	77.66	85.23	82.05	79.49	84.62	85.19	81.93	88.46	△	△
		65	19.48	17.54	21.41	17.52	15.07	19.98	21.29	18.71	23.88	△	▲▲
自立していない期間の 平均 (平均余命と平均自立期間の 差)	男	0	1.84	0.88	2.81	2.63	1.28	3.98	1.17	0.54	1.79	▽	▽
		65	2.12	1.04	3.21	3.15	1.57	4.74	1.23	0.54	1.92	▽	▼▼
	女	0	5.75	4.11	7.39	2.57	1.43	3.71	2.78	1.51	4.06	▼▼	△
		65	6.33	4.67	8.00	2.64	1.48	3.80	2.89	1.58	4.20	▼▼	△


0歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



0歳の自立していない期間の平均
2010-2020



65歳の平均余命と平均自立期間（要介護2以上）
2010-2020



65歳の自立していない期間の平均
2010-2020

