

## 目次

### 第2部 身体状況調査の結果

第74表	身長・体重の平均値及び標準偏差－年齢階級別,人数,平均値,標準偏差－男性・女性,1歳以上〔体重は妊婦除外〕	234
第75表	BMIの平均値及び標準偏差－年齢階級別,人数,平均値,標準偏差－男性・女性,15歳以上〔妊婦除外〕	235
第76表	BMIの分布－年齢階級別,人数,割合－男性・女性,15歳以上〔妊婦除外〕	236
第77表の1	BMIの状況－年齢階級別,人数,割合－総数・男性・女性,15歳以上〔妊婦除外〕	237
第77表の2	目標とするBMIの範囲の分布－年齢階級別,人数,割合－総数・男性・女性,18歳以上〔妊婦除外〕	238
第78表	腹囲の分布－年齢階級別,人数,割合－総数・男性・女性,20歳以上〔妊婦除外〕	239
第79表	BMI・腹囲の分布－年齢階級別,人数,割合－総数・男性・女性,20歳以上〔妊婦除外〕	240
第80表	薬の服用状況－年齢階級別,人数,割合－総数・男性・女性,20歳以上	241
第81表の1	血圧の状況〔日本高血圧学会による血圧の分類別〕－年齢階級別,人数,割合－総数・男性・女性,20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕	242
第81表の2	血圧の状況〔日本高血圧学会による血圧の分類別〕－年齢階級別,人数,割合－総数・男性・女性,20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕	243
第82表の1	収縮期(最高)血圧・拡張期(最低)血圧の分布－年齢階級別,人数,割合－男性・女性,20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕	244
第82表の2	収縮期(最高)血圧・拡張期(最低)血圧の平均値及び標準偏差－年齢階級別,人数,平均値,標準偏差－男性・女性,20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕	245
表82表の3	収縮期(最高)血圧・拡張期(最低)血圧の分布－年齢階級別,人数,割合－男性・女性,20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕	246
第82表の4	収縮期(最高)血圧・拡張期(最低)血圧の平均値及び標準偏差－年齢階級別,人数,平均値,標準偏差－男性・女性,20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕	247
第83表の1	ヘモグロビンA1c(NGSP)の分布－年齢階級別,人数,割合－男性・女性,20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む〕	248
第83表の2	ヘモグロビンA1c(NGSP)の平均値及び標準偏差－年齢階級別,人数,平均値,標準偏差－男性・女性,20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕	248
第83表の3	ヘモグロビンA1c(NGSP)の分布－年齢階級別,人数,割合－男性・女性,20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕	249
第83表の4	ヘモグロビンA1c(NGSP)の平均値及び標準偏差－年齢階級別,人数,平均値,標準偏差－男性・女性,20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕	249
第84表の1	血清総コレステロールの分布－年齢階級別,人数,割合－男性・女性,20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕	250
第84表の2	血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差－年齢階級別,人数,平均値,標準偏差－男性・女性,20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕	250
第84表の3	血清総コレステロールの分布－年齢階級別,人数,割合－男性・女性,20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕	251
第84表の4	血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差－年齢階級別,人数,平均値,標準偏差－男性・女性,20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕	251

第 85 表の 1	血清 HDL コレステロールの分布－年齢階級別, 人数, 割合－男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕……………	252
第 85 表の 2	血清 HDL コレステロール値の平均値及び標準偏差－年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差－男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕……………	252
第 85 表の 3	血清 HDL コレステロールの分布－年齢階級別, 人数, 割合－男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕……………	253
第 85 表の 4	血清 HDL コレステロール値の平均値及び標準偏差－年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差－男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕……………	253
第 86 表の 1	血清 LDL コレステロールの分布－年齢階級別, 人数, 割合－男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕……………	254
第 86 表の 2	血清 LDL コレステロール値の平均値及び標準偏差－年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差－男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕……………	254
第 86 表の 3	血清 LDL コレステロールの分布－年齢階級別, 人数, 割合－男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕……………	255
第 86 表の 4	血清 LDL コレステロール値の平均値及び標準偏差－年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差－男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕……………	255
第 87 表の 1	血清 non HDL コレステロールの分布－年齢階級別, 人数, 割合－男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕……………	256
第 87 表の 2	血清 non HDL コレステロール値の平均値及び標準偏差－年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差－男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕……………	256
第 87 表の 3	血清 non HDL コレステロールの分布－年齢階級別, 人数, 割合－男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕……………	257
第 87 表の 4	血清 non HDL コレステロール値の平均値及び標準偏差－年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差－男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕……………	257
第 88 表	メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群) の状況－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上〔妊婦除外〕……………	258
第 89 表の 1	腹囲区分別, 血中脂質, 血圧, 血糖のいずれかのリスクを有する割合－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上〔妊婦除外〕……………	259
第 89 表の 2	腹囲区分別, 血中脂質, 血圧, 血糖のリスクの保有状況〔すべての組み合わせ(①血中脂質②血圧③血糖)〕－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上〔妊婦除外〕……………	260
第 90 表	糖尿病の指摘の有無－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上……………	261
第 91 表	糖尿病を指摘されたことがある者における治療の有無－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上……………	261
第 92 表	現在, 糖尿病治療をしている者における投薬の有無－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上……………	262
第 93 表	現在, 糖尿病治療をしている者における生活習慣の改善の取り組み状況－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上……………	262
第 94 表	「糖尿病が強く疑われる者」及び「糖尿病の可能性を否定できない者」の状況－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上……………	263
第 95 表	「糖尿病が強く疑われる者」における治療の有無－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上……………	264

第 96 表	高血圧症有病者の状況－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	265
第 97 表	「脂質異常症が疑われる者」の状況－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	266
第 98 表	運動禁止の有無－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	267
第 99 表	1週間の運動日数－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	268
第 100 表	運動を行う日の平均運動時間－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	269
第 101 表	運動習慣の有無－年齢階級別, 人数, 割合－総数・男性・女性, 20歳以上	269
第 102 表	歩数の平均値及び標準偏差－年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差－総数・男性・女性, 20歳以上	270

第74表 身長・体重の平均値及び標準偏差—年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差—男性・女性, 1歳以上〔体重は妊婦除外〕

年齢	男性						女性					
	身長(cm)			体重(kg)			身長(cm)			体重(kg)		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	190	160.4	18.7	189	63.1	18.4	225	150.5	11.8	221	52.2	12.6
1-2歳	4	84.6	1.2	4	11.7	1.1	4	85.0	5.9	4	11.0	1.3
3-5歳	5	106.0	10.0	5	16.5	3.1	2	110.5	6.4	2	17.0	0.0
6-7歳	5	115.4	3.8	5	19.2	1.9	2	123.0	5.4	2	23.4	2.9
8-9歳	2	125.0	8.5	2	25.5	3.5	1	123.9	0.0	1	23.1	0.0
10-11歳	1	141.9	0.0	1	35.4	0.0	2	141.5	16.3	2	42.5	24.8
12-14歳	4	140.7	9.9	4	35.6	6.0	3	152.8	0.7	3	39.8	2.9
15-19歳	5	168.1	8.7	5	64.0	14.7	3	151.4	1.5	3	45.6	8.1
20-29歳	7	169.9	7.7	7	64.1	14.1	12	155.6	7.8	11	55.7	19.5
30-39歳	25	170.0	6.7	25	70.4	9.7	34	155.4	4.9	32	53.3	7.8
40-49歳	20	169.1	4.6	20	75.7	13.8	31	155.2	5.3	31	55.3	11.6
50-59歳	26	166.5	6.8	25	68.8	11.4	37	153.2	5.0	36	54.8	11.0
60-69歳	35	166.3	5.2	35	68.6	9.5	33	152.3	5.1	33	53.9	8.4
70歳以上	51	162.0	6.1	51	64.9	10.3	61	149.0	5.5	61	53.5	8.3
(再掲)												
20歳以上	164	166.1	6.7	163	68.4	11.3	208	152.6	5.9	204	54.2	10.1
60-64歳	13	169.0	4.9	13	70.5	6.0	12	153.0	5.1	12	53.4	7.9
65-69歳	22	164.8	4.8	22	67.6	11.1	21	152.0	5.1	21	54.3	8.9
70-74歳	23	163.9	6.1	23	67.8	13.1	32	150.8	5.5	32	54.2	9.3
75-79歳	14	162.9	5.5	14	64.5	5.3	15	148.1	4.0	15	53.1	6.3
80歳以上	14	157.9	4.8	14	60.6	7.6	14	145.8	5.4	14	52.4	8.3

注) 女性の体重の集計は妊婦2名を除外して行った。

第75表 BMIの平均値及び標準偏差－年齢階級別，人数，平均値，標準偏差－男性・女性，  
15歳以上〔妊婦除外〕

	男性			女性		
	人数	平均	標準偏差	人数	平均	標準偏差
総数	168	24.7	3.7	207	23.2	4.2
15-19歳	5	22.5	3.6	3	19.8	3.1
20-29歳	7	22.1	3.9	11	22.9	6.5
30-39歳	25	24.4	3.6	32	22.0	3.1
40-49歳	20	26.5	4.7	31	23.0	5.3
50-59歳	25	24.7	3.5	36	23.4	4.6
60-69歳	35	24.8	3.0	33	23.3	3.5
70歳以上	51	24.7	3.6	61	24.1	3.6
(再掲)						
20歳以上	163	24.8	3.7	204	23.3	4.2
20-69歳	112	24.8	3.7	143	22.9	4.4
40-69歳	80	25.2	3.7	100	23.2	4.5
65-69歳	22	24.8	3.6	21	23.5	3.6
70-74歳	23	25.2	5.0	32	23.8	3.4
75-79歳	14	24.3	1.4	15	24.3	3.6
80-84歳	8	24.6	2.3	4	27.2	3.5
80歳以上	14	24.3	2.1	14	24.7	4.0
85歳以上	6	23.9	1.9	10	23.6	3.8

注1) 身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお、妊婦2名を除外している。

注2) BMIは体重(kg)/(身長(m))<sup>2</sup>で算出した。

第76表 BMIの分布一年齢階級別、人数、割合—男性・女性、15歳以上〔妊婦除外〕

年齢階級	総数		15-19歳		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)20歳以上		(再掲)40-74歳		(再掲)65-74歳		(再掲)75歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	168	100.0	5	100.0	7	100.0	25	100.0	20	100.0	25	100.0	35	100.0	51	100.0	163	100.0	103	100.0	45	100.0	28	100.0	0	0.0
15未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-16未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16-17未満	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17-18未満	1	0.6	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
18-19未満	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	0.6	1	1.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0
19-20未満	10	6.0	2	40.0	1	14.3	1	4.0	0	0.0	2	8.0	1	2.9	3	5.9	8	4.9	6	5.8	4	8.9	0	0.0	0	0.0
20-21未満	10	6.0	0	0.0	1	14.3	3	12.0	1	5.0	2	8.0	1	2.9	2	3.9	10	6.1	6	5.8	3	6.7	0	0.0	0	0.0
21-22未満	14	8.3	1	20.0	1	14.3	4	16.0	2	10.0	0	0.0	3	8.6	3	5.9	13	8.0	5	4.9	3	6.7	3	10.7	0	0.0
22-23未満	12	7.1	0	0.0	1	14.3	2	8.0	1	5.0	1	4.0	5	14.3	2	3.9	12	7.4	9	8.7	4	8.9	0	0.0	0	0.0
23-24未満	27	16.1	0	0.0	1	14.3	2	8.0	2	10.0	2	8.0	7	20.0	13	25.5	27	16.6	14	13.6	8	17.8	10	35.7	0	0.0
24-25未満	23	13.7	0	0.0	0	0.0	4	16.0	3	15.0	3	12.0	5	14.3	8	15.7	23	14.1	12	11.7	3	6.7	7	25.0	0	0.0
25-26未満	23	13.7	1	20.0	0	0.0	4	16.0	4	20.0	5	20.0	4	11.4	5	9.8	22	13.5	15	14.6	4	8.9	3	10.7	0	0.0
26-27未満	15	8.9	0	0.0	0	0.0	1	4.0	1	5.0	5	20.0	2	5.7	6	11.8	15	9.2	11	10.7	3	6.7	3	10.7	0	0.0
27-28未満	6	3.6	1	20.0	0	0.0	1	4.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	2	3.9	5	3.1	3	2.9	2	4.4	1	3.6	0	0.0
28-29未満	4	2.4	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	2	3.9	4	2.5	2	1.9	1	2.2	1	3.6	0	0.0
29-30未満	6	3.6	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	1	4.0	4	11.4	0	0.0	6	3.7	5	4.9	3	6.7	0	0.0	0	0.0
30-31未満	3	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	1	4.0	1	2.9	0	0.0	3	1.8	3	2.9	1	2.2	0	0.0	0	0.0
31-32未満	3	1.8	0	0.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	1	4.0	0	0.0	1	2.0	3	1.8	2	1.9	1	2.2	0	0.0	0	0.0
32-33未満	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	2	1.2	2	1.9	1	2.2	0	0.0	0	0.0
33-34未満	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	0.6	1	1.0	1	2.2	0	0.0	0	0.0
34-35未満	2	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	2	1.2	2	1.9	1	2.2	0	0.0	0	0.0
35以上	4	2.4	0	0.0	0	0.0	1	4.0	2	10.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	4	2.5	3	2.9	1	2.2	0	0.0	0	0.0
総数	207	100.0	3	100.0	11	100.0	32	100.0	31	100.0	36	100.0	33	100.0	61	100.0	204	100.0	132	100.0	53	100.0	29	100.0	0	0.0
15未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15-16未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16-17未満	4	1.9	1	33.3	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	1	3.0	1	1.6	3	1.5	2	1.5	1	1.9	0	0.0	0	0.0
17-18未満	5	2.4	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	3.2	2	5.6	1	3.0	0	0.0	5	2.5	4	3.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0
18-19未満	17	8.2	0	0.0	3	27.3	4	12.5	3	9.7	1	2.8	3	9.1	3	4.9	17	8.3	8	6.1	3	5.7	2	6.9	0	0.0
19-20未満	18	8.7	0	0.0	0	0.0	5	15.6	3	9.7	5	13.9	0	0.0	5	8.2	18	8.8	9	6.8	1	1.9	4	13.8	0	0.0
20-21未満	17	8.2	1	33.3	1	9.1	4	12.5	4	12.9	3	8.3	2	6.1	2	3.3	16	7.8	11	8.3	4	7.5	0	0.0	0	0.0
21-22未満	26	12.6	0	0.0	4	36.4	5	15.6	5	16.1	2	5.6	4	12.1	6	9.8	26	12.7	15	11.4	7	13.2	2	6.9	0	0.0
22-23未満	19	9.2	1	33.3	0	0.0	2	6.3	5	16.1	5	13.9	3	9.1	3	4.9	18	8.8	16	12.1	4	7.5	0	0.0	0	0.0
23-24未満	25	12.1	0	0.0	0	0.0	4	12.5	1	3.2	2	5.6	7	21.2	11	18.0	25	12.3	15	11.4	8	15.1	6	20.7	0	0.0
24-25未満	19	9.2	0	0.0	0	0.0	2	6.3	5	16.1	3	8.3	1	3.0	8	13.1	19	9.3	15	11.4	7	13.2	2	6.9	0	0.0
25-26未満	20	9.7	0	0.0	0	0.0	3	9.4	1	3.2	3	8.3	5	15.2	8	13.1	20	9.8	12	9.1	7	13.2	5	17.2	0	0.0
26-27未満	8	3.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	3	9.1	3	4.9	8	3.9	7	5.3	4	7.5	1	3.4	0	0.0
27-28未満	6	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	1	3.0	3	4.9	6	2.9	4	3.0	2	3.8	2	6.9	0	0.0
28-29未満	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.6	0	0.0	1	1.6	3	1.5	3	2.3	1	1.9	0	0.0	0	0.0
29-30未満	4	1.9	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	0	0.0	1	3.0	2	3.3	4	2.0	1	0.8	0	0.0	2	6.9	0	0.0
30-31未満	5	2.4	0	0.0	0	0.0	1	3.1	1	3.2	1	2.8	0	0.0	2	3.3	5	2.5	2	1.5	0	0.0	2	6.9	0	0.0
31-32未満	3	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.8	0	0.0	2	3.3	3	1.5	2	1.5	1	1.9	1	3.4	0	0.0
32-33未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.0	0	0.0	1	0.5	1	0.8	1	1.9	0	0.0	0	0.0
33-34未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	1	0.5	1	0.8	1	1.9	0	0.0	0	0.0
34-35未満	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0
35以上	4	1.9	0	0.0	2	18.2	0	0.0	1	3.2	1	2.8	0	0.0	0	0.0	4	2.0	2	1.5	2	3.8	0	0.0	0	0.0

注1)身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお、妊婦2名を除外している。

注2)BMIは体重(kg)/(身長(m))<sup>2</sup>で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

第77表の1 BMIの状況—年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性, 15歳以上〔妊婦除外〕

	総数		やせ 18.5未満		普通 18.5以上25未満		肥満 25以上		(再掲) 20以下		(再掲) 25以上30未満		(再掲) 30以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	375	100.0	18	4.8	232	61.9	125	33.3	58	15.5	95	25.3	30	8.0
15-19歳	8	100.0	1	12.5	5	62.5	2	25.0	3	37.5	2	25.0	0	0.0
20-29歳	18	100.0	2	11.1	13	72.2	3	16.7	6	33.3	1	5.6	2	11.1
30-39歳	57	100.0	2	3.5	41	71.9	14	24.6	11	19.3	11	19.3	3	5.3
40-49歳	51	100.0	1	2.0	35	68.6	15	29.4	7	13.7	7	13.7	8	15.7
50-59歳	61	100.0	4	6.6	31	50.8	26	42.6	12	19.7	21	34.4	5	8.2
60-69歳	68	100.0	5	7.4	39	57.4	24	35.3	6	8.8	21	30.9	3	4.4
70歳以上	112	100.0	3	2.7	68	60.7	41	36.6	13	11.6	32	28.6	9	8.0
(再掲)														
20歳以上	367	100.0	17	4.6	227	61.9	123	33.5	55	15.0	93	25.3	30	8.2
20-69歳	255	100.0	14	5.5	159	62.4	82	32.2	42	16.5	61	23.9	21	8.2
40-69歳	180	100.0	10	5.6	105	58.3	65	36.1	25	13.9	49	27.2	16	8.9
65歳以上	155	100.0	6	3.9	92	59.4	57	36.8	17	11.0	45	29.0	12	7.7
65-69歳	43	100.0	3	7.0	24	55.8	16	37.2	4	9.3	13	30.2	3	7.0
70-74歳	55	100.0	2	3.6	33	60.0	20	36.4	7	12.7	14	25.5	6	10.9
75-79歳	29	100.0	1	3.4	19	65.5	9	31.0	3	10.3	8	27.6	1	3.4
80-84歳	12	100.0	0	0.0	6	50.0	6	50.0	0	0.0	5	41.7	1	8.3
80歳以上	28	100.0	0	0.0	16	57.1	12	42.9	3	10.7	10	35.7	2	7.1
85歳以上	16	100.0	0	0.0	10	62.5	6	37.5	3	18.8	5	31.3	1	6.3
男性	168	100.0	2	1.2	97	57.7	69	41.1	13	7.7	54	32.1	15	8.9
15-19歳	5	100.0	0	0.0	3	60.0	2	40.0	2	40.0	2	40.0	0	0.0
20-29歳	7	100.0	1	14.3	5	71.4	1	14.3	2	28.6	1	14.3	0	0.0
30-39歳	25	100.0	0	0.0	16	64.0	9	36.0	1	4.0	7	28.0	2	8.0
40-49歳	20	100.0	0	0.0	9	45.0	11	55.0	0	0.0	6	30.0	5	25.0
50-59歳	25	100.0	1	4.0	10	40.0	14	56.0	3	12.0	12	48.0	2	8.0
60-69歳	35	100.0	0	0.0	22	62.9	13	37.1	1	2.9	11	31.4	2	5.7
70歳以上	51	100.0	0	0.0	32	62.7	19	37.3	4	7.8	15	29.4	4	7.8
(再掲)														
20歳以上	163	100.0	2	1.2	94	57.7	67	41.1	11	6.7	52	31.9	15	9.2
20-69歳	112	100.0	2	1.8	62	55.4	48	42.9	7	6.3	37	33.0	11	9.8
40-69歳	80	100.0	1	1.3	41	51.3	38	47.5	4	5.0	29	36.3	9	11.3
65歳以上	73	100.0	0	0.0	46	63.0	27	37.0	5	6.8	21	28.8	6	8.2
65-69歳	22	100.0	0	0.0	14	63.6	8	36.4	1	4.5	6	27.3	2	9.1
70-74歳	23	100.0	0	0.0	12	52.2	11	47.8	4	17.4	7	30.4	4	17.4
75-79歳	14	100.0	0	0.0	10	71.4	4	28.6	0	0.0	4	28.6	0	0.0
80-84歳	8	100.0	0	0.0	5	62.5	3	37.5	0	0.0	3	37.5	0	0.0
80歳以上	14	100.0	0	0.0	10	71.4	4	28.6	0	0.0	4	28.6	0	0.0
85歳以上	6	100.0	0	0.0	5	83.3	1	16.7	0	0.0	1	16.7	0	0.0
女性	207	100.0	16	7.7	135	65.2	56	27.1	45	21.7	41	19.8	15	7.2
15-19歳	3	100.0	1	33.3	2	66.7	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0
20-29歳	11	100.0	1	9.1	8	72.7	2	18.2	4	36.4	0	0.0	2	18.2
30-39歳	32	100.0	2	6.3	25	78.1	5	15.6	10	31.3	4	12.5	1	3.1
40-49歳	31	100.0	1	3.2	26	83.9	4	12.9	7	22.6	1	3.2	3	9.7
50-59歳	36	100.0	3	8.3	21	58.3	12	33.3	9	25.0	9	25.0	3	8.3
60-69歳	33	100.0	5	15.2	17	51.5	11	33.3	5	15.2	10	30.3	1	3.0
70歳以上	61	100.0	3	4.9	36	59.0	22	36.1	9	14.8	17	27.9	5	8.2
(再掲)														
20歳以上	204	100.0	15	7.4	133	65.2	56	27.5	44	21.6	41	20.1	15	7.4
20-69歳	143	100.0	12	8.4	97	67.8	34	23.8	35	24.5	24	16.8	10	7.0
40-69歳	100	100.0	9	9.0	64	64.0	27	27.0	21	21.0	20	20.0	7	7.0
65歳以上	82	100.0	6	7.3	46	56.1	30	36.6	12	14.6	24	29.3	6	7.3
65-69歳	21	100.0	3	14.3	10	47.6	8	38.1	3	14.3	7	33.3	1	4.8
70-74歳	32	100.0	2	6.3	21	65.6	9	28.1	3	9.4	7	21.9	2	6.3
75-79歳	15	100.0	1	6.7	9	60.0	5	33.3	3	20.0	4	26.7	1	6.7
80-84歳	4	100.0	0	0.0	1	25.0	3	75.0	0	0.0	2	50.0	1	25.0
80歳以上	14	100.0	0	0.0	6	42.9	8	57.1	3	21.4	6	42.9	2	14.3
85歳以上	10	100.0	0	0.0	5	50.0	5	50.0	3	30.0	4	40.0	1	10.0

注1) 身長と体重の測定を行った15歳以上の者を集計対象とした。なお、妊婦2名を除外している。

注2) BMIは体重(kg)/(身長(m))<sup>2</sup>で算出し、小数点第3位で四捨五入した値を使用した。

※ 年齢調整した肥満者(BMI≥25)の割合(20歳以上)は、総数32.1%、男性40.4%、女性26.3%。

年齢調整した低栄養傾向の者(BMI≤20)の割合(65歳以上)は、総数11.2%、男性5.4%、女性16.0%。

年齢調整した肥満者の割合は、令和2年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を、年齢調整した低栄養傾向の者の割合は、令和2年国勢調査による基準人口(65-74歳、75-84歳、85歳以上の3区分)を用いて算出した。

第77表の2 目標とするBMIの範囲の分布—年齢階級別, 人数, 割合—総数・男性・女性,  
18歳以上〔妊婦除外〕

	総数		範囲未満		範囲内		範囲以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	370	100.0	52	14.1	194	52.4	124	33.5
	18-49歳	129	100.0	6	4.7	90	69.8	33	25.6
	50-69歳	129	100.0	23	17.8	56	43.4	50	38.8
	70歳以上	112	100.0	23	20.5	48	42.9	41	36.6
	(再掲)								
	18-19歳	3	100.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3
	20-29歳	18	100.0	2	11.1	13	72.2	3	16.7
	30-39歳	57	100.0	2	3.5	41	71.9	14	24.6
	40-49歳	51	100.0	1	2.0	35	68.6	15	29.4
	50-59歳	61	100.0	12	19.7	23	37.7	26	42.6
	60-69歳	68	100.0	11	16.2	33	48.5	24	35.3
	70-79歳	84	100.0	17	20.2	38	45.2	29	34.5
	80歳以上	28	100.0	6	21.4	10	35.7	12	42.9
	65歳以上	155	100.0	32	20.6	66	42.6	57	36.8
65-74歳	98	100.0	22	22.4	40	40.8	36	36.7	
75歳以上	57	100.0	10	17.5	26	45.6	21	36.8	
男性	総数	165	100.0	16	9.7	81	49.1	68	41.2
	18-49歳	54	100.0	1	1.9	31	57.4	22	40.7
	50-69歳	60	100.0	6	10.0	27	45.0	27	45.0
	70歳以上	51	100.0	9	17.6	23	45.1	19	37.3
	(再掲)								
	18-19歳	2	100.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0
	20-29歳	7	100.0	1	14.3	5	71.4	1	14.3
	30-39歳	25	100.0	0	0.0	16	64.0	9	36.0
	40-49歳	20	100.0	0	0.0	9	45.0	11	55.0
	50-59歳	25	100.0	3	12.0	8	32.0	14	56.0
	60-69歳	35	100.0	3	8.6	19	54.3	13	37.1
	70-79歳	37	100.0	7	18.9	15	40.5	15	40.5
	80歳以上	14	100.0	2	14.3	8	57.1	4	28.6
	65歳以上	73	100.0	12	16.4	34	46.6	27	37.0
65-74歳	45	100.0	9	20.0	17	37.8	19	42.2	
75歳以上	28	100.0	3	10.7	17	60.7	8	28.6	
女性	総数	205	100.0	36	17.6	113	55.1	56	27.3
	18-49歳	75	100.0	5	6.7	59	78.7	11	14.7
	50-69歳	69	100.0	17	24.6	29	42.0	23	33.3
	70歳以上	61	100.0	14	23.0	25	41.0	22	36.1
	(再掲)								
	18-19歳	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0
	20-29歳	11	100.0	1	9.1	8	72.7	2	18.2
	30-39歳	32	100.0	2	6.3	25	78.1	5	15.6
	40-49歳	31	100.0	1	3.2	26	83.9	4	12.9
	50-59歳	36	100.0	9	25.0	15	41.7	12	33.3
	60-69歳	33	100.0	8	24.2	14	42.4	11	33.3
	70-79歳	47	100.0	10	21.3	23	48.9	14	29.8
	80歳以上	14	100.0	4	28.6	2	14.3	8	57.1
	65歳以上	82	100.0	20	24.4	32	39.0	30	36.6
65-74歳	53	100.0	13	24.5	23	43.4	17	32.1	
75歳以上	29	100.0	7	24.1	9	31.0	13	44.8	

注1) 身長と体重の測定を行った18歳以上の者を集計対象とした。なお、妊婦2名を除外した。

注2) BMIは体重(kg)/(身長(m))<sup>2</sup>で算出した。

<参考> 目標とするBMIの範囲(18歳以上)<sup>1,2</sup>

年齢(歳)	目標とするBMI(kg/m <sup>2</sup> )
18-49	18.5-24.9
50-64	20.0-24.9
65-74 <sup>3</sup>	21.5-24.9
75以上 <sup>3</sup>	21.5-24.9

<sup>1</sup> 男女共通。あくまでも参考として使用するべきである。

<sup>2</sup> 上限は総死亡率の低減に加え、主な生活習慣病の有病率、医療費、高齢者及び労働者の身体機能低下との関連を考慮して定めた。

<sup>3</sup> 総死亡率をできるだけ低く抑えるためには下限は20.0から21.0付近となるが、その他の考慮すべき健康障害等を勘案して21.5とした。

(厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」)

第78表 腹囲の分布 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上〔妊婦除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	185	100.0	4	100.0	14	100.0	22	100.0	28	100.0	34	100.0	83	100.0	124	100.0	65	100.0	43	100.0
50cm未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
55-60	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60-65	1	0.5	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
65-70	9	4.9	2	50.0	0	0.0	1	4.5	3	10.7	1	2.9	2	2.4	6	4.8	2	3.1	1	2.3
70-75	10	5.4	1	25.0	1	7.1	3	13.6	2	7.1	1	2.9	2	2.4	7	5.6	2	3.1	1	2.3
75-80	30	16.2	0	0.0	5	35.7	6	27.3	3	10.7	5	14.7	11	13.3	21	16.9	12	18.5	4	9.3
80-85	32	17.3	1	25.0	2	14.3	3	13.6	5	17.9	7	20.6	14	16.9	22	17.7	11	16.9	7	16.3
85-90	32	17.3	0	0.0	3	21.4	4	18.2	6	21.4	5	14.7	14	16.9	21	16.9	9	13.8	8	18.6
90-95	36	19.5	0	0.0	1	7.1	1	4.5	2	7.1	8	23.5	24	28.9	21	16.9	15	23.1	14	32.6
95-100	26	14.1	0	0.0	1	7.1	1	4.5	4	14.3	7	20.6	13	15.7	18	14.5	12	18.5	7	16.3
100cm以上	9	4.9	0	0.0	0	0.0	3	13.6	3	10.7	0	0.0	3	3.6	8	6.5	2	3.1	1	2.3
(再掲)<85cm(男) /<90cm(女)	96	51.9	4	100.0	10	71.4	15	68.2	14	50.0	16	47.1	37	44.6	65	52.4	33	50.8	17	39.5
(再掲)≥85cm(男) /≥90cm(女)	89	48.1	0	0.0	4	28.6	7	31.8	14	50.0	18	52.9	46	55.4	59	47.6	32	49.2	26	60.5
総数	72	100.0	1	100.0	5	100.0	5	100.0	11	100.0	14	100.0	36	100.0	46	100.0	26	100.0	20	100.0
50cm未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
55-60	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60-65	1	1.4	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
65-70	2	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	0	0.0	1	2.8	2	4.3	1	3.8	0	0.0
70-75	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
75-80	9	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	3	21.4	5	13.9	7	15.2	6	23.1	2	10.0
80-85	7	9.7	1	100.0	1	20.0	0	0.0	1	9.1	2	14.3	2	5.6	3	6.5	1	3.8	2	10.0
85-90	18	25.0	0	0.0	2	40.0	2	40.0	5	45.5	3	21.4	6	16.7	12	26.1	3	11.5	4	20.0
90-95	14	19.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	13	36.1	7	15.2	6	23.1	7	35.0
95-100	15	20.8	0	0.0	1	20.0	1	20.0	1	9.1	5	35.7	7	19.4	9	19.6	7	26.9	5	25.0
100cm以上	6	8.3	0	0.0	0	0.0	2	40.0	2	18.2	0	0.0	2	5.6	6	13.0	2	7.7	0	0.0
(再掲)<85cm	19	26.4	1	100.0	2	40.0	0	0.0	3	27.3	5	35.7	8	22.2	12	26.1	8	30.8	4	20.0
(再掲)≥85cm	53	73.6	0	0.0	3	60.0	5	100.0	8	72.7	9	64.3	28	77.8	34	73.9	18	69.2	16	80.0
総数	113	100.0	3	100.0	9	100.0	17	100.0	17	100.0	20	100.0	47	100.0	78	100.0	39	100.0	23	100.0
50cm未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50-55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
55-60	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60-65	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
65-70	7	6.2	2	66.7	0	0.0	1	5.9	2	11.8	1	5.0	1	2.1	4	5.1	1	2.6	1	4.3
70-75	10	8.8	1	33.3	1	11.1	3	17.6	2	11.8	1	5.0	2	4.3	7	9.0	2	5.1	1	4.3
75-80	21	18.6	0	0.0	5	55.6	6	35.3	2	11.8	2	10.0	6	12.8	14	17.9	6	15.4	2	8.7
80-85	25	22.1	0	0.0	1	11.1	3	17.6	4	23.5	5	25.0	12	25.5	19	24.4	10	25.6	5	21.7
85-90	14	12.4	0	0.0	1	11.1	2	11.8	1	5.9	2	10.0	8	17.0	9	11.5	6	15.4	4	17.4
90-95	22	19.5	0	0.0	1	11.1	1	5.9	2	11.8	7	35.0	11	23.4	14	17.9	9	23.1	7	30.4
95-100	11	9.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	2	10.0	6	12.8	9	11.5	5	12.8	2	8.7
100cm以上	3	2.7	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	5.9	0	0.0	1	2.1	2	2.6	0	0.0	1	4.3
(再掲)<90cm	77	68.1	3	100.0	8	88.9	15	88.2	11	64.7	11	55.0	29	61.7	53	67.9	25	64.1	13	56.5
(再掲)≥90cm	36	31.9	0	0.0	1	11.1	2	11.8	6	35.3	9	45.0	18	38.3	25	32.1	14	35.9	10	43.5

注) 腹囲の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。なお、妊婦1名を除外した。

第79表 BMI・腹囲の分布 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上〔妊婦除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	185	100.0	4	100.0	14	100.0	22	100.0	28	100.0	34	100.0	83	100.0	124	100.0	65	100.0	43	100.0
BMI<25, 腹囲<85cm(男)/90cm(女)	90	48.6	4	100.0	8	57.1	15	68.2	13	46.4	16	47.1	34	41.0	63	50.8	32	49.2	15	34.9
BMIのみ超 (BMI≥25)	6	3.2	0	0.0	2	14.3	0	0.0	1	3.6	0	0.0	3	3.6	2	1.6	1	1.5	2	4.7
腹囲のみ超(腹囲≥85cm(男)/90cm(女))	37	20.0	0	0.0	2	14.3	2	9.1	3	10.7	9	26.5	21	25.3	23	18.5	13	20.0	12	27.9
BMI≥25, 腹囲≥85cm(男)/90cm(女)	52	28.1	0	0.0	2	14.3	5	22.7	11	39.3	9	26.5	25	30.1	36	29.0	19	29.2	14	32.6
総数	72	100.0	1	100.0	5	100.0	5	100.0	11	100.0	14	100.0	36	100.0	46	100.0	26	100.0	20	100.0
BMI<25, 腹囲<85cm	18	25.0	1	100.0	1	20.0	0	0.0	3	27.3	5	35.7	8	22.2	12	26.1	8	30.8	4	20.0
BMIのみ超 (BMI≥25)	1	1.4	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
腹囲のみ超(腹囲≥85cm)	26	36.1	0	0.0	2	40.0	1	20.0	2	18.2	6	42.9	15	41.7	14	30.4	8	30.8	10	50.0
BMI≥25, 腹囲≥85cm	27	37.5	0	0.0	1	20.0	4	80.0	6	54.5	3	21.4	13	36.1	20	43.5	10	38.5	6	30.0
総数	113	100.0	3	100.0	9	100.0	17	100.0	17	100.0	20	100.0	47	100.0	78	100.0	39	100.0	23	100.0
BMI<25, 腹囲<90cm	72	63.7	3	100.0	7	77.8	15	88.2	10	58.8	11	55.0	26	55.3	51	65.4	24	61.5	11	47.8
BMIのみ超 (BMI≥25)	5	4.4	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	5.9	0	0.0	3	6.4	2	2.6	1	2.6	2	8.7
腹囲のみ超(腹囲≥90cm)	11	9.7	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	5.9	3	15.0	6	12.8	9	11.5	5	12.8	2	8.7
BMI≥25, 腹囲≥90cm	25	22.1	0	0.0	1	11.1	1	5.9	5	29.4	6	30.0	12	25.5	16	20.5	9	23.1	8	34.8

注) 身長、体重及び腹囲の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。なお、妊婦1名を除外した。

〔参考〕内臓脂肪型肥満の診断基準:

- BMI 25以上で、男性のウエスト周囲径85cm以上、女性のウエスト周囲径90cm以上を上半身肥満の疑いとする。
  - 上半身肥満の疑いと判定され、腹部CT法による内臓脂肪面積100cm<sup>2</sup>以上(男女とも)を内臓脂肪型肥満と診断する。(日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会、2000年)
- ※ 県民健康・栄養調査の「腹囲」は、「立位のへその高さ」で計測したが、計測位置は「ウエスト周囲径」と同じである。

第80表 薬の服用状況 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	161	100.0	5	100.0	13	100.0	19	100.0	26	100.0	30	100.0	68	100.0	107	100.0	53	100.0	36	100.0
	使用なし	93	57.8	5	100.0	12	92.3	14	73.7	18	69.2	20	66.7	24	35.3	67	62.6	28	52.8	9	25.0
	使用あり(一つ以上)	68	42.2	0	0.0	1	7.7	5	26.3	8	30.8	10	33.3	44	64.7	40	37.4	25	47.2	27	75.0
	血圧を下げる薬	58	36.0	0	0.0	1	7.7	5	26.3	6	23.1	8	26.7	38	55.9	34	31.8	21	39.6	23	63.9
	脈の乱れに関する薬	8	5.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.7	6	8.8	4	3.7	3	5.7	4	11.1
	コレステロールを下げる薬	22	13.7	0	0.0	0	0.0	1	5.3	5	19.2	4	13.3	12	17.6	14	13.1	8	15.1	8	22.2
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	10	6.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	13.3	6	8.8	6	5.6	6	11.3	4	11.1
インスリン注射または血糖を下げる薬	13	8.1	0	0.0	1	7.7	0	0.0	1	3.8	1	3.3	10	14.7	6	5.6	4	7.5	6	16.7	
男性	総数	60	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	8	100.0	13	100.0	29	100.0	39	100.0	22	100.0	16	100.0
	使用なし	25	41.7	1	100.0	3	75.0	2	40.0	3	37.5	8	61.5	8	27.6	18	46.2	11	50.0	3	18.8
	使用あり(一つ以上)	35	58.3	0	0.0	1	25.0	3	60.0	5	62.5	5	38.5	21	72.4	21	53.8	11	50.0	13	81.3
	血圧を下げる薬	30	50.0	0	0.0	1	25.0	3	60.0	5	62.5	4	30.8	17	58.6	19	48.7	9	40.9	10	62.5
	脈の乱れに関する薬	6	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	15.4	4	13.8	2	5.1	1	4.5	4	25.0
	コレステロールを下げる薬	9	15.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	25.0	2	15.4	4	13.8	7	17.9	4	18.2	2	12.5
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	7	11.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	23.1	4	13.8	4	10.3	4	18.2	3	18.8
インスリン注射または血糖を下げる薬	10	16.7	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	12.5	1	7.7	7	24.1	4	10.3	2	9.1	5	31.3	
女性	総数	101	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	18	100.0	17	100.0	39	100.0	68	100.0	31	100.0	20	100.0
	使用なし	68	67.3	4	100.0	9	100.0	12	85.7	15	83.3	12	70.6	16	41.0	49	72.1	17	54.8	6	30.0
	使用あり(一つ以上)	33	32.7	0	0.0	0	0.0	2	14.3	3	16.7	5	29.4	23	59.0	19	27.9	14	45.2	14	70.0
	血圧を下げる薬	28	27.7	0	0.0	0	0.0	2	14.3	1	5.6	4	23.5	21	53.8	15	22.1	12	38.7	13	65.0
	脈の乱れに関する薬	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	5.1	2	2.9	2	6.5	0	0.0
	コレステロールを下げる薬	13	12.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	16.7	2	11.8	8	20.5	7	10.3	4	12.9	6	30.0
	中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬	3	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	2	5.1	2	2.9	2	6.5	1	5.0
インスリン注射または血糖を下げる薬	3	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.7	2	2.9	2	6.5	1	5.0	

注1) 血圧を下げる薬、脈の乱れに関する薬、コレステロールを下げる薬、中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬、及びインスリン注射又は血糖を下げる薬に回答した者を集計対象とした。

注2) 複数回答

注3) 身体状況調査の問診「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」に「無」と回答した者、(7)に「有」かつ「(7-1)現在の糖尿病治療の有無(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)」に「無」と回答した者、及び(7)及び(7-1)に「有」かつ「(7-2)現在の投薬(インスリン注射または血糖を下げる薬)の有無」に「無」と回答した者を、現在の状況を「無」とした。

第81表の1 血圧の状況〔日本高血圧学会による血圧の分類別〕－年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

	総数		正常血圧		正常高値血圧		高値血圧		I度高血圧		II度高血圧		III度高血圧		(再掲) 収縮期高血圧		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	155	100.0	42	27.1	24	15.5	55	35.5	31	20.0	3	1.9	0	0.0	25	16.1	
総数	20-29歳	5	100.0	4	80.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	13	100.0	7	53.8	2	15.4	3	23.1	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	19	100.0	5	26.3	2	10.5	10	52.6	1	5.3	1	5.3	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	25	100.0	8	32.0	4	16.0	9	36.0	4	16.0	0	0.0	0	0.0	2	8.0
	60-69歳	26	100.0	8	30.8	2	7.7	10	38.5	5	19.2	1	3.8	0	0.0	3	11.5
	70歳以上	67	100.0	10	14.9	14	20.9	22	32.8	20	29.9	1	1.5	0	0.0	20	29.9
	(再掲)40-74歳	101	100.0	28	27.7	11	10.9	39	38.6	21	20.8	2	2.0	0	0.0	15	14.9
	(再掲)40-64歳	53	100.0	16	30.2	8	15.1	21	39.6	7	13.2	1	1.9	0	0.0	2	3.8
	(再掲)65-74歳	48	100.0	12	25.0	3	6.3	18	37.5	14	29.2	1	2.1	0	0.0	13	27.1
	(再掲)75歳以上	36	100.0	3	8.3	11	30.6	12	33.3	9	25.0	1	2.8	0	0.0	10	27.8
男性	58	100.0	12	20.7	8	13.8	21	36.2	16	27.6	1	1.7	0	0.0	12	20.7	
20-29歳	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
30-39歳	4	100.0	2	50.0	0	0.0	1	25.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
40-49歳	5	100.0	0	0.0	0	0.0	4	80.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
50-59歳	8	100.0	1	12.5	1	12.5	3	37.5	3	37.5	0	0.0	0	0.0	2	25.0	
60-69歳	11	100.0	4	36.4	1	9.1	3	27.3	3	27.3	0	0.0	0	0.0	2	18.2	
70歳以上	29	100.0	5	17.2	6	20.7	9	31.0	8	27.6	1	3.4	0	0.0	8	27.6	
(再掲)40-74歳	37	100.0	9	24.3	3	8.1	14	37.8	11	29.7	0	0.0	0	0.0	7	18.9	
(再掲)40-64歳	17	100.0	2	11.8	2	11.8	8	47.1	5	29.4	0	0.0	0	0.0	2	11.8	
(再掲)65-74歳	20	100.0	7	35.0	1	5.0	6	30.0	6	30.0	0	0.0	0	0.0	5	25.0	
(再掲)75歳以上	16	100.0	1	6.3	5	31.3	5	31.3	4	25.0	1	6.3	0	0.0	5	31.3	
女性	97	100.0	30	30.9	16	16.5	34	35.1	15	15.5	2	2.1	0	0.0	13	13.4	
20-29歳	4	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
30-39歳	9	100.0	5	55.6	2	22.2	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
40-49歳	14	100.0	5	35.7	2	14.3	6	42.9	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	
50-59歳	17	100.0	7	41.2	3	17.6	6	35.3	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
60-69歳	15	100.0	4	26.7	1	6.7	7	46.7	2	13.3	1	6.7	0	0.0	1	6.7	
70歳以上	38	100.0	5	13.2	8	21.1	13	34.2	12	31.6	0	0.0	0	0.0	12	31.6	
(再掲)40-74歳	64	100.0	19	29.7	8	12.5	25	39.1	10	15.6	2	3.1	0	0.0	8	12.5	
(再掲)40-64歳	36	100.0	14	38.9	6	16.7	13	36.1	2	5.6	1	2.8	0	0.0	0	0.0	
(再掲)65-74歳	28	100.0	5	17.9	2	7.1	12	42.9	8	28.6	1	3.6	0	0.0	8	28.6	
(再掲)75歳以上	20	100.0	2	10.0	6	30.0	7	35.0	5	25.0	0	0.0	0	0.0	5	25.0	

注1) 血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。

注3) 日本高血圧学会による血圧の分類は「高血圧治療ガイドライン2019」による。

分類	収縮期血圧 (最高血圧)(mmHg)		拡張期血圧 (最低血圧)(mmHg)	
		かつ		
正常血圧	<120	かつ	<80	
正常高値血圧	120-129	かつ	<80	
高値血圧	130-139	かつ/または	80-89	
I度高血圧	140-159	かつ/または	90-99	
II度高血圧	160-179	かつ/または	100-109	
III度高血圧	≥180	かつ/または	≥110	
収縮期高血圧	≥140	かつ	<90	

第81表の2 血圧の状況〔日本高血圧学会による血圧の分類別〕－年齢階級別，人数，割合－総数・男性・女性，20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

	総数		正常血圧		正常高値血圧		高値血圧		Ⅰ度高血圧		Ⅱ度高血圧		Ⅲ度高血圧		(再掲) 収縮期高血圧		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	102	100.0	35	34.3	14	13.7	34	33.3	18	17.6	1	1.0	0	0.0	13	12.7	
総数	20-29歳	5	100.0	4	80.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39歳	12	100.0	7	58.3	2	16.7	3	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	14	100.0	5	35.7	1	7.1	7	50.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	19	100.0	8	42.1	4	21.1	5	26.3	2	10.5	0	0.0	0	0.0	1	5.3
	60-69歳	22	100.0	7	31.8	1	4.5	8	36.4	5	22.7	1	4.5	0	0.0	3	13.6
	70歳以上	30	100.0	4	13.3	6	20.0	10	33.3	10	33.3	0	0.0	0	0.0	9	30.0
	(再掲)40-74歳	72	100.0	23	31.9	9	12.5	25	34.7	14	19.4	1	1.4	0	0.0	9	12.5
	(再掲)40-64歳	40	100.0	15	37.5	6	15.0	14	35.0	5	12.5	0	0.0	0	0.0	1	2.5
	(再掲)65-74歳	32	100.0	8	25.0	3	9.4	11	34.4	9	28.1	1	3.1	0	0.0	8	25.0
	(再掲)75歳以上	13	100.0	1	7.7	3	23.1	5	38.5	4	30.8	0	0.0	0	0.0	4	30.8
男性	30	100.0	7	23.3	5	16.7	8	26.7	10	33.3	0	0.0	0	0.0	7	23.3	
20-29歳	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
30-39歳	3	100.0	2	66.7	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
40-49歳	2	100.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
50-59歳	3	100.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	
60-69歳	9	100.0	3	33.3	0	0.0	3	33.3	3	33.3	0	0.0	0	0.0	2	22.2	
70歳以上	12	100.0	1	8.3	4	33.3	2	16.7	5	41.7	0	0.0	0	0.0	4	33.3	
(再掲)40-74歳	20	100.0	5	25.0	2	10.0	5	25.0	8	40.0	0	0.0	0	0.0	5	25.0	
(再掲)40-64歳	7	100.0	1	14.3	1	14.3	2	28.6	3	42.9	0	0.0	0	0.0	1	14.3	
(再掲)65-74歳	13	100.0	4	30.8	1	7.7	3	23.1	5	38.5	0	0.0	0	0.0	4	30.8	
(再掲)75歳以上	6	100.0	0	0.0	3	50.0	1	16.7	2	33.3	0	0.0	0	0.0	2	33.3	
女性	72	100.0	28	38.9	9	12.5	26	36.1	8	11.1	1	1.4	0	0.0	6	8.3	
20-29歳	4	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
30-39歳	9	100.0	5	55.6	2	22.2	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
40-49歳	12	100.0	5	41.7	1	8.3	6	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
50-59歳	16	100.0	7	43.8	3	18.8	5	31.3	1	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
60-69歳	13	100.0	4	30.8	1	7.7	5	38.5	2	15.4	1	7.7	0	0.0	1	7.7	
70歳以上	18	100.0	3	16.7	2	11.1	8	44.4	5	27.8	0	0.0	0	0.0	5	27.8	
(再掲)40-74歳	52	100.0	18	34.6	7	13.5	20	38.5	6	11.5	1	1.9	0	0.0	4	7.7	
(再掲)40-64歳	33	100.0	14	42.4	5	15.2	12	36.4	2	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
(再掲)65-74歳	19	100.0	4	21.1	2	10.5	8	42.1	4	21.1	1	5.3	0	0.0	4	21.1	
(再掲)75歳以上	7	100.0	1	14.3	0	0.0	4	57.1	2	28.6	0	0.0	0	0.0	2	28.6	

注1) 血圧の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。

注3) 日本高血圧学会による血圧の分類は「高血圧治療ガイドライン2019」による。

第82表の1 収縮期(最高)血圧・拡張期(最低)血圧の分布 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 男性・女性, 20歳以上  
〔血圧を下げる薬の使用者含む〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40歳以上		(再掲) 40-89歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
		総数	155	100.0	5	100.0	13	100.0	19	100.0	25	100.0	26	100.0	67	100.0	137	100.0	134	100.0	101	100.0	48	100.0
総数	収縮期(最高)血圧	90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90~99	3	1.9	0	0.0	3	23.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100~109	18	11.6	3	60.0	1	7.7	4	21.1	2	8.0	4	15.4	4	6.0	14	10.2	14	10.4	13	12.9	6	12.5
		110~119	24	15.5	1	20.0	3	23.1	2	10.5	6	24.0	5	19.2	7	10.4	20	14.6	20	14.9	17	16.8	7	14.6
		120~129	43	27.7	1	20.0	5	38.5	6	31.6	9	36.0	5	19.2	17	25.4	37	27.0	35	26.1	24	23.8	7	14.6
		130~139	36	23.2	0	0.0	0	0.0	7	36.8	5	20.0	6	23.1	18	26.9	36	26.3	35	26.1	27	26.7	13	27.1
		140~149	14	9.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.0	4	15.4	9	13.4	14	10.2	14	10.4	10	9.9	7	14.6
		150~159	15	9.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	2	8.0	1	3.8	11	16.4	14	10.2	14	10.4	9	8.9	7	14.6
		160~169	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	1	1.5	2	1.5	2	1.5	1	1.0	1	2.1
		170~179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	155	100.0	5	100.0	13	100.0	19	100.0	25	100.0	26	100.0	67	100.0	137	100.0	134	100.0	101	100.0	48	100.0
		総数	拡張期(最低)血圧	40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40~49	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50~59	6			3.9	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	7.5	5	3.6	4	3.0	1	1.0	1	2.1
60~69	25			16.1	2	40.0	4	30.8	2	10.5	1	4.0	4	15.4	12	17.9	19	13.9	18	13.4	13	12.9	9	18.8
70~79	61			39.4	1	20.0	5	38.5	5	26.3	12	48.0	10	38.5	28	41.8	55	40.1	55	41.0	41	40.6	20	41.7
80~89	54			34.8	1	20.0	3	23.1	10	52.6	10	40.0	9	34.6	21	31.3	50	36.5	49	36.6	38	37.6	16	33.3
90~99	8			5.2	0	0.0	1	7.7	1	5.3	2	8.0	3	11.5	1	1.5	7	5.1	7	5.2	7	6.9	2	4.2
100~109	1			0.6	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.7	1	1.0	0	0.0
110~119	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120~129	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
130~139	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
140mmHg以上	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	155			100.0	5	100.0	13	100.0	19	100.0	25	100.0	26	100.0	67	100.0	137	100.0	134	100.0	101	100.0	48	100.0
男性	収縮期(最高)血圧	90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90~99	1	1.7	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100~109	4	6.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	18.2	1	3.4	4	7.5	4	7.8	4	10.8	3	15.0
		110~119	8	13.8	0	0.0	1	25.0	1	20.0	0	0.0	2	18.2	4	13.8	7	13.2	7	13.7	6	16.2	4	20.0
		120~129	15	25.9	1	100.0	1	25.0	2	40.0	3	37.5	2	18.2	6	20.7	13	24.5	12	23.5	8	21.6	2	10.0
		130~139	15	25.9	0	0.0	0	0.0	2	40.0	2	25.0	2	18.2	9	31.0	15	28.3	14	27.5	10	27.0	5	25.0
		140~149	8	13.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	18.2	5	17.2	8	15.1	8	15.7	5	13.5	3	15.0
		150~159	6	10.3	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	12.5	1	9.1	3	10.3	5	9.4	5	9.8	4	10.8	3	15.0
		160~169	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	1.9	1	2.0	0	0.0	0	0.0
		170~179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		総数	58	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	8	100.0	11	100.0	29	100.0	53	100.0	51	100.0	37	100.0	20	100.0
		男性	拡張期(最低)血圧	40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40~49	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50~59	2			3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.9	2	3.8	2	3.9	1	2.7	1	5.0
60~69	10			17.2	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	12.5	1	9.1	7	24.1	9	17.0	8	15.7	4	10.8	3	15.0
70~79	19			32.8	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	12.5	5	45.5	12	41.4	18	34.0	18	35.3	12	32.4	9	45.0
80~89	22			37.9	1	100.0	1	25.0	4	80.0	5	62.5	4	36.4	7	24.1	20	37.7	19	37.3	16	43.2	6	30.0
90~99	5			8.6	0	0.0	1	25.0	1	20.0	1	12.5	1	9.1	1	3.4	4	7.5	4	7.8	4	10.8	1	5.0
100~109	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
110~119	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120~129	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
130~139	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
140mmHg以上	0			0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	58			100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	8	100.0	11	100.0	29	100.0	53	100.0	51	100.0	37	100.0	20	100.0
女性	収縮期(最高)血圧	90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		90~99	2	2.1	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		100~109	14	14.4	3	75.0	1	11.1	4	28.6	1	5.9	2	13.3	3	7.9	10	11.9	10	12.0	9	14.1	3	10.7
		110~119	16	16.5	1	25.0	2	22.2	1	7.1	6	35.3	3	20.0	3	7.9	13	15.5	13	15.7	11	17.2	3	10.7
		120~129	28	28.9	0	0.0	4	44.4	4	28.6	6	35.3	3	20.0	11	28.9	24	28.6	23	27.7	16	25.0	5	17.9
		130~139	21	21.6	0	0.0	0	0.0	5	35.7	3	17.6	4	26.7	9	23.7	21	25.0	21	25.3	17	26.6	8	28.6
		140~149	6	6.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	4	10.5	6	7.1	6	7.2	5	7.8	4	14.3

第82表の2 収縮期(最高)血圧・拡張期(最低)血圧の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差 - 男性・女性, 20歳以上[血圧を下げる薬の使用者含む]

		総数			男性			女性		
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
収縮期 (最高) 血圧	総数	155	127.4	15.0	58	130.1	14.3	97	125.8	15.3
	20-29歳	5	108.8	7.3	1	120.0	0.0	4	106.0	4.2
	30-39歳	13	117.0	16.6	4	125.0	24.3	9	113.4	12.1
	40-49歳	19	122.2	12.0	5	126.2	6.3	14	120.7	13.4
	50-59歳	25	125.4	12.3	8	130.5	14.3	17	122.9	10.9
	60-69歳	26	127.7	15.4	11	127.1	16.4	15	128.1	15.2
	70歳以上	67	133.0	14.1	29	132.9	13.3	38	133.1	14.9
	(再掲)40歳以上	137	129.1	14.3	53	130.7	13.6	84	128.1	14.7
	(再掲)40-89歳	134	129.1	14.4	51	130.7	13.8	83	128.2	14.7
	(再掲)40-74歳	101	127.8	14.5	37	129.1	14.0	64	127.1	14.8
	(再掲)65-74歳	48	131.3	16.1	20	129.1	16.1	28	132.9	16.1
	(再掲)75歳以上	36	132.6	13.2	16	134.3	12.3	20	131.3	14.0
	拡張期 (最低) 血圧	総数	155	76.7	9.3	58	77.1	9.3	97	76.5
20-29歳		5	67.0	10.7	1	83.0	0.0	4	63.0	6.8
30-39歳		13	76.3	9.0	4	79.5	10.1	9	74.8	8.7
40-49歳		19	81.2	9.4	5	84.8	4.8	14	79.9	10.4
50-59歳		25	79.6	7.0	8	82.3	7.1	17	78.4	6.8
60-69歳		26	78.5	9.6	11	77.3	8.3	15	79.3	10.6
70歳以上		67	74.5	9.0	29	73.7	9.6	38	75.2	8.6
(再掲)40歳以上		137	77.1	9.1	53	76.8	9.4	84	77.4	9.0
(再掲)40-89歳		134	77.3	9.1	51	76.8	9.4	83	77.6	8.9
(再掲)40-74歳		101	78.2	8.7	37	78.5	8.7	64	78.1	8.7
(再掲)65-74歳		48	76.0	8.7	20	75.3	9.1	28	76.5	8.5
(再掲)75歳以上		36	74.0	9.8	16	72.8	9.9	20	75.0	9.9

注1) 血圧の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。

第82表の3 収縮期(最高)血圧・拡張期(最低)血圧の分布 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 男性・女性, 20歳以上  
〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40歳以上		(再掲) 40-49歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
		総数	102	100.0	5	100.0	12	100.0	14	100.0	19	100.0	22	100.0	30	100.0	85	100.0	84	100.0	72	100.0	32
収縮期(最高)血圧	総数	102	100.0	5	100.0	12	100.0	14	100.0	19	100.0	22	100.0	30	100.0	85	100.0	84	100.0	72	100.0	32	100.0
	90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90~99	3	2.9	0	0.0	3	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100~109	16	15.7	3	60.0	1	8.3	4	28.6	2	10.5	4	18.2	2	6.7	12	14.1	12	14.3	12	16.7	5	15.6
	110~119	19	18.6	1	20.0	3	25.0	2	14.3	6	31.6	4	18.2	3	10.0	15	17.6	15	17.9	13	18.1	4	12.5
	120~129	26	25.5	1	20.0	5	41.7	3	21.4	6	31.6	4	18.2	7	23.3	20	23.5	19	22.6	16	22.2	6	18.8
	130~139	20	19.6	0	0.0	0	0.0	5	35.7	3	15.8	4	18.2	8	26.7	20	23.5	20	23.8	17	23.6	7	21.9
	140~149	9	8.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	4	18.2	4	13.3	9	10.6	9	10.7	8	11.1	5	15.6
	150~159	8	7.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	4.5	6	20.0	8	9.4	8	9.5	5	6.9	4	12.5
	160~169	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	1	1.2	1	1.2	1	1.4	1	3.1
	170~179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	総数	102	100.0	5	100.0	12	100.0	14	100.0	19	100.0	22	100.0	30	100.0	85	100.0	84	100.0	72	100.0	32	100.0
拡張期(最低)血圧	総数	102	100.0	5	100.0	12	100.0	14	100.0	19	100.0	22	100.0	30	100.0	85	100.0	84	100.0	72	100.0	32	100.0
	40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40~49	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	50~59	1	1.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	60~69	15	14.7	2	40.0	4	33.3	2	14.3	1	5.3	2	9.1	4	13.3	9	10.6	8	9.5	7	9.7	3	9.4
	70~79	45	44.1	1	20.0	5	41.7	4	28.6	12	63.2	8	36.4	15	50.0	39	45.9	39	46.4	33	45.8	15	46.9
	80~89	35	34.3	1	20.0	3	25.0	7	50.0	5	26.3	9	40.9	10	33.3	31	36.5	31	36.9	26	36.1	12	37.5
	90~99	6	5.9	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	5.3	3	13.6	1	3.3	6	7.1	6	7.1	6	8.3	2	6.3
	100~109	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	110~119	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120~129	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	130~139	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
男性	総数	30	100.0	1	100.0	3	100.0	2	100.0	3	100.0	9	100.0	12	100.0	26	100.0	25	100.0	20	100.0	13	100.0
収縮期(最高)血圧	90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90~99	1	3.3	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100~109	3	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	22.2	0	0.0	3	11.5	3	12.0	3	15.0	2	15.4
	110~119	4	13.3	0	0.0	1	33.3	1	50.0	0	0.0	1	11.1	1	8.3	3	11.5	3	12.0	3	15.0	2	15.4
	120~129	8	26.7	1	100.0	1	33.3	0	0.0	1	33.3	1	11.1	4	33.3	6	23.1	5	20.0	3	15.0	2	15.4
	130~139	5	16.7	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	2	22.2	2	16.7	5	19.2	5	20.0	4	20.0	2	15.4
	140~149	6	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	2	22.2	3	25.0	6	23.1	6	24.0	5	25.0	3	23.1
	150~159	3	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	16.7	3	11.5	3	12.0	2	10.0	2	15.4
	160~169	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	170~179	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180mmHg以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	総数	30	100.0	1	100.0	3	100.0	2	100.0	3	100.0	9	100.0	12	100.0	26	100.0	25	100.0	20	100.0	13	100.0
	拡張期(最低)血圧	40mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
40~49		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
50~59		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
60~69		5	16.7	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	33.3	1	11.1	2	16.7	4	15.4	3	12.0	2	10.0	1	7.7
70~79		13	43.3	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	33.3	3	33.3	8	66.7	12	46.2	12	48.0	8	40.0	7	53.8
80~89		9	30.0	1	100.0	1	33.3	1	50.0	1	33.3	4	44.4	1	8.3	7	26.9	7	28.0	7	35.0	4	30.8
90~99		3	10.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	11.1	1	8.3	3	11.5	3	12.0	3	15.0	1	7.7
100~109		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
110~119		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120~129		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
130~139		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
140mmHg以上		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性		総数	72	100.0	4	100.0	9	100.0	12	100.0	16	100.0	13	100.0	18	100.0	59	100.0	59	100.0	52	100.0	19
収縮期(最高)血圧	90mmHg未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90~99	2	2.8	0	0.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	100~109	13	18.1	3	75.0	1	11.1	4	33.3	1	6.3	2	15.4	2	11.1	9	15.3	9	15.3	9	17.3	3	15.8
	110~119	15	20.8	1	25.0	2	22.2	1	8.3	6	37.5	3	23.1	2	11.1	12	20.3	12	20.3	10	19.2	2	10.5
	120~129	18	25.0	0	0.0	4	44.4	3	25.0	5	31.3	3	23.1	3	16.7	14	23.7	14	23.7	13	25.0	4	21.1
	130~139	15	20.8	0	0.0	0	0.0																

第82表の4 収縮期(最高)血圧・拡張期(最低)血圧の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差 - 男性・女性, 20歳以上[血圧を下げる薬の使用者除外]

		総数			男性			女性		
		人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
収縮期 (最高) 血圧	総数	102	125.2	15.5	30	129.2	15.4	72	123.5	15.3
	20-29歳	5	108.8	7.3	1	120.0	0.0	4	106.0	4.2
	30-39歳	12	113.8	12.3	3	114.7	15.6	9	113.4	12.1
	40-49歳	14	120.8	13.5	2	127.0	11.3	12	119.8	14.0
	50-59歳	19	123.4	12.5	3	125.3	21.1	16	123.1	11.2
	60-69歳	22	127.7	16.5	9	128.6	17.9	13	127.1	16.1
	70歳以上	30	133.8	14.2	12	135.5	11.9	18	132.6	15.7
	(再掲)40歳以上	85	127.7	15.0	26	131.3	14.9	59	126.2	14.8
	(再掲)40-89歳	84	127.8	15.1	25	131.6	15.1	59	126.2	14.8
	(再掲)40-74歳	72	126.6	14.9	20	130.4	16.0	52	125.1	14.4
	(再掲)65-74歳	32	130.1	16.4	13	130.5	17.1	19	129.8	16.5
	(再掲)75歳以上	13	134.1	14.0	6	134.1	11.4	7	134.1	16.9
	拡張期 (最低) 血圧	総数	102	77.2	8.3	30	77.5	7.9	72	77.1
20-29歳		5	67.0	10.7	1	83.0	0.0	4	63.0	6.8
30-39歳		12	75.1	8.3	3	76.0	8.9	9	74.8	8.7
40-49歳		14	79.5	8.5	2	88.0	7.1	12	78.0	8.1
50-59歳		19	77.7	6.7	3	76.7	8.0	16	77.8	6.7
60-69歳		22	80.2	9.2	9	78.2	9.0	13	81.6	9.4
70歳以上		30	76.3	6.7	12	75.3	6.6	18	77.0	6.8
(再掲)40歳以上		85	78.1	7.7	26	77.4	8.0	59	78.5	7.7
(再掲)40-89歳		84	78.3	7.7	25	77.8	7.9	59	78.5	7.7
(再掲)40-74歳		72	78.5	8.0	20	79.1	8.2	52	78.2	8.0
(再掲)65-74歳		32	77.7	8.2	13	77.3	8.0	19	77.9	8.6
(再掲)75歳以上		13	76.4	5.9	6	72.0	4.2	7	80.1	4.5

注1) 血圧の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。

第83表の1 ヘモグロビンA1c(NGSP)の分布 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 男性・女性, 20歳以上[インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者含む]

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	152	100.0	5	100.0	13	100.0	19	100.0	25	100.0	24	100.0	66	100.0	99	100.0	47	100.0	35	100.0	
	5.6%未満	90	59.2	5	100.0	10	76.9	17	89.5	15	60.0	13	54.2	30	45.5	59	59.6	21	44.7	16	45.7	
	5.6-6.0未満	42	27.6	0	0.0	2	15.4	1	5.3	9	36.0	10	41.7	20	30.3	29	29.3	18	38.3	11	31.4	
	6.0-6.5未満	9	5.9	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	4.0	0	0.0	7	10.6	6	6.1	4	8.5	3	8.6	
	6.5-8.0未満	8	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	7	10.6	5	5.1	4	8.5	3	8.6	
	8.0-8.4未満	1	0.7	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	8.4以上	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	0	0.0	0	0.0	2	5.7	
	(再掲)																					
	5.6以上	62	40.8	0	0.0	3	23.1	2	10.5	10	40.0	11	45.8	36	54.5	40	40.4	26	55.3	19	54.3	
6.5以上	11	7.2	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	1	4.2	9	13.6	5	5.1	4	8.5	5	14.3		
男性	総数	56	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	8	100.0	9	100.0	29	100.0	35	100.0	19	100.0	16	100.0	
	5.6%未満	28	50.0	1	100.0	3	75.0	4	80.0	3	37.5	5	55.6	12	41.4	17	48.6	8	42.1	7	43.8	
	5.6-6.0未満	14	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	50.0	3	33.3	7	24.1	11	31.4	7	36.8	3	18.8	
	6.0-6.5未満	6	10.7	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	12.5	0	0.0	4	13.8	4	11.4	2	10.5	2	12.5	
	6.5-8.0未満	5	8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	4	13.8	3	8.6	2	10.5	2	12.5	
	8.0-8.4未満	1	1.8	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	8.4以上	2	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.9	0	0.0	0	0.0	2	12.5	
	(再掲)																					
	5.6以上	28	50.0	0	0.0	1	25.0	1	20.0	5	62.5	4	44.4	17	58.6	18	51.4	11	57.9	9	56.3	
6.5以上	8	14.3	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	6	20.7	3	8.6	2	10.5	4	25.0		
女性	総数	96	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	17	100.0	15	100.0	37	100.0	64	100.0	28	100.0	19	100.0	
	5.6%未満	62	64.6	4	100.0	7	77.8	13	92.9	12	70.6	8	53.3	18	48.6	42	65.6	13	46.4	9	47.4	
	5.6-6.0未満	28	29.2	0	0.0	2	22.2	1	7.1	5	29.4	7	46.7	13	35.1	18	28.1	11	39.3	8	42.1	
	6.0-6.5未満	3	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.1	2	3.1	2	7.1	1	5.3	
	6.5-8.0未満	3	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.1	2	3.1	2	7.1	1	5.3	
	8.0-8.4未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	8.4以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	
	(再掲)																					
	5.6以上	34	35.4	0	0.0	2	22.2	1	7.1	5	29.4	7	46.7	19	51.4	22	34.4	15	53.6	10	52.6	
6.5以上	3	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.1	2	3.1	2	7.1	1	5.3		

注) ヘモグロビンA1c(NGSP)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

第83表の2 ヘモグロビンA1c(NGSP)の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差 - 男性・女性, 20歳以上[血圧を下げる薬の使用者含む]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	152	5.6	0.7	5	5.2	0.2	13	5.5	0.9	19	5.3	0.3	25	5.5	0.2	24	5.6	0.3	66	5.8	0.8
男性	56	5.8	1.0	1	5.0	0.0	4	6.0	1.5	5	5.4	0.4	8	5.6	0.2	9	5.6	0.5	29	6.1	1.1
女性	96	5.5	0.4	4	5.3	0.1	9	5.3	0.3	14	5.2	0.2	17	5.5	0.2	15	5.5	0.3	37	5.7	0.4

	(再掲) 40-74歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	99	5.6	0.5	47	5.7	0.5	35	5.9	1.0
男性	35	5.7	0.6	19	5.8	0.7	16	6.2	1.4
女性	64	5.5	0.4	28	5.7	0.4	19	5.6	0.3

注) ヘモグロビンA1c(NGSP)の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

第83表の3 ヘモグロビンA1c(NGSP)の分布 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 男性・女性, 20歳以上〔インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用者除外〕

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	総数	139	100.0	5	100.0	12	100.0	19	100.0	24	100.0	23	100.0	56	100.0	93	100.0	43	100.0	29	100.0
	5.6%未満	90	64.7	5	100.0	10	83.3	17	89.5	15	62.5	13	56.5	30	53.6	59	63.4	21	48.8	16	55.2
	5.6-6.0未満	40	28.8	0	0.0	2	16.7	1	5.3	8	33.3	10	43.5	19	33.9	27	29.0	17	39.5	11	37.9
	6.0-6.5未満	7	5.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	4.2	0	0.0	5	8.9	6	6.5	4	9.3	1	3.4
	6.5-8.0未満	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	1	1.1	1	2.3	0	0.0
	8.0-8.4未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.4以上 (再掲)	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	3.4
	5.6以上	49	35.3	0	0.0	2	16.7	2	10.5	9	37.5	10	43.5	26	46.4	34	36.6	22	51.2	13	44.8
	6.5以上	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	1	1.1	1	2.3	1	3.4
男性	総数	46	100.0	1	100.0	3	100.0	5	100.0	7	100.0	8	100.0	22	100.0	31	100.0	17	100.0	11	100.0
	5.6%未満	28	60.9	1	100.0	3	100.0	4	80.0	3	42.9	5	62.5	12	54.5	17	54.8	8	47.1	7	63.6
	5.6-6.0未満	12	26.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	42.9	3	37.5	6	27.3	9	29.0	6	35.3	3	27.3
	6.0-6.5未満	4	8.7	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	14.3	0	0.0	2	9.1	4	12.9	2	11.8	0	0.0
	6.5-8.0未満	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	1	3.2	1	5.9	0	0.0
	8.0-8.4未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.4以上 (再掲)	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	0	0.0	1	9.1
	5.6以上	18	39.1	0	0.0	0	0.0	1	20.0	4	57.1	3	37.5	10	45.5	14	45.2	9	52.9	4	36.4
	6.5以上	2	4.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	3.2	1	5.9	1	9.1
女性	総数	93	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	17	100.0	15	100.0	34	100.0	62	100.0	26	100.0	18	100.0
	5.6%未満	62	66.7	4	100.0	7	77.8	13	92.9	12	70.6	8	53.3	18	52.9	42	67.7	13	50.0	9	50.0
	5.6-6.0未満	28	30.1	0	0.0	2	22.2	1	7.1	5	29.4	7	46.7	13	38.2	18	29.0	11	42.3	8	44.4
	6.0-6.5未満	3	3.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.8	2	3.2	2	7.7	1	5.6
	6.5-8.0未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.0-8.4未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	8.4以上 (再掲)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	5.6以上	31	33.3	0	0.0	2	22.2	1	7.1	5	29.4	7	46.7	16	47.1	20	32.3	13	50.0	9	50.0
	6.5以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) ヘモグロビンA1c(NGSP)の測定を行い、身体状況調査の問診においてインスリン注射又は血糖を下げる薬の使用を「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

第83表の4 ヘモグロビンA1c(NGSP)の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差 - 男性・女性, 20歳以上〔血圧を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	139	5.5	0.5	5	5.2	0.2	12	5.3	0.3	19	5.3	0.3	24	5.5	0.2	23	5.5	0.3	56	5.7	0.7
男性	46	5.6	0.8	1	5.0	0.0	3	5.3	0.1	5	5.4	0.4	7	5.6	0.3	8	5.5	0.3	22	5.8	1.1
女性	93	5.5	0.3	4	5.3	0.1	9	5.3	0.3	14	5.2	0.2	17	5.5	0.2	15	5.5	0.3	34	5.6	0.2

	(再掲) 40-74歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	93	5.5	0.3	43	5.6	0.4	29	5.7	0.9
男性	31	5.6	0.4	17	5.7	0.5	11	5.9	1.5
女性	62	5.5	0.3	26	5.6	0.3	18	5.6	0.2

注) ヘモグロビンA1c(NGSP)の測定を行い、身体状況調査の問診においてインスリン注射又は血糖を下げる薬の使用を「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

第84表の1 血清総コレステロールの分布 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 男性・女性, 20歳以上[コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む]

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	56	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	8	100.0	9	100.0	29	100.0	44	100.0	19	100.0	16	100.0	
男性	120mg/dl未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-139	2	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	0.0
	140-159	4	7.1	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	3	10.3	4	9.1	0	0.0	3	18.8
	160-179	8	14.3	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	12.5	1	11.1	5	17.2	7	15.9	4	21.1	2	12.5
	180-199	17	30.4	0	0.0	1	25.0	2	40.0	1	12.5	3	33.3	10	34.5	12	27.3	5	26.3	6	37.5
	200-219	13	23.2	1	100.0	1	25.0	1	20.0	3	37.5	2	22.2	5	17.2	10	22.7	3	15.8	3	18.8
	220-239	10	17.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	3	33.3	6	20.7	9	20.5	7	36.8	2	12.5
	240-259	1	1.8	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	260-279	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	280-299	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dl以上 (再掲)	1	1.8	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	240mg/dl以上	2	3.6	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	総数	96	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	17	100.0	15	100.0	37	100.0	73	100.0	28	100.0	19	100.0
女性	120mg/dl未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120-139	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	140-159	7	7.3	2	50.0	1	11.1	0	0.0	1	5.9	1	6.7	2	5.4	4	5.5	1	3.6	2	10.5
	160-179	10	10.4	1	25.0	0	0.0	3	21.4	2	11.8	1	6.7	3	8.1	7	9.6	1	3.6	2	10.5
	180-199	15	15.6	0	0.0	4	44.4	3	21.4	1	5.9	1	6.7	6	16.2	8	11.0	3	10.7	4	21.1
	200-219	19	19.8	0	0.0	1	11.1	3	21.4	0	0.0	0	0.0	15	40.5	14	19.2	8	28.6	7	36.8
	220-239	13	13.5	0	0.0	1	11.1	2	14.3	3	17.6	2	13.3	5	13.5	11	15.1	4	14.3	2	10.5
	240-259	17	17.7	0	0.0	1	11.1	3	21.4	5	29.4	6	40.0	2	5.4	16	21.9	6	21.4	0	0.0
	260-279	10	10.4	0	0.0	1	11.1	0	0.0	3	17.6	2	13.3	4	10.8	9	12.3	3	10.7	2	10.5
	280-299	1	1.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	300mg/dl以上 (再掲)	4	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	2	13.3	0	0.0	4	5.5	2	7.1	0	0.0
	240mg/dl以上	32	33.3	1	25.0	2	22.2	3	21.4	10	58.8	10	66.7	6	16.2	29	39.7	11	39.3	2	10.5

注) 血清総コレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

第84表の2 血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差 - 男性・女性, 20歳以上[コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	56	198.1	29.6	1	201.0	0.0	4	241.5	49.3	5	184.8	27.0	8	183.4	32.6	9	205.4	20.0	29	196.0	24.2
女性	96	219.8	40.7	4	192.5	61.9	9	205.3	35.7	14	207.1	32.3	17	240.7	47.5	15	242.3	42.9	37	212.3	31.7

	(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	44	194.1	26.7	19	204.7	23.1	16	190.8	24.1
女性	73	226.5	40.5	28	230.3	36.8	19	203.7	33.4

注) 血清総コレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

第84表の3 血清総コレステロールの分布 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 男性・女性, 20歳以上[コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外]

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	45	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	6	100.0	9	100.0	21	100.0	34	100.0	16	100.0	11	100.0
120mg/dl未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120-139	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0
140-159	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.9	0	0.0	1	9.1
160-179	6	13.3	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	16.7	1	11.1	3	14.3	5	14.7	2	12.5	2	18.2
180-199	16	35.6	0	0.0	1	25.0	2	50.0	1	16.7	3	33.3	9	42.9	12	35.3	5	31.3	5	45.5
200-219	10	22.2	1	100.0	1	25.0	1	25.0	2	33.3	2	22.2	3	14.3	7	20.6	2	12.5	2	18.2
220-239	9	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	3	33.3	5	23.8	8	23.5	7	43.8	1	9.1
240-259	1	2.2	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
260-279	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
280-299	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
300mg/dl以上 (再掲)	1	2.2	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
240mg/dl以上	2	4.4	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	82	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	14	100.0	12	100.0	29	100.0	62	100.0	23	100.0	13	100.0
120mg/dl未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
120-139	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
140-159	4	4.9	2	50.0	1	11.1	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0
160-179	8	9.8	1	25.0	0	0.0	3	21.4	2	14.3	1	8.3	1	3.4	7	11.3	1	4.3	0	0.0
180-199	14	17.1	0	0.0	4	44.4	3	21.4	1	7.1	0	0.0	6	20.7	7	11.3	2	8.7	4	30.8
200-219	17	20.7	0	0.0	1	11.1	3	21.4	0	0.0	0	0.0	13	44.8	12	19.4	6	26.1	7	53.8
220-239	10	12.2	0	0.0	1	11.1	2	14.3	1	7.1	2	16.7	4	13.8	9	14.5	4	17.4	1	7.7
240-259	16	19.5	0	0.0	1	11.1	3	21.4	5	35.7	5	41.7	2	6.9	15	24.2	5	21.7	0	0.0
260-279	8	9.8	0	0.0	1	11.1	0	0.0	2	14.3	2	16.7	3	10.3	7	11.3	3	13.0	1	7.7
280-299	1	1.2	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
300mg/dl以上 (再掲)	4	4.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	2	16.7	0	0.0	4	6.5	2	8.7	0	0.0
240mg/dl以上	29	35.4	1	25.0	2	22.2	3	21.4	9	64.3	9	75.0	5	17.2	26	41.9	10	43.5	1	7.7

注) 血清総コレステロール値の測定を行い、身体状況調査の間診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

第84表の4 血清総コレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差 - 男性・女性, 20歳以上[コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	45	202.4	27.9	1	201.0	0.0	4	241.5	49.3	4	195.3	15.7	6	188.2	30.3	9	205.4	20.0	21	199.1	23.1
女性	82	222.1	39.9	4	192.5	61.9	9	205.3	35.7	14	207.1	32.3	14	239.7	51.6	12	253.7	34.4	29	216.9	26.6

	(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	34	198.2	23.8	16	207.7	22.7	11	192.4	21.5
女性	62	229.0	39.2	23	236.3	34.7	13	209.8	21.7

注) 血清総コレステロール値の測定を行い、身体状況調査の間診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

第85表の1 血清HDLコレステロールの分布 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 男性・女性, 20歳以上[コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む]

		総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	総数	56	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	8	100.0	9	100.0	29	100.0	44	100.0	19	100.0	16	100.0
	30mg/dl未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39	3	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	2	6.9	3	6.8	2	10.5	0	0.0
	40-49	16	28.6	0	0.0	0	0.0	2	40.0	2	25.0	3	33.3	9	31.0	14	31.8	4	21.1	6	37.5
	50-59	16	28.6	1	100.0	2	50.0	3	60.0	3	37.5	0	0.0	7	24.1	10	22.7	3	15.8	4	25.0
	60-69	8	14.3	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	6	20.7	6	13.6	4	21.1	3	18.8
	70-79	6	10.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	3	33.3	2	6.9	5	11.4	2	10.5	2	12.5
	80-89	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	2.3	0	0.0	1	6.3
	90-99	2	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	3.4	2	4.5	2	10.5	0	0.0
	100mg/dl以上 (再掲)	4	7.1	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	12.5	1	11.1	1	3.4	3	6.8	2	10.5	0	0.0
	35mg/dl未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
40mg/dl未満	3	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	2	6.9	3	6.8	2	10.5	0	0.0	
女性	総数	96	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	17	100.0	15	100.0	37	100.0	73	100.0	28	100.0	19	100.0
	30mg/dl未満	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	1	1.4	1	3.6	0	0.0
	30-39	3	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	1	2.7	3	4.1	1	3.6	0	0.0
	40-49	8	8.3	0	0.0	1	11.1	2	14.3	1	5.9	1	6.7	3	8.1	6	8.2	3	10.7	1	5.3
	50-59	20	20.8	1	25.0	1	11.1	2	14.3	3	17.6	2	13.3	11	29.7	14	19.2	7	25.0	6	31.6
	60-69	23	24.0	2	50.0	2	22.2	5	35.7	4	23.5	3	20.0	7	18.9	17	23.3	4	14.3	6	31.6
	70-79	21	21.9	0	0.0	3	33.3	0	0.0	5	29.4	3	20.0	10	27.0	15	20.5	6	21.4	4	21.1
	80-89	13	13.5	0	0.0	2	22.2	5	35.7	1	5.9	2	13.3	3	8.1	11	15.1	3	10.7	2	10.5
	90-99	4	4.2	1	25.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	1	6.7	0	0.0	3	4.1	1	3.6	0	0.0
	100mg/dl以上 (再掲)	3	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	6.7	1	2.7	3	4.1	2	7.1	0	0.0
	35mg/dl未満	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	1	1.4	1	3.6	0	0.0
40mg/dl未満	4	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	13.3	2	5.4	4	5.5	2	7.1	0	0.0	

注) 血清HDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

第85表の2 血清HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差 - 男性・女性, 20歳以上[コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む]

(mg/dl)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	56	60.2	19.5	1	57.0	0.0	4	67.3	25.6	5	52.2	4.7	8	58.8	22.6	9	70.7	21.1	29	57.8	18.9
女性	96	66.8	16.7	4	69.8	19.7	9	69.4	12.5	14	67.0	15.4	17	70.7	15.3	15	68.0	22.5	37	63.5	16.2

  

	(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	44	60.4	20.4	19	65.3	24.7	16	56.8	12.9
女性	73	67.2	17.8	28	66.3	21.5	19	64.2	11.4

注) 血清HDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

第85表の3 血清HDLコレステロールの分布 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 男性・女性, 20歳以上[コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外]

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	45	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	6	100.0	9	100.0	21	100.0	34	100.0	16	100.0	11	100.0
	30mg/dl未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	30-39	3	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	9.5	3	8.8	2	12.5	0	0.0
	40-49	11	24.4	0	0.0	0	0.0	1	25.0	2	33.3	3	33.3	5	23.8	10	29.4	2	12.5	4	36.4
	50-59	14	31.1	1	100.0	2	50.0	3	75.0	1	16.7	0	0.0	7	33.3	8	23.5	3	18.8	4	36.4
	60-69	5	11.1	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	3	14.3	3	8.8	3	18.8	1	9.1
	70-79	6	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	3	33.3	2	9.5	5	14.7	2	12.5	2	18.2
	80-89	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	90-99	2	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	4.8	2	5.9	2	12.5	0	0.0
	100mg/dl以上 (再掲)	4	8.9	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	16.7	1	11.1	1	4.8	3	8.8	2	12.5	0	0.0
	35mg/dl未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40mg/dl未満	3	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	2	9.5	3	8.8	2	12.5	0	0.0
女性	総数	82	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	14	100.0	12	100.0	29	100.0	62	100.0	23	100.0	13	100.0
	30mg/dl未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	1.6	1	4.3	0	0.0
	30-39	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0
	40-49	7	8.5	0	0.0	1	11.1	2	14.3	1	7.1	0	0.0	3	10.3	5	8.1	2	8.7	1	7.7
	50-59	18	22.0	1	25.0	1	11.1	2	14.3	3	21.4	2	16.7	9	31.0	13	21.0	7	30.4	4	30.8
	60-69	19	23.2	2	50.0	2	22.2	5	35.7	3	21.4	2	16.7	5	17.2	14	22.6	3	13.0	4	30.8
	70-79	17	20.7	0	0.0	3	33.3	0	0.0	4	28.6	3	25.0	7	24.1	12	19.4	5	21.7	2	15.4
	80-89	12	14.6	0	0.0	2	22.2	5	35.7	0	0.0	2	16.7	3	10.3	10	16.1	3	13.0	2	15.4
	90-99	3	3.7	1	25.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0
	100mg/dl以上 (再掲)	3	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	8.3	1	3.4	3	4.8	2	8.7	0	0.0
	35mg/dl未満	1	1.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	1.6	1	4.3	0	0.0
	40mg/dl未満	3	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	1	3.4	3	4.8	1	4.3	0	0.0

注) 血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

第85表の4 血清HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差 - 男性・女性, 20歳以上[コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外]

(mg/dl)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	45	61.4	20.8	1	57.0	0.0	4	67.3	25.6	4	53.0	5.0	6	60.7	26.4	9	70.7	21.1	21	58.3	20.6
女性	82	67.3	17.1	4	69.8	19.7	9	69.4	12.5	14	67.0	15.4	14	70.6	16.7	12	68.8	22.8	29	64.1	17.1

	(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	34	61.5	22.2	16	67.9	26.0	11	55.5	11.0
女性	62	67.7	18.0	23	67.6	21.4	13	64.2	12.7

注) 血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

第86表の1 血清LDLコレステロールの分布 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	56	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	8	100.0	9	100.0	29	100.0	44	100.0	19	100.0	16	100.0
	70mg/dl未満	4	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	2	6.9	4	9.1	1	5.3	1	6.3
	70-79	2	3.6	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	12.5	0	0.0	0	0.0	2	4.5	0	0.0	0	0.0
	80-89	6	10.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3	3	10.3	5	11.4	2	10.5	3	18.8
	90-99	6	10.7	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	12.5	0	0.0	4	13.8	4	9.1	2	10.5	2	12.5
	100-109	8	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	22.2	5	17.2	8	18.2	5	26.3	1	6.3
	110-119	8	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	22.2	5	17.2	7	15.9	3	15.8	4	25.0
	120-129	11	19.6	1	100.0	2	50.0	3	60.0	0	0.0	0	0.0	5	17.2	6	13.6	2	10.5	3	18.8
	130-139	5	8.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	11.1	2	6.9	5	11.4	2	10.5	1	6.3
	140-149	3	5.4	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	3.4	1	2.3	0	0.0	1	6.3
	150-159	2	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.9	2	4.5	2	10.5	0	0.0
	160-169	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	170-179	1	1.8	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180mg/dl以上 (再掲)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120mg/dl以上	22	39.3	1	100.0	4	100.0	3	60.0	2	25.0	2	22.2	10	34.5	14	31.8	6	31.6	5	31.3
140mg/dl以上	6	10.7	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	3	10.3	3	6.8	2	10.5	1	6.3	
女性	総数	96	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	17	100.0	15	100.0	37	100.0	73	100.0	28	100.0	19	100.0
	70mg/dl未満	2	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	2.7	2	2.7	1	3.6	1	5.3
	70-79	5	5.2	1	25.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	2.7	1	1.4	1	3.6	1	5.3
	80-89	6	6.3	0	0.0	0	0.0	2	14.3	1	5.9	0	0.0	3	8.1	6	8.2	2	7.1	1	5.3
	90-99	9	9.4	2	50.0	1	11.1	1	7.1	2	11.8	1	6.7	2	5.4	4	5.5	0	0.0	2	10.5
	100-109	14	14.6	0	0.0	3	33.3	2	14.3	1	5.9	0	0.0	8	21.6	9	12.3	4	14.3	4	21.1
	110-119	11	11.5	0	0.0	0	0.0	4	28.6	1	5.9	0	0.0	6	16.2	8	11.0	2	7.1	4	21.1
	120-129	6	6.3	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	5.9	0	0.0	4	10.8	5	6.8	2	7.1	2	10.5
	130-139	6	6.3	0	0.0	1	11.1	2	14.3	0	0.0	0	0.0	3	8.1	4	5.5	1	3.6	2	10.5
	140-149	14	14.6	0	0.0	1	11.1	0	0.0	3	17.6	5	33.3	5	13.5	13	17.8	8	28.6	0	0.0
	150-159	5	5.2	0	0.0	1	11.1	0	0.0	3	17.6	1	6.7	0	0.0	4	5.5	1	3.6	0	0.0
	160-169	8	8.3	1	25.0	0	0.0	1	7.1	1	5.9	4	26.7	1	2.7	7	9.6	3	10.7	0	0.0
	170-179	3	3.1	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	5.9	1	6.7	0	0.0	3	4.1	1	3.6	0	0.0
	180mg/dl以上 (再掲)	7	7.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	1	6.7	3	8.1	7	9.6	2	7.1	2	10.5
	120mg/dl以上	49	51.0	1	25.0	3	33.3	5	35.7	12	70.6	12	80.0	16	43.2	43	58.9	18	64.3	6	31.6
140mg/dl以上	37	38.5	1	25.0	2	22.2	2	14.3	11	64.7	12	80.0	9	24.3	34	46.6	15	53.6	2	10.5	

注) 血清LDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

第86表の2 血清LDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差 - 男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む〕

(mg/dl)

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	56	111.1	25.2	1	129.0	0.0	4	142.3	26.6	5	109.8	24.7	8	98.9	29.0	9	108.9	21.0	29	110.5	23.4
女性	96	126.4	34.5	4	104.5	39.0	9	111.3	28.6	14	118.8	26.7	17	145.4	42.1	15	142.7	35.5	37	120.1	29.0

	(再掲) 40歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	51	108.3	23.7	44	107.7	24.2	19	111.8	21.9	16	107.9	23.6
女性	83	129.1	34.5	73	132.0	35.2	28	131.8	32.7	19	115.0	31.1

注) 血清LDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

第86表の3 血清LDLコレステロールの分布 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
男性	総数	45	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	6	100.0	9	100.0	21	100.0	34	100.0	16	100.0	11	100.0
	70mg/dl未満	2	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	4.8	2	5.9	1	6.3	0	0.0
	70-79	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0
	80-89	5	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	33.3	2	9.5	4	11.8	2	12.5	2	18.2
	90-99	4	8.9	0	0.0	0	0.0	1	25.0	1	16.7	0	0.0	2	9.5	3	8.8	1	6.3	1	9.1
	100-109	6	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	2	22.2	3	14.3	6	17.6	3	18.8	1	9.1
	110-119	5	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	3	14.3	4	11.8	3	18.8	2	18.2
	120-129	11	24.4	1	100.0	2	50.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0	5	23.8	6	17.6	2	12.5	3	27.3
	130-139	5	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	11.1	2	9.5	5	14.7	2	12.5	1	9.1
	140-149	3	6.7	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	4.8	1	2.9	0	0.0	1	9.1
	150-159	2	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	2	5.9	2	12.5	0	0.0
	160-169	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	170-179	1	2.2	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	180mg/dl以上 (再掲)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	120mg/dl以上	22	48.9	1	100.0	4	100.0	3	75.0	2	33.3	2	22.2	10	47.6	14	41.2	6	37.5	5	45.5
	140mg/dl以上	6	13.3	0	0.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	3	14.3	3	8.8	2	12.5	1	9.1
女性	総数	82	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	14	100.0	12	100.0	29	100.0	62	100.0	23	100.0	13	100.0
	70mg/dl未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	70-79	3	3.7	1	25.0	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-89	5	6.1	0	0.0	0	0.0	2	14.3	1	7.1	0	0.0	2	6.9	5	8.1	2	8.7	0	0.0
	90-99	8	9.8	2	50.0	1	11.1	1	7.1	2	14.3	1	8.3	1	3.4	4	6.5	0	0.0	1	7.7
	100-109	13	15.9	0	0.0	3	33.3	2	14.3	1	7.1	0	0.0	7	24.1	8	12.9	3	13.0	4	30.8
	110-119	11	13.4	0	0.0	0	0.0	4	28.6	1	7.1	0	0.0	6	20.7	8	12.9	2	8.7	4	30.8
	120-129	6	7.3	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	7.1	0	0.0	4	13.8	5	8.1	2	8.7	2	15.4
	130-139	5	6.1	0	0.0	1	11.1	2	14.3	0	0.0	0	0.0	2	6.9	4	6.5	1	4.3	1	7.7
	140-149	11	13.4	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	7.1	5	41.7	4	13.8	10	16.1	7	30.4	0	0.0
	150-159	4	4.9	0	0.0	1	11.1	0	0.0	3	21.4	0	0.0	0	0.0	3	4.8	0	0.0	0	0.0
	160-169	8	9.8	1	25.0	0	0.0	1	7.1	1	7.1	4	33.3	1	3.4	7	11.3	3	13.0	0	0.0
	170-179	2	2.4	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	8.3	0	0.0	2	3.2	1	4.3	0	0.0
	180mg/dl以上 (再掲)	6	7.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	21.4	1	8.3	2	6.9	6	9.7	2	8.7	1	7.7
	120mg/dl以上	42	51.2	1	25.0	3	33.3	5	35.7	9	64.3	11	91.7	13	44.8	37	59.7	16	69.6	4	30.8
	140mg/dl以上	31	37.8	1	25.0	2	22.2	2	14.3	8	57.1	11	91.7	7	24.1	28	45.2	13	56.5	1	7.7

注) 血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

第86表の4 血清LDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差 - 男性・女性, 20歳以上〔コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外〕

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	45	115.6	23.9	1	129.0	0.0	4	142.3	26.6	4	118.8	16.7	6	102.7	29.1	9	108.9	21.0	21	115.8	22.4
女性	82	128.1	33.4	4	104.5	39.0	9	111.3	28.6	14	118.8	26.7	14	143.9	46.0	12	153.9	23.0	29	122.7	25.6

	(再掲) 40歳以上			(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	40	112.6	22.5	34	112.0	22.9	16	113.6	23.5	11	114.8	19.2
女性	69	131.6	32.9	62	134.0	33.7	23	137.0	29.6	13	118.9	24.3

注) 血清LDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

第87表の1 血清non HDLコレステロールの分布 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 男性・女性, 20歳以上[コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む]

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
男性	総数	56	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	8	100.0	9	100.0	29	100.0	44	100.0	19	100.0	16	100.0
	80mg/dl未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-90未満	3	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	0	0.0	1	3.4	3	6.8	0	0.0	1	6.3
	90-100未満	3	5.4	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	12.5	0	0.0	1	3.4	3	6.8	1	5.3	0	0.0
	100-110未満	1	1.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	1	2.3	0	0.0	1	6.3
	110-120未満	3	5.4	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	11.1	1	3.4	3	6.8	1	5.3	1	6.3
	120-130未満	9	16.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	3	33.3	5	17.2	7	15.9	4	21.1	3	18.8
	130-140未満	8	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	1	11.1	6	20.7	6	13.6	4	21.1	3	18.8
	140-150未満	11	19.6	1	100.0	1	25.0	1	20.0	0	0.0	3	33.3	5	17.2	8	18.2	3	15.8	4	25.0
	150-160未満	9	16.1	0	0.0	1	25.0	2	40.0	1	12.5	0	0.0	5	17.2	7	15.9	3	15.8	2	12.5
	160-170未満	3	5.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	1	11.1	0	0.0	3	6.8	0	0.0	0	0.0
	170-180未満	2	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.9	1	2.3	1	5.3	1	6.3
	180-190未満	2	3.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.9	2	4.5	2	10.5	0	0.0
	190-200未満	1	1.8	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	200-210未満	1	1.8	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	210-220未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	220mg/dl以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	総数	96	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	17	100.0	15	100.0	37	100.0	73	100.0	28	100.0	19	100.0
	80mg/dl未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	80-90未満	2	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	1	2.7	2	2.7	1	3.6	1	5.3
	90-100未満	5	5.2	1	25.0	2	22.2	2	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	2.7	0	0.0	0	0.0
	100-110未満	6	6.3	2	50.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	3	8.1	3	4.1	1	3.6	2	10.5
	110-120未満	9	9.4	0	0.0	1	11.1	3	21.4	2	11.8	1	6.7	2	5.4	7	9.6	2	7.1	1	5.3
	120-130未満	9	9.4	0	0.0	3	33.3	1	7.1	1	5.9	0	0.0	4	10.8	5	6.8	2	7.1	2	10.5
	130-140未満	7	7.3	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	6.7	5	13.5	5	6.8	1	3.6	4	21.1
	140-150未満	10	10.4	0	0.0	0	0.0	3	21.4	1	5.9	0	0.0	6	16.2	8	11.0	3	10.7	3	15.8
	150-160未満	6	6.3	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	5.9	0	0.0	4	10.8	3	4.1	1	3.6	3	15.8
	160-170未満	6	6.3	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	11.8	0	0.0	3	8.1	6	8.2	2	7.1	1	5.3
	170-180未満	7	7.3	0	0.0	1	11.1	0	0.0	2	11.8	2	13.3	2	5.4	6	8.2	3	10.7	0	0.0
	180-190未満	11	11.5	1	25.0	1	11.1	0	0.0	2	11.8	5	33.3	2	5.4	9	12.3	5	17.9	0	0.0
	190-200未満	8	8.3	0	0.0	1	11.1	1	7.1	2	11.8	3	20.0	1	2.7	7	9.6	3	10.7	0	0.0
	200-210未満	4	4.2	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	6.7	2	5.4	4	5.5	2	7.1	1	5.3
	210-220未満	3	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	0	0.0	2	5.4	3	4.1	1	3.6	1	5.3
	220mg/dl以上	3	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	1	6.7	0	0.0	3	4.1	1	3.6	0	0.0

注) 血清総コレステロール値及び血清HDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

$$\text{non HDL コレステロール (mg/dl)} = \text{総コレステロール (mg/dl)} - \text{HDLコレステロール (mg/dl)}$$

第87表の2 血清non HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差 - 男性・女性, 20歳以上[コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者含む]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	56	137.9	25.7	1	144.0	0.0	4	174.3	30.4	5	132.6	26.8	8	124.6	33.7	9	134.8	14.5	29	138.2	22.5
女性	96	153.0	37.6	4	122.8	42.3	9	135.9	35.7	14	140.1	31.8	17	169.9	43.6	15	174.3	34.5	37	148.8	32.3

	(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	44	133.8	24.5	19	139.5	22.2	16	134.0	20.1
女性	73	159.3	37.9	28	164.0	34.6	19	139.5	31.7

注) 血清総コレステロール値及び血清HDLコレステロール値の測定を行った20歳以上の者を集計対象とした。

第87表の3 血清non HDLコレステロールの分布 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 男性・女性, 20歳以上[コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外]

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 40-79歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
男性	45	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	6	100.0	9	100.0	21	100.0	34	100.0	16	100.0	11	100.0
総数	45	100.0	1	100.0	4	100.0	4	100.0	6	100.0	9	100.0	21	100.0	34	100.0	16	100.0	11	100.0
80mg/dl未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80-90未満	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0
90-100未満	2	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	1	4.8	2	5.9	1	6.3	0	0.0
100-110未満	1	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.8	1	2.9	0	0.0	1	9.1
110-120未満	2	4.4	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	2	5.9	1	6.3	0	0.0
120-130未満	9	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	3	33.3	5	23.8	7	20.6	4	25.0	3	27.3
130-140未満	5	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	11.1	3	14.3	4	11.8	2	12.5	2	18.2
140-150未満	10	22.2	1	100.0	1	25.0	1	25.0	0	0.0	3	33.3	4	19.0	7	20.6	3	18.8	3	27.3
150-160未満	6	13.3	0	0.0	1	25.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	3	14.3	4	11.8	2	12.5	1	9.1
160-170未満	3	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	1	11.1	0	0.0	3	8.8	0	0.0	0	0.0
170-180未満	2	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	1	2.9	1	6.3	1	9.1
180-190未満	2	4.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.5	2	5.9	2	12.5	0	0.0
190-200未満	1	2.2	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
200-210未満	1	2.2	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
210-220未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
220mg/dl以上	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
女性	82	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	14	100.0	12	100.0	29	100.0	62	100.0	23	100.0	13	100.0
総数	82	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	14	100.0	12	100.0	29	100.0	62	100.0	23	100.0	13	100.0
80mg/dl未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
80-90未満	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
90-100未満	5	6.1	1	25.0	2	22.2	2	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.2	0	0.0	0	0.0
100-110未満	4	4.9	2	50.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	3.4	2	3.2	1	4.3	0	0.0
110-120未満	7	8.5	0	0.0	1	11.1	3	21.4	2	14.3	0	0.0	1	3.4	6	9.7	1	4.3	0	0.0
120-130未満	9	11.0	0	0.0	3	33.3	1	7.1	1	7.1	0	0.0	4	13.8	5	8.1	2	8.7	2	15.4
130-140未満	6	7.3	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	8.3	4	13.8	4	6.5	0	0.0	4	30.8
140-150未満	10	12.2	0	0.0	0	0.0	3	21.4	1	7.1	0	0.0	6	20.7	8	12.9	3	13.0	3	23.1
150-160未満	5	6.1	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	7.1	0	0.0	3	10.3	3	4.8	1	4.3	2	15.4
160-170未満	4	4.9	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	3	10.3	4	6.5	2	8.7	1	7.7
170-180未満	7	8.5	0	0.0	1	11.1	0	0.0	2	14.3	2	16.7	2	6.9	6	9.7	3	13.0	0	0.0
180-190未満	10	12.2	1	25.0	1	11.1	0	0.0	2	14.3	5	41.7	1	3.4	8	12.9	4	17.4	0	0.0
190-200未満	6	7.3	0	0.0	1	11.1	1	7.1	1	7.1	2	16.7	1	3.4	5	8.1	2	8.7	0	0.0
200-210未満	3	3.7	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	8.3	1	3.4	3	4.8	2	8.7	0	0.0
210-220未満	3	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	2	6.9	3	4.8	1	4.3	1	7.7
220mg/dl以上	3	3.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	1	8.3	0	0.0	3	4.8	1	4.3	0	0.0

注) 血清総コレステロール値及び血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の間診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

$$\text{non HDL コレステロール (mg/dl)} = \text{総コレステロール (mg/dl)} - \text{HDLコレステロール (mg/dl)}$$

第87表の4 血清non HDLコレステロール値の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別, 人数, 平均値, 標準偏差 - 男性・女性, 20歳以上[コレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用者除外]

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	45	141.0	24.8	1	144.0	0.0	4	174.3	30.4	4	142.3	18.4	6	127.5	32.5	9	134.8	14.5	21	140.8	22.9
女性	82	154.8	37.0	4	122.8	42.3	9	135.9	35.7	14	140.1	31.8	14	169.1	47.8	12	184.9	19.9	29	152.8	29.2

	(再掲) 40-79歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
男性	34	136.7	23.1	16	139.8	23.8	11	136.9	17.9
女性	62	161.3	36.8	23	168.7	31.5	13	145.5	25.3

注) 血清総コレステロール値及び血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の間診においてコレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の使用の有無に「無」と回答した20歳以上の者を集計対象とした。

第88表 メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上〔妊婦除外〕

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	151	100.0	4	100.0	13	100.0	19	100.0	19	100.0	25	100.0	24	100.0	66	100.0	69	100.0	99	100.0	47	100.0	35	100.0
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	25	16.6	0	0.0	1	7.7	1	5.3	1	5.3	4	16.0	2	8.3	17	25.8	7	10.1	15	15.2	9	19.1	9	25.7
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	33	21.9	0	0.0	1	7.7	4	21.1	4	21.1	5	20.0	5	20.8	18	27.3	13	18.8	21	21.2	9	19.1	11	31.4
上記以外	93	61.6	4	100.0	11	84.6	14	73.7	14	73.7	16	64.0	17	70.8	31	47.0	49	71.0	63	63.6	29	61.7	15	42.9
総数	56	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	5	100.0	8	100.0	9	100.0	29	100.0	21	100.0	35	100.0	19	100.0	16	100.0
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	19	33.9	0	0.0	1	25.0	1	20.0	1	20.0	3	37.5	1	11.1	13	44.8	6	28.6	12	34.3	7	36.8	6	37.5
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	19	33.9	0	0.0	1	25.0	3	60.0	3	60.0	1	12.5	3	33.3	11	37.9	6	28.6	11	31.4	6	31.6	7	43.8
上記以外	18	32.1	1	100.0	2	50.0	1	20.0	1	20.0	4	50.0	5	55.6	5	17.2	9	42.9	12	34.3	6	31.6	3	18.8
総数	95	100.0	3	100.0	9	100.0	14	100.0	14	100.0	17	100.0	15	100.0	37	100.0	48	100.0	64	100.0	28	100.0	19	100.0
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者	6	6.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.9	1	6.7	4	10.8	1	2.1	3	4.7	2	7.1	3	15.8
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者	14	14.7	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	7.1	4	23.5	2	13.3	7	18.9	7	14.6	10	15.6	3	10.7	4	21.1
上記以外	75	78.9	3	100.0	9	100.0	13	92.9	13	92.9	12	70.6	12	80.0	26	70.3	40	83.3	51	79.7	23	82.1	12	63.2

注) 血圧、腹囲、ヘモグロビンA1c、血清HDLコレステロール値の測定を行い、身体状況調査の問診において血圧を下げる薬、コレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の服用状況にすべて回答し、かつインスリン注射又は血糖を下げる薬が有効回答であった20歳以上の者を集計対象とした。なお妊婦1名は除外した。

"メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の疑い"の判定

- メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者 : 腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で、3つの項目(血中脂質、血圧、血糖)のうち2つ以上の項目に該当する者。
- メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予備群と考えられる者 : 腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上で、3つの項目(血中脂質、血圧、血糖)のうち1つの項目に該当する者。

※: 該当するとは、下記の「基準」を満たしている場合、かつまたは「服薬」がある場合とする。

項目	腹囲(ウエスト周囲径)	男性: 85cm以上	女性: 90cm以上
血中脂質	血圧	血糖	
基準	・HDLコレステロール値 40mg/dl未満	・収縮期血圧 130mmHg以上	・ヘモグロビンA1c(NGSP)値 6.0%以上
服薬	・コレステロールを下げる薬服用 ・中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬服用	・拡張期血圧 85mmHg以上	・血糖を下げる薬服用 ・インスリン注射使用

第89表の1 腹囲区分別, 血中脂質, 血圧, 血糖のいずれかのリスクを有する割合 - 年齢階級別, 人数, 割合  
- 総数・男性・女性, 20歳以上〔妊婦除外〕

	腹囲 (cm)	総数		リスク保有数								
		人数	%	0		1つ		2つ		3つ		
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	<85cm (男) / 90cm (女)	81	100.0	35	43.2	34	42.0	11	13.6	1	1.2
		≥85cm (男) / 90cm (女)	70	100.0	12	17.1	33	47.1	20	28.6	5	7.1
	20-29歳	<85cm (男) / 90cm (女)	4	100.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		≥85cm (男) / 90cm (女)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	30-39歳	<85cm (男) / 90cm (女)	9	100.0	8	88.9	1	11.1	0	0.0	0	0.0
		≥85cm (男) / 90cm (女)	4	100.0	2	50.0	1	25.0	1	25.0	0	0.0
	40-49歳	<85cm (男) / 90cm (女)	12	100.0	6	50.0	6	50.0	0	0.0	0	0.0
		≥85cm (男) / 90cm (女)	7	100.0	2	28.6	4	57.1	0	0.0	1	14.3
	50-59歳	<85cm (男) / 90cm (女)	14	100.0	10	71.4	3	21.4	1	7.1	0	0.0
		≥85cm (男) / 90cm (女)	11	100.0	2	18.2	5	45.5	3	27.3	1	9.1
	60-69歳	<85cm (男) / 90cm (女)	14	100.0	4	28.6	9	64.3	1	7.1	0	0.0
		≥85cm (男) / 90cm (女)	10	100.0	3	30.0	5	50.0	2	20.0	0	0.0
	70歳以上	<85cm (男) / 90cm (女)	28	100.0	3	10.7	15	53.6	9	32.1	1	3.6
		≥85cm (男) / 90cm (女)	38	100.0	3	7.9	18	47.4	14	36.8	3	7.9
	(再掲) 40-74歳	<85cm (男) / 90cm (女)	53	100.0	22	41.5	22	41.5	9	17.0	0	0.0
		≥85cm (男) / 90cm (女)	46	100.0	10	21.7	21	45.7	12	26.1	3	6.5
(再掲) 20-64歳	<85cm (男) / 90cm (女)	42	100.0	28	66.7	13	31.0	1	2.4	0	0.0	
	≥85cm (男) / 90cm (女)	27	100.0	7	25.9	13	48.1	5	18.5	2	7.4	
(再掲) 65-74歳	<85cm (男) / 90cm (女)	24	100.0	6	25.0	10	41.7	8	33.3	0	0.0	
	≥85cm (男) / 90cm (女)	23	100.0	5	21.7	9	39.1	8	34.8	1	4.3	
(再掲) 75歳以上	<85cm (男) / 90cm (女)	15	100.0	1	6.7	11	73.3	2	13.3	1	6.7	
	≥85cm (男) / 90cm (女)	20	100.0	0	0.0	11	55.0	7	35.0	2	10.0	
男性	総数	<85cm	15	100.0	7	46.7	5	33.3	3	20.0	0	0.0
		≥85cm	41	100.0	3	7.3	19	46.3	15	36.6	4	9.8
	20-29歳	<85cm	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		≥85cm	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	30-39歳	<85cm	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		≥85cm	3	100.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0.0
	40-49歳	<85cm	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		≥85cm	5	100.0	1	20.0	3	60.0	0	0.0	1	20.0
	50-59歳	<85cm	3	100.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3	0	0.0
		≥85cm	5	100.0	1	20.0	1	20.0	2	40.0	1	20.0
	60-69歳	<85cm	5	100.0	3	60.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0
		≥85cm	4	100.0	0	0.0	3	75.0	1	25.0	0	0.0
	70歳以上	<85cm	5	100.0	1	20.0	2	40.0	2	40.0	0	0.0
		≥85cm	24	100.0	0	0.0	11	45.8	11	45.8	2	8.3
	(再掲) 40-74歳	<85cm	10	100.0	5	50.0	3	30.0	2	20.0	0	0.0
		≥85cm	25	100.0	2	8.0	11	44.0	9	36.0	3	12.0
(再掲) 20-64歳	<85cm	6	100.0	3	50.0	2	33.3	1	16.7	0	0.0	
	≥85cm	15	100.0	3	20.0	6	40.0	4	26.7	2	13.3	
(再掲) 65-74歳	<85cm	6	100.0	4	66.7	1	16.7	1	16.7	0	0.0	
	≥85cm	13	100.0	0	0.0	6	46.2	6	46.2	1	7.7	
(再掲) 75歳以上	<85cm	3	100.0	0	0.0	2	66.7	1	33.3	0	0.0	
	≥85cm	13	100.0	0	0.0	7	53.8	5	38.5	1	7.7	
女性	総数	<90cm	66	100.0	28	42.4	29	43.9	8	12.1	1	1.5
		≥90cm	29	100.0	9	31.0	14	48.3	5	17.2	1	3.4
	20-29歳	<90cm	3	100.0	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
		≥90cm	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	30-39歳	<90cm	8	100.0	7	87.5	1	12.5	0	0.0	0	0.0
		≥90cm	1	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	40-49歳	<90cm	12	100.0	6	50.0	6	50.0	0	0.0	0	0.0
		≥90cm	2	100.0	1	50.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0
	50-59歳	<90cm	11	100.0	9	81.8	2	18.2	0	0.0	0	0.0
		≥90cm	6	100.0	1	16.7	4	66.7	1	16.7	0	0.0
	60-69歳	<90cm	9	100.0	1	11.1	7	77.8	1	11.1	0	0.0
		≥90cm	6	100.0	3	50.0	2	33.3	1	16.7	0	0.0
	70歳以上	<90cm	23	100.0	2	8.7	13	56.5	7	30.4	1	4.3
		≥90cm	14	100.0	3	21.4	7	50.0	3	21.4	1	7.1
	(再掲) 40-74歳	<90cm	43	100.0	17	39.5	19	44.2	7	16.3	0	0.0
		≥90cm	21	100.0	8	38.1	10	47.6	3	14.3	0	0.0
(再掲) 20-64歳	<90cm	36	100.0	25	69.4	11	30.6	0	0.0	0	0.0	
	≥90cm	12	100.0	4	33.3	7	58.3	1	8.3	0	0.0	
(再掲) 65-74歳	<90cm	18	100.0	2	11.1	9	50.0	7	38.9	0	0.0	
	≥90cm	10	100.0	5	50.0	3	30.0	2	20.0	0	0.0	
(再掲) 75歳以上	<90cm	12	100.0	1	8.3	9	75.0	1	8.3	1	8.3	
	≥90cm	7	100.0	0	0.0	4	57.1	2	28.6	1	14.3	

注1) 血圧, 腹囲, ヘモグロビンA1c, 血清HDLコレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診において血圧を下げる薬, コレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセリド)を下げる薬の服用状況にすべて回答し, かつインスリン注射または血糖を下げる薬が有効回答であった20歳以上の者を集計対象とした。なお妊婦1名は除外した。

注2) リスク項目の基準はp.258を参照。

第89表の2 腹囲区分別, 血中脂質, 血圧, 血糖のリスクの保有状況[すべての組み合わせ(①血中脂質  
②血圧③血糖)]-年齢階級別, 人数, 割合-総数・男性・女性, 20歳以上[妊婦除外]

	腹囲(cm)	総数		リスク保有組み合わせ																
				①有②有③有		①有②有③無		①無②有③有		①有②無③有		①無②無③有		①無②有③無		①無②無③有		①無②無③無		
				人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	
総数	総数	<85cm(男)/90cm(女)	81	100.0	1	1.2	6	7.4	5	6.2	0	0.0	5	6.2	28	34.6	1	1.2	35	43.2
		≥85cm(男)/90cm(女)	70	100.0	5	7.1	11	15.7	7	10.0	2	2.9	1	1.4	31	44.3	1	1.4	12	17.1
	20-29歳	<85cm(男)/90cm(女)	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	30-39歳	<85cm(男)/90cm(女)	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	8	88.9
		≥85cm(男)/90cm(女)	4	100.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	2	50.0
	40-49歳	<85cm(男)/90cm(女)	12	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	50.0	0	0.0	6	50.0
		≥85cm(男)/90cm(女)	7	100.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	57.1	0	0.0	2	28.6
	50-59歳	<85cm(男)/90cm(女)	14	100.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	1	7.1	2	14.3	0	0.0	10	71.4
		≥85cm(男)/90cm(女)	11	100.0	1	9.1	3	27.3	0	0.0	0	0.0	1	9.1	4	36.4	0	0.0	2	18.2
	60-69歳	<85cm(男)/90cm(女)	14	100.0	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	3	21.4	6	42.9	0	0.0	4	28.6
		≥85cm(男)/90cm(女)	10	100.0	0	0.0	1	10.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	5	50.0	0	0.0	3	30.0
	70歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	28	100.0	1	3.6	5	17.9	4	14.3	0	0.0	1	3.6	13	46.4	1	3.6	3	10.7
		≥85cm(男)/90cm(女)	38	100.0	3	7.9	7	18.4	5	13.2	2	5.3	0	0.0	17	44.7	1	2.6	3	7.9
	(再掲) 40-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	53	100.0	0	0.0	4	7.5	5	9.4	0	0.0	4	7.5	18	34.0	0	0.0	22	41.5
		≥85cm(男)/90cm(女)	46	100.0	3	6.5	8	17.4	4	8.7	0	0.0	1	2.2	19	41.3	1	2.2	10	21.7
	(再掲) 20-64歳	<85cm(男)/90cm(女)	42	100.0	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0	3	7.1	10	23.8	0	0.0	28	66.7
		≥85cm(男)/90cm(女)	27	100.0	2	7.4	3	11.1	2	7.4	0	0.0	1	3.7	12	44.4	0	0.0	7	25.9
(再掲) 65-74歳	<85cm(男)/90cm(女)	24	100.0	0	0.0	4	16.7	4	16.7	0	0.0	1	4.2	9	37.5	0	0.0	6	25.0	
	≥85cm(男)/90cm(女)	23	100.0	1	4.3	5	21.7	3	13.0	0	0.0	0	0.0	8	34.8	1	4.3	5	21.7	
(再掲) 75歳以上	<85cm(男)/90cm(女)	15	100.0	1	6.7	2	13.3	0	0.0	0	0.0	1	6.7	9	60.0	1	6.7	1	6.7	
	≥85cm(男)/90cm(女)	20	100.0	2	10.0	3	15.0	2	10.0	2	10.0	0	0.0	11	55.0	0	0.0	0	0.0	
男性	総数	<85cm	15	100.0	0	0.0	2	13.3	1	6.7	0	0.0	0	0.0	4	26.7	1	6.7	7	46.7
		≥85cm	41	100.0	4	9.8	6	14.6	7	17.1	2	4.9	0	0.0	18	43.9	1	2.4	3	7.3
	20-29歳	<85cm	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
		≥85cm	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	30-39歳	<85cm	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
		≥85cm	3	100.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	33.3
	40-49歳	<85cm	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
		≥85cm	5	100.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	60.0	0	0.0	1	20.0
	50-59歳	<85cm	3	100.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	1	33.3
		≥85cm	5	100.0	1	20.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	20.0
	60-69歳	<85cm	5	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	3	60.0
		≥85cm	4	100.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	0	0.0	3	75.0	0	0.0	0	0.0
	70歳以上	<85cm	5	100.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0
		≥85cm	24	100.0	2	8.3	4	16.7	5	20.8	2	8.3	0	0.0	10	41.7	1	4.2	0	0.0
	(再掲) 40-74歳	<85cm	10	100.0	0	0.0	1	10.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	3	30.0	0	0.0	5	50.0
		≥85cm	25	100.0	3	12.0	5	20.0	4	16.0	0	0.0	0	0.0	10	40.0	1	4.0	2	8.0
	(再掲) 20-64歳	<85cm	6	100.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	3	50.0
		≥85cm	15	100.0	2	13.3	2	13.3	2	13.3	0	0.0	0	0.0	6	40.0	0	0.0	3	20.0
(再掲) 65-74歳	<85cm	6	100.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	4	66.7	
	≥85cm	13	100.0	1	7.7	3	23.1	3	23.1	0	0.0	0	0.0	5	38.5	1	7.7	0	0.0	
(再掲) 75歳以上	<85cm	3	100.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	
	≥85cm	13	100.0	1	7.7	1	7.7	2	15.4	2	15.4	0	0.0	7	53.8	0	0.0	0	0.0	
女性	総数	<90cm	66	100.0	1	1.5	4	6.1	4	6.1	0	0.0	5	7.6	24	36.4	0	0.0	28	42.4
		≥90cm	29	100.0	1	3.4	5	17.2	0	0.0	0	0.0	1	3.4	13	44.8	0	0.0	9	31.0
	20-29歳	<90cm	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0
		≥90cm	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
	30-39歳	<90cm	8	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	7	87.5
		≥90cm	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0
	40-49歳	<90cm	12	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	50.0	0	0.0	6	50.0
		≥90cm	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	1	50.0
	50-59歳	<90cm	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	9.1	0	0.0	9	81.8
		≥90cm	6	100.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	1	16.7	3	50.0	0	0.0	1	16.7
	60-69歳	<90cm	9	100.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	0	0.0	3	33.3	4	44.4	0	0.0	1	11.1
		≥90cm	6	100.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	3	50.0
	70歳以上	<90cm	23	100.0	1	4.3	3	13.0	4	17.4	0	0.0	1	4.3	12	52.2	0	0.0	2	8.7
		≥90cm	14	100.0	1	7.1	3	21.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	50.0	0	0.0	3	21.4
	(再掲) 40-74歳	<90cm	43	100.0	0	0.0	3	7.0	4	9.3	0	0.0	4	9.3	15	34.9	0	0.0	17	39.5
		≥90cm	21	100.0	0	0.0	3	14.3	0	0.0	0	0.0	1	4.8	9	42.9	0	0.0	8	38.1
	(再掲) 20-64歳	<90cm	36	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.3	8	22.2	0	0.0	25	69.4
		≥90cm	12	100.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	8.3	6	50.0	0	0.0	4	33.3
(再掲) 65-74歳	<90cm	18	100.0	0	0.0	3	16.7	4	22.2	0	0.0	1	5.6	8	44.4	0	0.0	2	11.1	
	≥90cm	10	100.0	0	0.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	30.0	0	0.0	5	50.0	
(再掲) 75歳以上	<90cm	12	100.0	1	8.3	1	8.3	0	0.0	0	0.0	1	8.3	8	66.7	0	0.0	1	8.3	
	≥90cm	7	100.0	1	14.3	2	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	57.1	0	0.0	0	0.0	

注1) 血圧, 腹囲, ヘモグロビンA1c, 血清HDLコレステロール値の測定を行い, 身体状況調査の問診において血圧を下げる薬, コレステロールを下げる薬及び中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬の服用状況にすべて回答し, かつインスリン注射又は血糖を下げる薬が有効回答であった20歳以上の者を集計対象とした。なお, 妊婦1名は除外した。

注2) リスク項目の基準はp.258を参照。

第90表 糖尿病の指摘の有無 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	152	100.0	5	100.0	13	100.0	19	100.0	25	100.0	24	100.0	66	100.0	70	100.0	99	100.0	47	100.0	35	100.0
あり	25	16.4	0	0.0	1	7.7	0	0.0	2	8.0	4	16.7	18	27.3	4	5.7	17	17.2	14	29.8	7	20.0
なし	127	83.6	5	100.0	12	92.3	19	100.0	23	92.0	20	83.3	48	72.7	66	94.3	82	82.8	33	70.2	28	80.0
男性	56	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	8	100.0	9	100.0	29	100.0	21	100.0	35	100.0	19	100.0	16	100.0
あり	16	28.6	0	0.0	1	25.0	0	0.0	2	25.0	3	33.3	10	34.5	4	19.0	9	25.7	6	31.6	6	37.5
なし	40	71.4	1	100.0	3	75.0	5	100.0	6	75.0	6	66.7	19	65.5	17	81.0	26	74.3	13	68.4	10	62.5
女性	96	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	17	100.0	15	100.0	37	100.0	49	100.0	64	100.0	28	100.0	19	100.0
あり	9	9.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	8	21.6	0	0.0	8	12.5	8	28.6	1	5.3
なし	87	90.6	4	100.0	9	100.0	14	100.0	17	100.0	14	93.3	29	78.4	49	100.0	56	87.5	20	71.4	18	94.7

注) ヘモグロビンA1cの測定値があり、身体状況調査の問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」に回答したものを集計対象とした。

第91表 糖尿病を指摘されたことがある者における治療の有無 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	25	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	4	100.0	18	100.0	4	100.0	17	100.0	14	100.0	7	100.0
あり	18	72.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	3	75.0	12	66.7	4	100.0	11	64.7	8	57.1	6	85.7
なし	7	28.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	6	33.3	0	0.0	6	35.3	6	42.9	1	14.3
男性	16	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	10	100.0	4	100.0	9	100.0	6	100.0	6	100.0
あり	14	87.5	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	2	66.7	9	90.0	4	100.0	8	88.9	5	83.3	5	83.3
なし	2	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	10.0	0	0.0	1	11.1	1	16.7	1	16.7
女性	9	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	8	100.0	0	0.0	8	100.0	8	100.0	1	100.0
あり	4	44.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	3	37.5	0	0.0	3	37.5	3	37.5	1	100.0
なし	5	55.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	62.5	0	0.0	5	62.5	5	62.5	0	0.0

注) ヘモグロビンA1cの測定値があり、身体状況調査の問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」及び「(7-1)現在の糖尿病の治療の有無」が有効回答者のうち、「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」に「有」と回答した者を集計対象とした。

第92表 現在、糖尿病治療をしている者における投薬の有無 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上				
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%			
総数	18	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	12	100.0	4	100.0	11	100.0	8	100.0	6	100.0		
インスリン注射または血糖を下げる薬	あり	13	72.2	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	50.0	1	33.3	10	83.3	3	75.0	6	54.5	4	50.0	6	100.0	
	なし	5	27.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	2	66.7	2	16.7	1	25.0	5	45.5	4	50.0	0	0.0	
男性	総数	14	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0	9	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	5	100.0	
	インスリン注射または血糖を下げる薬	あり	10	71.4	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	7	77.8	3	75.0	4	50.0	2	40.0	5	100.0
	なし	4	28.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	2	22.2	1	25.0	4	50.0	3	60.0	0	0.0	
女性	総数	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	0	0.0	3	100.0	3	100.0	1	100.0	
	インスリン注射または血糖を下げる薬	あり	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	2	66.7	2	66.7	2	100.0	1	100.0
	なし	1	25.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	1	33.3	1	33.3	0	0.0	

注1) ヘモグロビンA1cの測定値があり、身体状況調査の問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」、「(7-1)現在の糖尿病の治療の有無」及び「(7-2)現在の投薬」が有効回答の者のうち、「(7-1)現在の糖尿病の治療の有無」に「有」と回答した者を集計対象とした。

注2) 「インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用」の判定:インスリン注射または血糖を下げる薬を使っている場合を「有」とした。

第93表 現在、糖尿病治療をしている者における生活習慣の改善の取り組み状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

	総数	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上			
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	17	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	11	100.0	4	100.0	11	100.0	8	100.0	5	100.0	
あり	14	82.4	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	8	72.7	4	100.0	10	90.9	7	87.5	3	60.0	
なし	3	17.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	27.3	0	0.0	1	9.1	1	12.5	2	40.0	
男性	総数	13	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0	8	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	4	100.0
	あり	10	76.9	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0	5	62.5	4	100.0	7	87.5	4	80.0	2	50.0
	なし	3	23.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	37.5	0	0.0	1	12.5	1	20.0	2	50.0
女性	総数	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	0	0.0	3	100.0	3	100.0	1	100.0
	あり	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	0	0.0	3	100.0	3	100.0	1	100.0
	なし	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) ヘモグロビンA1cの測定値があり、身体状況調査の問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」、「(7-1)現在の糖尿病の治療の有無」及び「(7-2)現在の投薬」及び「(7-3)生活改善の取組の状況」が有効回答の者のうち、「(7-1)現在の糖尿病の治療の有無」に「有」と回答した者を集計対象とした。

第94表 「糖尿病が強く疑われる者」及び「糖尿病の可能性を否定できない者」の状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性・20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	152	100.0	5	100.0	13	100.0	19	100.0	25	100.0	24	100.0	66	100.0	70	100.0	99	100.0	47	100.0	35	100.0
糖尿病が強く疑われる者	19	12.5	0	0.0	1	7.7	0	0.0	2	8.0	3	12.5	13	19.7	4	5.7	11	11.1	8	17.0	7	20.0
(再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち、服薬者*	13	68.4	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	50.0	1	33.3	10	76.9	3	75.0	6	54.5	4	50.0	6	85.7
糖尿病の可能性を否定できない者	7	4.6	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	4.0	0	0.0	5	7.6	2	2.9	6	6.1	4	8.5	1	2.9
上記以外	126	82.9	5	100.0	12	92.3	18	94.7	22	88.0	21	87.5	48	72.7	64	91.4	82	82.8	35	74.5	27	77.1
男性	56	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	8	100.0	9	100.0	29	100.0	21	100.0	35	100.0	19	100.0	16	100.0
糖尿病が強く疑われる者	15	26.8	0	0.0	1	25.0	0	0.0	2	25.0	2	22.2	10	34.5	4	19.0	8	22.9	5	26.3	6	37.5
(再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち、服薬者*	10	66.7	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	7	70.0	3	75.0	4	50.0	2	40.0	5	83.3
糖尿病の可能性を否定できない者	4	7.1	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	12.5	0	0.0	2	6.9	2	9.5	4	11.4	2	10.5	0	0.0
上記以外	37	66.1	1	100.0	3	75.0	4	80.0	5	62.5	7	77.8	17	58.6	15	71.4	23	65.7	12	63.2	10	62.5
女性	96	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	17	100.0	15	100.0	37	100.0	49	100.0	64	100.0	28	100.0	19	100.0
糖尿病が強く疑われる者	4	4.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.7	3	8.1	0	0.0	3	4.7	3	10.7	1	5.3
(再掲)糖尿病が強く疑われる者のうち、服薬者*	3	75.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	0	0.0	2	66.7	2	66.7	1	100.0
糖尿病の可能性を否定できない者	3	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.1	0	0.0	2	3.1	2	7.1	1	5.3
上記以外	89	92.7	4	100.0	9	100.0	14	100.0	17	100.0	14	93.3	31	83.8	49	100.0	59	92.2	23	82.1	17	89.5

注) 身体状況調査においてヘモグロビンA1cの測定値があり、身体状況調査の問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」、「(7-1)現在の糖尿病の治療の有無」及び「(7-2)現在の投薬」が有効回答の者を集計対象とした。

\*「服薬者」は、身体状況調査の問診において「インスリン注射又は血糖を下げる薬の使用」に「有」と回答した者

「糖尿病が強く疑われる者」の判定:

ヘモグロビンA1cの測定値があり、身体状況調査票(7)。(7-1)及び(7-2)が有効回答の者のうち、ヘモグロビンA1c(NGSP)の値が6.5%以上、または、身体状況調査票の「(7-1)現在の糖尿病治療の有無」に「有」と回答した者

「糖尿病の可能性を否定できない者」の判定:

ヘモグロビンA1cの測定値がある者のうち、ヘモグロビンA1c(NGSP)値が6.0%以上、6.5%未満で、「糖尿病が強く疑われる者」以外の者

第95表 「糖尿病が強く疑われる者」における治療の有無 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	19	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	13	100.0	4	100.0	11	100.0	8	100.0	7	100.0
あり	18	94.7	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	3	100.0	12	92.3	4	100.0	11	100.0	8	100.0	6	85.7
なし	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3
総数	15	100.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0	10	100.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	6	100.0
あり	14	93.3	0	0.0	1	100.0	0	0.0	2	100.0	2	100.0	9	90.0	4	100.0	8	100.0	5	100.0	5	83.3
なし	1	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7
総数	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	0	0.0	3	100.0	3	100.0	1	100.0
あり	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	0	0.0	3	100.0	3	100.0	1	100.0
なし	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

注) 身体状況調査においてヘモグロビンA1cの測定値があり、身体状況調査の問診において「(7)これまでに医療機関や健診で糖尿病といわれたことの有無」及び「(7-1)現在の糖尿病の治療の有無」が有効回答の者を集計対象とした。

※ 身体状況調査票の問診「(7-1)現在の糖尿病の治療の有無(通院による定期的な検査や生活習慣の改善指導を含む)」に「有」と回答した者を治療ありとした。

「糖尿病が強く疑われる者」の判定:

ヘモグロビンA1cの測定値があり、身体状況調査票(7)、(7-1)及び(7-2)が有効回答の者のうち、ヘモグロビンA1c(NGSP)の値が6.5%以上、または、身体状況調査票の「(7-1)現在の糖尿病治療の有無」に「有」と回答した者

第96表 高血圧症有病者の状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	155	100.0	5	100.0	13	100.0	19	100.0	25	100.0	26	100.0	67	100.0	71	100.0	101	100.0	48	100.0	36	100.0
高血圧症有病者	72	46.5	0	0.0	1	7.7	6	31.6	8	32.0	10	38.5	47	70.1	19	26.8	44	43.6	26	54.2	27	75.0
総数	53	73.6	0	0.0	1	100.0	5	83.3	6	75.0	4	40.0	37	78.7	14	73.7	29	65.9	16	61.5	23	85.2
高血圧症有病者のうち服薬者*	34	21.9	1	20.0	3	23.1	7	36.8	5	20.0	8	30.8	10	14.9	18	25.4	25	24.8	11	22.9	5	13.9
高値血圧者	14	9.0	0	0.0	2	15.4	1	5.3	4	16.0	1	3.8	6	9.0	8	11.3	9	8.9	3	6.3	3	8.3
正常高値血圧者	35	22.6	4	80.0	7	53.8	5	26.3	8	32.0	7	26.9	4	6.0	26	36.6	23	22.8	8	16.7	1	2.8
上記以外																						
総数	58	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	8	100.0	11	100.0	29	100.0	22	100.0	37	100.0	20	100.0	16	100.0
高血圧症有病者	38	65.5	0	0.0	1	25.0	4	80.0	6	75.0	5	45.5	22	75.9	14	63.6	25	67.6	12	60.0	12	75.0
(再掲) 高血圧症有病者のうち服薬者*	28	73.7	0	0.0	1	100.0	3	75.0	5	83.3	2	40.0	17	77.3	11	78.6	17	68.0	7	58.3	10	83.3
高値血圧者	8	13.8	1	100.0	1	25.0	1	20.0	0	0.0	3	27.3	2	6.9	4	18.2	5	13.5	3	15.0	1	6.3
正常高値血圧者	5	8.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	0	0.0	4	13.8	1	4.5	2	5.4	1	5.0	3	18.8
上記以外	7	12.1	0	0.0	2	50.0	0	0.0	1	12.5	3	27.3	1	3.4	3	13.6	5	13.5	4	20.0	0	0.0
総数	97	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	17	100.0	15	100.0	38	100.0	49	100.0	64	100.0	28	100.0	20	100.0
高血圧症有病者	34	35.1	0	0.0	0	0.0	2	14.3	2	11.8	5	33.3	25	65.8	5	10.2	19	29.7	14	50.0	15	75.0
(再掲) 高血圧症有病者のうち服薬者*	25	73.5	0	0.0	0	0.0	2	100.0	1	50.0	2	40.0	20	80.0	3	60.0	12	63.2	9	64.3	13	86.7
高値血圧者	26	26.8	0	0.0	2	22.2	6	42.9	5	29.4	5	33.3	8	21.1	14	28.6	20	31.3	8	28.6	4	20.0
正常高値血圧者	9	9.3	0	0.0	2	22.2	1	7.1	3	17.6	1	6.7	2	5.3	7	14.3	7	10.9	2	7.1	0	0.0
上記以外	28	28.9	4	100.0	5	55.6	5	35.7	7	41.2	4	26.7	3	7.9	23	46.9	18	28.1	4	14.3	1	5.0

注1) 血圧の測定を行い、身体状況調査の問診において「(6) (a) 血圧を下げる薬」に回答している者を集計対象とした。

注2) 数値は2回の測定値の平均値を用いた。

\*「服薬者」とは、身体状況調査の問診において「(6) (a) 血圧を下げる薬」に「有」と回答した者。

「高血圧症有病者」の判定 : 収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上、もしくは血圧を下げる薬を服用している者  
 「高値血圧者」の判定 : 収縮期血圧130-139mmHg、かつまたは拡張期血圧80-89mmHgで、血圧を下げる薬を服用していない者  
 「正常高値血圧者」の判定 : 収縮期血圧120-129mmHg、かつ拡張期血圧80mmHg未満で、血圧を下げる薬を服用していない者

第97表 「脂質異常症が疑われる者」の状況 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	152	100.0	5	100.0	13	100.0	19	100.0	25	100.0	24	100.0	66	100.0	70	100.0	99	100.0	47	100.0	35	100.0
脂質異常症が疑われる者	31	20.4	0	0.0	0	0.0	1	5.3	6	24.0	5	20.8	19	28.8	9	12.9	20	20.2	11	23.4	11	31.4
(再掲) 脂質異常症が疑われる人のうち服薬者*	25	80.6	0	0.0	0	0.0	1	100.0	5	83.3	3	60.0	16	84.2	6	66.7	14	70.0	8	72.7	11	100.0
上記以外	121	79.6	5	100.0	13	100.0	18	94.7	19	76.0	19	79.2	47	71.2	61	87.1	79	79.8	36	76.6	24	68.6
男性	56	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	8	100.0	9	100.0	29	100.0	21	100.0	35	100.0	19	100.0	16	100.0
脂質異常症が疑われる者	14	25.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	3	37.5	0	0.0	10	34.5	4	19.0	9	25.7	5	26.3	5	31.3
(再掲) 脂質異常症が疑われる人のうち服薬者*	11	78.6	0	0.0	0	0.0	1	100.0	2	66.7	0	0.0	8	80.0	3	75.0	6	66.7	3	60.0	5	100.0
上記以外	42	75.0	1	100.0	4	100.0	4	80.0	5	62.5	9	100.0	19	65.5	17	81.0	26	74.3	14	73.7	11	68.8
女性	96	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	17	100.0	15	100.0	37	100.0	49	100.0	64	100.0	28	100.0	19	100.0
脂質異常症が疑われる者	17	17.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	17.6	5	33.3	9	24.3	5	10.2	11	17.2	6	21.4	6	31.6
(再掲) 脂質異常症が疑われる人のうち服薬者*	14	82.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	100.0	3	60.0	8	88.9	3	60.0	8	72.7	5	83.3	6	100.0
上記以外	79	82.3	4	100.0	9	100.0	14	100.0	14	82.4	10	66.7	28	75.7	44	89.8	53	82.8	22	78.6	13	68.4

注) 血清HDLコレステロール値を測定し、身体状況調査の問診において「(6)(c)コレステロールを下げる薬」、「(6)(d)中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬」の使用状況に回答した者を集計対象とした。

\*「服薬者」とは、身体状況調査の問診において「(6)(c)コレステロールを下げる薬」、「(6)(d)中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬」に使用「有」と回答した者。

「脂質異常症が疑われる者」の判定

県民健康・栄養調査の血液検査では、空腹時採血が困難であるため、脂質異常症の診断基準項目である中性脂肪による判定は行わず、下記のとおりとした。

HDLコレステロールが40mg/dl未満、もしくはコレステロールを下げる薬又は中性脂肪(トリグリセライド)を下げる薬を服用している者。

第98表 運動禁止の有無 - 年齢階級別, 人数, 割合 - 総数・男性・女性, 20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	160	100.0	5	100.0	13	100.0	19	100.0	26	100.0	30	100.0	67	100.0	72	100.0	88	100.0	52	100.0	36	100.0
運動禁止の有	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	1.1	0	0.0	1	2.8
運動禁止の無	159	99.4	5	100.0	13	100.0	19	100.0	26	100.0	30	100.0	66	98.5	72	100.0	87	98.9	52	100.0	35	97.2
男性	60	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	8	100.0	13	100.0	29	100.0	22	100.0	38	100.0	22	100.0	16	100.0
運動禁止の有	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
運動禁止の無	60	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	8	100.0	13	100.0	29	100.0	22	100.0	38	100.0	22	100.0	16	100.0
女性	100	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	18	100.0	17	100.0	38	100.0	50	100.0	50	100.0	30	100.0	20	100.0
運動禁止の有	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	2.0	0	0.0	1	5.0
運動禁止の無	99	99.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	18	100.0	17	100.0	37	97.4	50	100.0	49	98.0	30	100.0	19	95.0

注) 身体状況調査の問診において「(8)医師等からの運動禁止の有無」に回答した者を集計対象とした。

第99表 1週間の運動日数 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 75歳以上			
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%		
総数	158	100.0	5	100.0	13	100.0	19	100.0	26	100.0	29	100.0	66	100.0	72	100.0	86	100.0	51	100.0	35	100.0
運動無し	59	37.3	5	100.0	6	46.2	5	26.3	16	61.5	9	31.0	18	27.3	34	47.2	25	29.1	13	25.5	12	34.3
1日/週	21	13.3	0	0.0	0	0.0	7	36.8	3	11.5	4	13.8	7	10.6	12	16.7	9	10.5	5	9.8	4	11.4
2日/週	17	10.8	0	0.0	4	30.8	2	10.5	2	7.7	2	6.9	7	10.6	8	11.1	9	10.5	6	11.8	3	8.6
3日/週	20	12.7	0	0.0	3	23.1	1	5.3	1	3.8	3	10.3	12	18.2	7	9.7	13	15.1	9	17.6	4	11.4
4日/週	10	6.3	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	3.8	4	13.8	4	6.1	4	5.6	6	7.0	4	7.8	2	5.7
5日/週	8	5.1	0	0.0	0	0.0	2	10.5	1	3.8	1	3.4	4	6.1	3	4.2	5	5.8	4	7.8	1	2.9
6日/週	2	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	0	0.0	2	2.3	1	2.0	1	2.9
7日/週	21	13.3	0	0.0	0	0.0	1	5.3	2	7.7	6	20.7	12	18.2	4	5.6	17	19.8	9	17.6	8	22.9
総数	60	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	8	100.0	13	100.0	29	100.0	22	100.0	38	100.0	22	100.0	16	100.0
運動無し	23	38.3	1	100.0	1	25.0	0	0.0	6	75.0	4	30.8	11	37.9	8	36.4	15	39.5	7	31.8	8	50.0
1日/週	4	6.7	0	0.0	0	0.0	2	40.0	0	0.0	1	7.7	1	3.4	3	13.6	1	2.6	1	4.5	0	0.0
2日/週	7	11.7	0	0.0	1	25.0	1	20.0	1	12.5	1	7.7	3	10.3	3	13.6	4	10.5	2	9.1	2	12.5
3日/週	9	15.0	0	0.0	2	50.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	6	20.7	3	13.6	6	15.8	3	13.6	3	18.8
4日/週	4	6.7	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	2	15.4	1	3.4	3	13.6	1	2.6	1	4.5	0	0.0
5日/週	4	6.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	3	10.3	0	0.0	4	10.5	3	13.6	1	6.3
6日/週	1	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.4	0	0.0	1	2.6	0	0.0	1	6.3
7日/週	8	13.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	4	30.8	3	10.3	2	9.1	6	15.8	5	22.7	1	6.3
総数	98	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	18	100.0	16	100.0	37	100.0	50	100.0	48	100.0	29	100.0	19	100.0
運動無し	36	36.7	4	100.0	5	55.6	5	35.7	10	55.6	5	31.3	7	18.9	26	52.0	10	20.8	6	20.7	4	21.1
1日/週	17	17.3	0	0.0	0	0.0	5	35.7	3	16.7	3	18.8	6	16.2	9	18.0	8	16.7	4	13.8	4	21.1
2日/週	10	10.2	0	0.0	3	33.3	1	7.1	1	5.6	1	6.3	4	10.8	5	10.0	5	10.4	4	13.8	1	5.3
3日/週	11	11.2	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	5.6	3	18.8	6	16.2	4	8.0	7	14.6	6	20.7	1	5.3
4日/週	6	6.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.6	2	12.5	3	8.1	1	2.0	5	10.4	3	10.3	2	10.5
5日/週	4	4.1	0	0.0	0	0.0	2	14.3	1	5.6	0	0.0	1	2.7	3	6.0	1	2.1	1	3.4	0	0.0
6日/週	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	1	2.1	1	3.4	0	0.0
7日/週	13	13.3	0	0.0	0	0.0	1	7.1	1	5.6	2	12.5	9	24.3	2	4.0	11	22.9	4	13.8	7	36.8

注) 身体状況調査の問診において「(8)医師等からの運動禁止の有無」に「無」と回答し、「(9)のすべてに回答したものを集計対象とした。

第100表 運動を行う日の平均運動時間 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	99	100.0	0	0.0	7	100.0	14	100.0	10	100.0	20	100.0	48	100.0	38	100.0	61	100.0	38	100.0	23	100.0
30分未満	10	10.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.0	8	16.7	1	2.6	9	14.8	5	13.2	4	17.4
30分以上60分未満	39	39.4	0	0.0	2	28.6	8	57.1	6	60.0	6	30.0	17	35.4	18	47.4	21	34.4	12	31.6	9	39.1
60分以上120分未満	24	24.2	0	0.0	3	42.9	3	21.4	2	20.0	7	35.0	9	18.8	9	23.7	15	24.6	11	28.9	4	17.4
120分以上180分未満	13	13.1	0	0.0	1	14.3	1	7.1	2	20.0	3	15.0	6	12.5	6	15.8	7	11.5	6	15.8	1	4.3
180分以上	13	13.1	0	0.0	1	14.3	2	14.3	0	0.0	2	10.0	8	16.7	4	10.5	9	14.8	4	10.5	5	21.7
総数	37	100.0	0	0.0	3	100.0	5	100.0	2	100.0	9	100.0	18	100.0	14	100.0	23	100.0	15	100.0	8	100.0
30分未満	1	2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	7.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30分以上60分未満	12	32.4	0	0.0	0	0.0	3	60.0	1	50.0	2	22.2	6	33.3	4	28.6	8	34.8	6	40.0	2	25.0
60分以上120分未満	10	27.0	0	0.0	1	33.3	1	20.0	1	50.0	4	44.4	3	16.7	4	28.6	6	26.1	4	26.7	2	25.0
120分以上180分未満	4	10.8	0	0.0	1	33.3	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	11.1	2	14.3	2	8.7	2	13.3	0	0.0
180分以上	10	27.0	0	0.0	1	33.3	1	20.0	0	0.0	1	11.1	7	38.9	3	21.4	7	30.4	3	20.0	4	50.0
総数	62	100.0	0	0.0	4	100.0	9	100.0	8	100.0	11	100.0	30	100.0	24	100.0	38	100.0	23	100.0	15	100.0
30分未満	9	14.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	8	26.7	0	0.0	9	23.7	5	21.7	4	26.7
30分以上60分未満	27	43.5	0	0.0	2	50.0	5	55.6	5	62.5	4	36.4	11	36.7	14	58.3	13	34.2	6	26.1	7	46.7
60分以上120分未満	14	22.6	0	0.0	2	50.0	2	22.2	1	12.5	3	27.3	6	20.0	5	20.8	9	23.7	7	30.4	2	13.3
120分以上180分未満	3	14.5	0	0.0	0	0.0	1	11.1	2	25.0	2	18.2	4	13.3	4	16.7	5	13.2	4	17.4	1	6.7
180分以上	9	4.8	0	0.0	0	0.0	1	11.1	0	0.0	1	9.1	1	3.3	1	4.2	2	5.3	1	4.3	1	6.7

注) 身体状況調査の問診において「(8)医師等からの運動禁止の有無」「(9)のすべてに回答した者のうち、「(9)(a)1週間の運動日数」が1日以上と回答した者を集計対象とした。

第101表 運動習慣の有無 - 年齢階級別、人数、割合 - 総数・男性・女性、20歳以上

	総数		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-64歳		(再掲) 65歳以上		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上	
	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
総数	158	100.0	5	100.0	13	100.0	19	100.0	26	100.0	29	100.0	66	100.0	72	100.0	86	100.0	51	100.0	35	100.0
運動の習慣有	58	36.7	0	0.0	5	38.5	7	36.8	4	15.4	12	41.4	30	45.5	19	26.4	39	45.3	23	45.1	16	45.7
運動の習慣無	100	63.3	5	100.0	8	61.5	12	63.2	22	84.6	17	58.6	36	54.5	53	73.6	47	54.7	28	54.9	19	54.3
総数	60	100.0	1	100.0	4	100.0	5	100.0	8	100.0	13	100.0	29	100.0	22	100.0	38	100.0	22	100.0	16	100.0
運動の習慣有	29	48.3	0	0.0	2	50.0	3	60.0	1	12.5	7	53.8	16	55.2	8	36.4	21	55.3	13	59.1	8	50.0
運動の習慣無	31	51.7	1	100.0	2	50.0	2	40.0	7	87.5	6	46.2	13	44.8	14	63.6	17	44.7	9	40.9	8	50.0
総数	98	100.0	4	100.0	9	100.0	14	100.0	18	100.0	16	100.0	37	100.0	50	100.0	48	100.0	29	100.0	19	100.0
運動の習慣有	29	29.6	0	0.0	3	33.3	4	28.6	3	16.7	5	31.3	14	37.8	11	22.0	18	37.5	10	34.5	8	42.1
運動の習慣無	69	70.4	4	100.0	6	66.7	10	71.4	15	83.3	11	68.8	23	62.2	39	78.0	30	62.5	19	65.5	11	57.9

注) 身体状況調査の問診において「(8)医師等からの運動禁止の有無」「(9)のすべてに回答した者を集計対象とした。

※ 「運動の習慣有」とは、身体状況調査の問診(9)で1回30分以上の運動を週2回以上実施し、1年以上継続していると回答した者。

※ 年齢調整値は、運動習慣のある者の割合(20歳以上)は、総数32.2%、男性41.7%、女性26.7%。

年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。

第102表 歩数の平均値及び標準偏差 - 年齢階級別、人数、平均値、標準偏差 - 総数・男性・女性、20歳以上

	総数			20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	239	6,355	3,568	10	5,401	1,845	31	7,029	4,101	35	7,196	3,463	46	6,705	3,366	48	6,346	2,839	69	5,538	4,019
男性	103	6,994	3,847	4	5,017	1,286	12	9,190	5,171	15	8,127	3,604	18	7,447	3,089	23	6,471	3,119	31	5,977	4,152
女性	136	5,871	3,273	6	5,656	2,222	19	5,663	2,570	20	6,498	3,271	28	6,228	3,502	25	6,232	2,615	38	5,179	3,926

	(再掲) 20-64歳			(再掲) 65歳以上			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差	人数	平均値	標準偏差
総数	141	6,805	3,352	98	5,708	3,782	61	5,990	3,839	37	5,244	3,691
男性	59	7,603	3,649	44	6,179	3,993	26	6,864	4,509	18	5,189	2,945
女性	82	6,231	3,014	54	5,325	3,593	35	5,341	3,169	19	5,295	4,364

注) 栄養摂取状況調査票の身体状況「歩数計の装着状況 朝起きてから寝るまで、ほぼずっと着けていましたか(入浴、水泳中などを除く)」に「はい」と回答した者を集計対象とした。

歩数が100歩未満又は50,000歩以上の者はいなかった。

※ 年齢調整値は、歩数の平均値(20歳以上)は、総数6,316歩/日、男性6,975歩/日、女性5,854歩/日。

年齢調整値は、令和2年国勢調査による基準人口(20-29歳、30-39歳、40-49歳、50-59歳、60-69歳、70歳以上の6区分)を用いて算出した。